جامعة الدول العربية
المركز العربي
لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
أكساد

أطلس

الحيوانات الزراعية

في الدول العربية

جامعة الدول العربية
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
أكساد

أطلس
الحيوانـــات الزراعيـــــة
في الدول العربيـــة

دمشـــق 2011

حقوق الطبع محفوظة
للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
أكساد

هاتف : 39 30 574 - 87 30 574 11 00963
فاكس : 63 30 574 11 00963
بريد الكتروني : email@acsad.org
http // www.acsad.org
ص.ب : 2440
دمشق – الجمهورية العربية السورية

تقديم

يمتلك الوطن العربي ثروة حيوانية زراعية متعددة ومتنوعة تؤهله ليكون في طليعة دول العالم في الإنتاج الحيواني، حيث قدرت أعداد الحيوانات الزراعية عام 2009 بنحو 370.2 مليون رأساً تنتمي لخمسة أنواع حيوانية هي الأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، والجاموس، والعائلة الخيلية، إذ تشكل أعدادها نحو 44.8 %، 26.4 %، 21.5 %، 1.2 % ، 4.1 %، و2 % من الأعداد الكلية للأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، والجاموس، والعائلة الخيلية على التوالي، بالإضافة إلى الطيور (الدجاج، والحبش، والبط، والإوز، والحمام) والأرانب، وتساهم هذه الثروة بنحو 20 – 30 % من قيمة الاقتصاد الزراعي الوطني في الدول العربية وفق محور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية في المناطق الرعوية والصحراوية وشبه الصحراوية، وتؤمن الاستقرار النسبي، وتوفر فرص العمل لنسبة هامة من السكان وعلى الرغم من تعدد الموارد الوراثية الحيوانية الزراعية وتنوعها، فإنها مازالت في إنتاجيتها غير كافية لتغطية احتياجات السكان المحليين من البروتين الحيواني لأسباب متعددة، كما أن يد التحسين إن وجدت لم تكن فعالة في تحسين أدائها الإنتاجي والتناسلي، بالإضافة الى أن بعضاً من تلك الأنواع وخاصةً المتميزة منها وصل إلى درجة الانقراض.

ونظراً لتجاهل الموارد الوراثية الحيوانية في الوطن العربي لفترة طويلة، كان لابد من أن يبادر المركز العربي إلى إقامة أولوية لحماية الموارد الغذائية والزراعية، وتشجيع تنظيمات المشاركة في إدارة الموارد الوراثية المحلية بصورة تضمن قيام أنماط استخدام مستدامة، وتحد من الاستخدام العشوائي والجائر، وتساعد على وقف العوامل المهددة لبقاء المصادر الوراثية، كنقص المعلومات عن الأنواع، والأعداد، والتركيب الوصفي للسلالات الحيوانية، والتقويم العشوائي لمعدل الاستهلاك، وذبح الإناث، والخلط العشوائي، والتسريب للأصول الوراثية الحيوانية المحلية إلى خارج الدول العربية، وتكرار الجفاف الموسمي، ونقص الوسائل التشريعية الخاصة بحماية التنوع الحيواني، وارتفاع معدل الوفيات لانخفاض فعالية الخدمات البيطرية تحت نظام التربية التقليدية، مما يؤدي إلى تآكل الموارد الوراثية الحيوانية.

وبسبب زيادة السكان والحاجة الكبيرة لاستهلاك البروتين الحيواني، والتغير المناخي الذي أظهر أمراضاً جديدة وخطيرة، وانتشار الجفاف في الكثير من البلاد العربية، فقد وصل معدل انقراض السلالات أو العروق الحيوانية المحلية إلى مستوى مخيف، فيمكن أن تنقرض بعض العروق أو السلالات حتى قبل أن تدرس صفاتها وتقوَّم طاقتها الإنتاجية.

وقد أصبح موضوع حفظ التنوع الحيوي الحيواني الزراعي المحلي من الأولويات على المستوى العالمي، و تجلى ذلك من خلال مبادرة منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة لإعداد التقرير الأول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية الزراعية في العالم ، و الذي شاركت فيه معظم الدول العربية بإعداد تقاريرها القطرية، و تمت الموافقة على التقرير في المؤتمر التقني الدولي المعني بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة الذي عقد في مدينة إنترلاكن بسويسرا فيما بين 3 - 7 أيلول/سبتمبر 2007، و أشارت توصيات إعلان إنترلاكن إلى ضرورة استكمال النشاطات العلمية المتعلقة بتوصيف السلالات الحيوانية المحلية من الناحيتين المظهرية والوراثية، وحفظ حقوق ملكيتها، ووضع برامج وطنية وإقليمية لحفظها وصيانتها، و تحسينها وراثياً و إكثارها، و إعادة نشر تربيتها لتأخذ دورها الطبيعي كمكون أساسي من مكونات التنوع الحيوي و التنمية المستدامة في البيئات التي نشأت و تأقلمت فيها .

وأمام هذا الواقع، أخذ المركز العربي (أكساد) زمام المبادرة لحماية الموارد الوراثية الحيوانية المحلية في الوطن العربي التي يقع معظمها تحت النظم الزراعية التقليدية، والتي حافظت إلى حد ما على التنوع الحيوي الحيواني منذ العصور القديمة، وخوفاً من اندثار عروق وسلالات أخرى من هذه الثروة بادر المركز العربي بالتعاون مع معظم

الدول العربية المعنية لحماية هذه الموارد الوراثية الحيوانية، وبالعمل معاً على تحقيق إدارة محسنة للموارد الوراثية خاصة للعروق الحيوانية المهددة بالانقراض، والحد من الاستخدام العشوائي والجائر لهذه الموارد، والمساعدة على وقف العوامل التي تهددها.

ومما تقدم، وفي سياق الهدف المذكور آنفاً، كان لابد للمركز العربي من حصر هذه الأنواع والعروق والسلالات وتوصيفها ضمن أطلس يوثق هذه الموارد الوراثية وأماكن تواجدها ومنشئها وأعدادها وتوصيفها، مع ذكر ماتيسر من إنتاجياتها الحالية على أرض الواقع، ليكون هذا الأطلس عوناً للدارسين والباحثين والمعنيين بالإنتاج الحيواني كافة، وتعزيز قاعدة البيانات بمعارف الموارد الوراثية الحيوانية لمعظم الدول العربية، ولإتاحة تشاطر المعلومات فيما بين البلدان العربية، وتمكين راسمي السياسات الزراعية في الدول العربية من التخطيط السليم للسيطرة على العوامل المهددة للموارد الوراثية الحيوانية.

وبهذه المناسبة نتقدم ببالغ الشكر والامتنان للباحثين والفنيين الذين قاموا بتوفير المعلومات وتحليلها، وإعداد قاعدة البيانات، ومراجعتها العلمية، سواءً من العاملين في المركز العربي أو الدول العربية.

والله ولي التوفيق

الدكتور رفيق علي صالح
المدير العام

شكر خاص

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) يتقدم بالشكر الخاص
لسعادة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم التويجري
الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية
لمساعدته في إنجاز هذا الأطلس

فريق العمل

الدكتور عبد الوالي محمد الأغبري
مدير إدارة الثروة الحيوانية
رئيس برنامجي حصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية، والتحسين الوراثي للمجترات الصغيرة في الدول العربية.

الدكتور محمد ربيع المرستاني
معاون مدير إدارة الثروة الحيوانية، رئيس برنامج التلقيح الإصطناعي ونقل الأجنة في المجترات الصغيرة

الدكتور عبد الملك خلف الله
رئيس برنامج تربية الإبل والخيول العربية.

الدكتور خالد النجار
خبير تربية حيوان

الدكتور محمد موسى
خبير تناسل حيوان

المهندس محمد علي قرجولي
رئيس برنامج الأعلاف وتغذية الحيوان

المهندس محمود ضوا
أخصائي إنتاج حيواني
المهندس زياد عبدو
أخصائي إنتاج حيواني

السيدة فائزة الميداني
أمينة سر إدارة الثروة الحيوانية

المراجعة العلمية

الدكتور صاموئيل موسى
أستاذ في قسم الانتاج الحيواني - نائب عميد كلية الزراعة للشؤون العلمية - جامعة دمشق

التدقيق اللغوي

السيدأحمد حمود
السيدحسن المير

الاخراج

برهان عكو

المنسـقون الوطنيـون
لأطلس الحيوانـات الزراعيـة في الدول العربيـة

المملكة الأردنية الهاشمية
المهندس محمود الصعوب
مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة

الإمارات العربية المتحدة
المهندسة ثويبة محمد أهلي
إدارة تنمية الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه

مملكة البحرين
الدكتور أحمد علي مهدي ربيع
إدارة الثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة

الجمهورية التونسية
المهندسة نجوى ناصيف
الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في وزارة الفلاحة والموارد المائية
الدكتور منور الجمالي
مدير عام البنك الوطني للجينات في وزارة البيئة والتنمية المستديمة

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
الطبيبة البيطرية عفاف بورعدة
المعهد التقني لتربية الحيوانات في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

المملكة العربية السعودية
الطبيب البيطري فؤاد بن حمد الزريق
مدير بنك الأصول الوراثية في إدارة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة

جمهورية السودان
الدكتور بابكر عبد العاطي الشريف
مدير إدارة الموارد الوراثية بالإدارة العامة لتنمية الإنتاج الحيواني في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية

الجمهورية العربية السورية
المهندس عدنان الأسعد
مدير إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
المهندس محمد أمين
معاون مدير إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
المهندس زياد وهبة
مديرية الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

جمهورية العراق

الطبيب البيطري حيدر عبد الرزاق مرتضى

الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة

سلطنة عمان

المهندس راشد ابن سعود بن أحمد الحبسي

مدير مركز بحوث الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة

دولة فلسطين

المهندس أسامة دولة

نائب مدير دائرة الثروة الحيوانية – الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة

دولة قطر

الدكتور خالد عبد الحكيم مهران

مختبر التكنولوجيا الحيوية في إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البيئة

دولة الكويت

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

السيد يوسف خليفة النجم

مدير إدارة الإنتاج الحيواني

السيد عبد الوهاب الباذر

مراقب خدمات الثروة الحيوانية

السيد جابر علي الفارس

رئيس قسم الثروة الحيوانية

الدكتور سيد محمد النخلة

أخصائي الإنتاج الحيواني

الجمهورية اللبنانية

المهندس سليم المصري

رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

الدكتور عبد الكريم احتاش

المركز الوطني للصحة الحيوانية وتحسين السلالات – اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

جمهورية موريتانيا الإسلامية

الدكتور أحمد سالم ولد سيدي محمود

رئيس قسم الأوبئة الحيوانية في إدارة الثروة الحيوانية في وزارة التنمية الريفية

الجمهورية اليمنية

المهندس صالح الشقري

الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية – وزارة الزراعة والري

المحتويـــات

عروق وسلالات الأبقار في الدول العربية 17
سلالات الأبقار المدخلة إلى الدول العربية 19
أبقار الهولشتاين فريزيان (كل الدول العربية) 21
أبقار الجرسي (دولة الكويت، ودولة الامارات العربية المتحدة) 23
أبقار السويسري البني (دولة الكويت، وجمهورية تونس) 25
عروق الأبقار في دولة الإمارات العربية المتحدة 27
الأبقار البلدية 29
الأبقار الهجين 30
عروق الأبقار في مملكة البحرين 31
الأبقار المحلية 33
عروق الأبقار في الجمهورية التونسية 35
أبقار الطارنطلي 37
عروق الأبقار في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 39
الأبقار المحلية 41
أبقار الشرفة 42
أبقار القالمية 43
الأبقار الشلفية 44
الأبقار السطايفية 45
عروق الأبقار في المملكة العربية السعودية 47
الأبقار البلدية 49
عروق الأبقار في سلطنة عمان 51
الأبقار المحلية (الباطنة) 53
الأبقار الظفاري 55
عروق الأبقار في جمهورية السودان 57
أبقار البقارة 59
أبقار الكنانة 61
أبقار البطانة 63
أبقار التابوزا، المورلي 65
أبقار منقلا 67
أبقار جبال النوبة 67
أبقار السانقا النيلية 67
الأبقار الهجينة 68

عروق الأبقار في الجمهورية العربية السورية 69
الأبقار الشامية 71
الأبقار العكشية 73
الأبقار الجولانية 75
الأبقار الهجينة 77
عروق الأبقار في جمهورية العراق 79
أبقار الكرادي 81
أبقار الجنوبي 83
أبقار الشرابي 85
أبقار الرستاكي 87
الأبقار الهجينة 89
عروق الأبقار في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 91
أبقار الأطلس 93
عروق الأبقار في جمهورية موريتانيا الإسلامية 95
أبقار الزيبو مور 97
أبقار الزيبو بل 98
عروق الأبقار في الجمهورية اليمنية 99
الأبقار المحلية اليمنية 101
أبقار جزيرة سقطرى 103

عروق الجاموس في الدول العربية 105
الجاموس السوري (جاموس البحر الأبيض المتوسط) 107
الجاموس العراقي 109
الجاموس المصري 111

عروق الإبل في الدول العربية 113
عروق الإبل في دولة الإمارات العربية المتحدة 115
الإبل المحلي (البوش) 117
عروق الإبل في الجمهورية التونسية 119
ابل المغربي 121
عروق الإبل في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 123
ابل أجار 125
ابل ايت خباش 126
ابل البربري 127
ابل ازرغاف 128
ابل أولاد سيدي الشيخ 129
ابل الشعامبي 130
ابل المروكي 131
ابل المهري 132

عروق الإبل في جمهورية السودان. 133
الإبل العربية السودانية 135
ابل الرشايدي 137
ابل العنافي 138
ابل البشاري 139
عروق الإبل في المملكة العربية السعودية 1
ابل المجاهيم 143
ابل المغاتير 145
عروق الإبل في الجمهورية العربية السورية 147
الإبل الشامية 149
عروق الإبل في جمهورية العراق 151
ابل الخوار 153
عروق الإبل في جمهورية موريتانيا الإسلامية 155
ابل افطوط 157
ابل الرقيبي 158
عروق الإبل في الجمهورية اليمنية 159
ابل الأراك (الطوري) 161
ابل الحرة 162
ابل الشرسية 163
ابل العاضة 164

عروق وسلالات الأغنام في الدول العربية 165
عروق الأغنام المنشرة في أكثر من دولة عربية غنم العواس 167
عروق وسلالات أغنام مدخلة إلى بعض دول الخليج العربي
(الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت) 169
غنم الرأس الأحمر الداكن 171
غنم الكيوس 172
غنم المرينو 173
غنم الرأس الأسود الصومالي 174
عروق الأغنام في المملكة العربية السعودية 177
غنم النجدي 179
غنم الحري الحبصي 181
غنم الحري دعدي 183
غنم الحري رفيدي 185
غنم الحري دقسي 187
عروق الأغنام في جمهورية السودان 189
غنم الكباش 191
غنم الوتيش 193
غنم الدباسي 195
غنم الأشقر 197

الغنم النيلي السوداني 199
غنم البيجة 201
غنم الزغاوة 202
عروق الأغنام في جمهورية العراق 203
غنم العرابي 205
غنم الكرادي 207
عروق الأغنام في سلطنة عمان 209
الغنم العماني 211
عروق الأغنام في دول المغرب العربي (الجزائر، ليبيا، تونس) 213
غنم أولاد جلال 215
غنم البربر 217
غنم البربري 219
غنم بربرين 221
غنم الرامبي 223
غنم الحمراء 225
غنم تادميت 227
غنم سوداء تيبار 228
غنم الصقلي السردي 229
غنم الدمان 230
غنم السردي 231
عروق الأغنام في جمهورية موريتانيا الإسلامية 233
غنم الطوارق (سيداو) 235
غنم البيظان طويل 236
عروق الأغنام في الجمهورية اليمنية 237
الغنم اليمني الأبيض (التهامية) 239
الغنم التعزي الأحمر (الجندي) 241
الغنم الذماري 243
الغنم الأحوري 245
الغنم المأربي (النجدي) 246
الغنم البوني (الأسود والأبيض) 247
الغنم الجوفي (الجهمي) 249
غنم سقطرى 250

عروق وسلالات الخيول والحمير في الدول العربية 251
عروق وسلالات الخيول والحمير في المملكة الأردنية الهاشمية 253
الخيل العربي 255
حمير الشريفي 256
عروق وسلالات الخيول في الجمهورية التونسية 257
الخيل العربي (البربري) 259
الخيل العربي الأصيل 261

الخيل الانكليزي 263
الخيل القزم مقعد 264
عروق وسلالات الخيول في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 265
الخيل العربي (البارب) 267
عروق وسلالات الخيول والحمير في المملكة العربية السعودية 269
الخيل العربي (الكحيلة) 271
الحمير الحجازي 273
الحمير الحساوي 274
عروق وسلالات الخيول والحمير في جمهورية السودان 275
الخيل العربي (الدنقلاوية) 277
الخيل العربي (الغرباوية) 278
الحمير الريفاوي 279
الحمير المكاوي (الدراوي) 280
عروق وسلالات الخيول في الجمهورية العربية السورية 281
الخيل العربي الآصيل 283
عروق وسلالات الخيول والحمير في جمهورية العراق 285
الخيل العربي 287
الحمير الشهري 288
عروق وسلالات الخيول والحمير في دولة فلسطين 289
الخيل العربي 291
الخيل العربي المحلي المهجن 292
الخيل البلدي العربي 293
الحمير البلدية 294
عروق وسلالات الخيول في دولة قطر 295
الخيل العربي 297
الخيل المستورد (الهجين العربي الأصيل مع الثوربريد) 299
عروق وسلالات الخيول في جمهورية موريتانيا الإسلامية 301
الخيل العربي (الشريفي) 303
عروق وسلالات الخيول والحمير في الجمهورية اليمنية 305
الخيل العربي(أم العرقوب) 307
الخيل العربي(الشويماء) 309
الخيل العربي (الصقلاوية) 310
الخيل العربي (العبية) 311
الخيل العربي (الكحيلة) 312
حمير الصبياني 313
حمير القرماني 314

عروق وسلالات الدجاج والأرانب في بعض الدول العربية 315
سلالات الدجاج والأرانب في بعض الدول العربية (سلالات مدخلة) 317
الدجاج البياض 319

دجاج اللحم 320
الليجهورن 321
أرنب كاليفورنيا 322
عروق الأرانب في الجمهورية التونسية 323
الأرنب الهجين في تونس 325
عروق الدجاج والأرانب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 327
الدجاج العربي (المزركش) 329
الأرنب 330
عروق الدجاج والأرانب في المملكة العربية السعودية 331
الدجاج البلدي الحساوي (محلية) 333
الأرنب البلدي المحلي (حساوي) 334
عروق الدجاج في جمهورية السودان 335
الدجاج الرقباني (الزعوري) 337
الدجاج المحلي البتولي 338
الدجاج البلدي المحلي 339
عروق الدجاج والأرانب في الجمهورية العربية السورية 341
الإوز الأهلي (الإوز ذو الحدبة) 343
البط البلدي (بط بكين) 344
الدجاج البلدي (القروي) 345
الرومي الأبيض 346
الرومي البلدي (محلية) 347
النعام (اسود الرقبة) 348
الأرنب البلدي (محلي) 349
عروق الدجاج والأرانب في جمهورية العراق 351
الدجاج المحلي العراقي (المنطقة الشمالية) 353
الدجاج المحلي العراقي (المنطقة الوسطى) 353
الأرنب الكورا (البينيو) 354
عروق الدجاج في سلطنة عمان. 355
الدجاج الظفاري (محلية) 357
عروق الدجاج في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 359
الدجاج المحلي (العربي) 361
عروق الدجاج والأرانب في الجمهورية اليمنية 363
الدجاج البلدي الجبلي (محلي) 365
الدجاج البلدي الساحلي (محلي) 366
دجاج الجرع (محلي) 367
الأرنب البلدي (محلي) 368

عروق وسلالات الماعز في الدول العربية. 369
عروق الماعز المنتشرة في أكثر من دولة عربية 371
سلالة الماعز الشامي 371

الماعز البربري 373
عروق الماعز في المملكة الأردنية الهاشمية. 375
الماعز البلدي الأردني 377
عروق الماعز في دولة الإمارات العربية المتحدة 379
الماعز الخالدي 381
الماعز العربي (محلي) 383
الماعز المحلي (عوارض، رماح) 384
عروق الماعز في مملكة البحرين 385
الماعز التهامي 387
الماعز الصومالي (الفرور) 388
الماعز العربي المحلي 389
ماعز كراتشي (جمنباري) 390
عروق الماعز في الجمهورية التونسية. 391
الماعز البلدي التونسي 393
الماعز البلدي التونسي الصحراوي (النوبي) 395
الماعز المالطي التونسي 396
عروق الماعز في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 397
الماعز البلدي الجزائري 399
الماعز البلدي الجزائري الصحراوي 400
الماعز البلدي الجزائري الواحاتي (المزابية، الجزائري الأحمر) 401
الماعز الجبلي الجزائري 402
عروق الماعز في المملكة العربية السعودية 403
الماعز البلدي السعودي (الحجازي) 405
الماعز التهامي السعودي 407
الماعز الدرعي السعودي الصحراوي (الحبصي السعودي) 408
الماعز العارضي 409
الماعز النجدي السعودي 411
عروق الماعز في جمهورية السودان 413
الماعز البلدي السوداني (النوبي) 415
الماعز البلدي السوداني الصحراوي (النوبي) 416
ماعز التلال السوداني 417
الماعز الجبلي الدرعي السوداني 419
ماعز الساحل السوداني 421
الماعز السوداني الجنوبي 423
الماعز البلدي السوداني الجبلي (الزغاوا) 425
عروق الماعز في الجمهورية العربية السورية 427
الماعز الجبلي السوري 429
الماعز البلدي السوري 431
عروق الماعز في جمهورية العراق 433
الماعز البلدي العراقي 435

الماعز الجبلي العراقي 437
عروق الماعز في سلطنة عمان 439
الماعز البلدي الصحراوي العماني 441
الماعز البلدي العماني (الباطنة) 443
الماعز الجبلي العماني 445
الماعز الظفاري العماني 447
عروق الماعز في دولة فلسطين 449
الماعز الجبلي الفلسطيني 451
عروق الماعز في دولة الكويت 453
ماعز السانن 455
عروق الماعز في الجمهورية اللبنانية 457
الماعز الجبلي اللبناني 459
عروق الماعز في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 461
الماعز البلدي الليبي 463
الماعز البلدي الليبي الصحراوي (التباوي) 464
الماعز الدرعي الليبي الصحراوي (الكردي الليبي) 465
الماعز المحلي الليبي 465
عروق الماعز في جمهورية موريتانيا الإسلامية 467
الماعز البلدي الموريتاني الصحراوي 469
ماعز الساحل الموريتاني 470
الماعز القزمي الموريتاني 471
عروق الماعز في الجمهورية اليمنية 473
الماعز البلدي اليمني 475
الماعز التهامي اليمني (الشراقي، الموري، السردودي) 476
الماعز الثمودي اليمني 478
الماعز الجبلي الدرعي اليمني (تعز الأسود والأحمر) 480
الماعز السقطرى اليمني 481

أهم المصطلحات 483
المراجع 486

عروق وسلالات
الأبقـار والجـاموس
في الدول العربيـــة

سلالات الأبقار المدخلة
الى
الدول العربية

أبقار الهولشـــتاين فريزيـــــان

تعد أبقار الفريزيان والهولشتاين فريزيان أشهر عروق أبقار الحليب في العالم،وقد استمرت عمليات التحسين الوراثي لها لفترة طويلة ومازالت، وقد أصبحت بذلك من أفضل سلالات الحليب، وحققت أرقاماً قياسية في العديد من دول العالم.

المنشأ والانتشار:

نشأ عرق الفريزيان في منطقة فريزلاند في هولندا، وانتشر منها إلى كافة أنحاء أوروبا، وأدخل إلى أمريكا في منتصف القرن التاسع عشر، وتم تحسينه فيها، وسمي بعرق الهولشتاين فريزيان. وينتشر الآن في كافة أنحاء الكرة الأرضية تقريباً، لتأقلمه الجيد مع بيئات مختلفة.

أدخل إلى كافة الدول العربية، وانتشر في مناطقها ومحافظاتها المختلفة. ويعيش هذا العرق في الدول العربية تحت نظام الرعاية المكثف في المزارع التابعة للقطاعين العام والخاص، وبحيازات تتراوح بين 5 - 500 رأس. تحتاج أبقار الهولشتاين فريزيان إلى كميات كبيرة من الأعلاف المالئة (الخضراء أو الجافة)، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأعلاف المركزة. تزداد أعداد هذه الأبقار في الدول العربية بسبب إنتاجها العالي من الحليب.

أنثى الهولشتاين فريزيان

الصفات الشكلية:

تنتمي لسلالات الأبقار كبيرة الحجم، لونهاأبيض أو أسود، واللون السائد هو الأسود والأبيض بشكل بقع متفاوتة الحجم. الرأس نحيفة وطويلة، الأذنان قصيرتان وجانبيتان، الرقبة طويلة نسبياً، تتواجد القرون عند الجنسين. الضرع كبير وملمسه إسفنجي، البطن كبير، القوائم نحيفة وطويلة.

يتراوح الارتفاع عند الغارب بين 135 - 150 سم عند الذكور، وبين 130 - 148 سم عند الإناث. طول الجسم الكامل عند الذكور والإناث نحو 198 سم، محيط الصدر عند الذكور 189 سم، وعند الإناث 160 سم، وعمق الصدر عند الذكور 87 سم، وعند الإناث 81 سم.

ذكر الهولشتاين فريزيان

الصفات الإنتاجية: (عرق الحليب):

يتراوح وزن الجسم عند الذكور البالغة بين 550 - 1000 كغ، والإناث البالغة بين 400 - 700 كغ. العمر عند البلوغ الجنسي بين 14 - 18 شهراً، موسم التناسل على مدار العام. تلقح الإناث لأول مرة بوزن 350 كغ، العمر عند الولادة الأولى 27 شهراً، ومعدل الفترة بين ولادتين يتراوح بين 12 - 15 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور والإناث بين 35 - 40 كغ، متوسط وزن العجول المفطومة 100 كغ، والإناث المفطومة 90 كغ. ومعدل النمو اليومي حتى الفطام عند الذكور 640 غ، وعند الإناث 550 غ.

تسوق الحيوانات بعمر يتراوح مابين 400 - 460 يوماً، وبوزن مابين 450 - 480 كغ. يتراوح إنتاج البقرة من الحليب مابين 5500 - 7000 كغ خلال موسم إدرار طوله 305 يوماً، بينما يتراوح الإنتاج في بلد المنشأ مابين 8000 - 10000 كغ. نسبة الجوامد الكلية في الحليب 12.9 % و الدسم 3.5 % و البروتين 3.2 % والسكر 4.5، متوسط عدد مواسم إنتاج الحليب ثلاثة مواسم.

أبقار الجرسي

المنشأ والانتشار:

نشأت أبقار الجرسي منذ عهد بعيد في جزيرة جيرسي البريطانية ببحر المانش كنتيجة للخلط بين الأبقار المحلية في الجزيرة والأبقار التي استوردت من مقاطعتي بريتاني ونورماندي الفرنسيتين. ونظراً لتحملها للبيئة القاسية من حيث ارتفاع الحرارة وقلة الغذاء، وتميزها بانخفاض احتياجاتها الغذائية، فقد انتشرت في بيئات مختلفة، وأدخلت إلى بعض الدول العربية (دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة) وتعيش تحت نظام الرعاية المكثف.

ثور الجرسي

الصفات الشكلية:

تتصف أبقار الجرسي بصغر حجمها مقارنة مع عروق الحليب الأخرى، ويختلف لونها بين الأصفر بدرجاته والرمادي والأبيض. أما الذكور فتكون رمادية، أو بنية إلى بنية غامقة على الرقبة والرأس وأسفل البطن والقوائم. الرأس صغيرة ونحيفة، الأذنان صغيرتان جانبيتا التوضع، ويمكن أن تتواجد القرون في الجنسين. الضرع كبير وفنجاني الشكل وهو مثالي لإنتاج الحليب. الجسم مثلثي الشكل مما يعبر عن تخصص الأبقار بإنتاج الحليب، والبطن متسعة، الارتفاع عند الغارب 120.4 سم، محيط الصدر 168.4سم، عمق الصدر 63.3 سم. تمتاز هذه الأبقار بهدوء الطباع وسهولة الرعاية.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الأبقار تامة النمو بين 350 - 450 كغ، والثيران تامة النمو بين 650 - 750 كغ. متوسط وزن المواليد الذكور والإناث 25 كغ. ويتراوح العمر عند التلقيح الأول بين 16 - 17 شهراً، والفترة بين ولادتين 14 شهراً، والعمر عند الولادة الأولى مابين 25 - 26 شهراً.

تتصف لحومها بنسبة تصافي 60 % ونسبة تشافي 40 % نتيجة صغر حجم هذا العرق، ويذكر أن تلون دهنها باللون الأصفر الغامق يجعلها غير مرغوبة لدى المستهلك والمربي لإنتاج اللحم. متوسط إنتاج هذه الأبقار من الحليب مابين 5000 - 7000 كغ في بلد المنشأ. وقد أدخل هذا العرق الى بعض دول الخليج العربي (الكويت مثلاً حيث بلغ متوسط انتاجه من الحليب 4000 كغ في موسم إدرار طوله 305 يوماً)، وتتراوح نسبة دهن الحليب بين 4.9 - 6.12 %. لذلك فإن حليبها مخصص لإنتاج الزبدة، ونسبة البروتين 3.5 % واللاكتوز 4.6 - 5 %.

بقرة الجرسي

أبقار السويسري البني

المنشأ والانتشار:

نشأت أبقار السويسري البني في شمال سويسرا كعرق ثنائي الغرض (إنتاج حليب ولحم)، وعندما أدخل إلى أمريكا وتم تحسينه وراثياً أصبح متخصصاً بإنتاج الحليب. ونتيجة تحمله بيئات مختلفة، فقد زاد انتشاره. وأدخل إلى الدول العربية (الكويت، وتونس..) ويعيش تحت نظام الرعاية المكثف.

بقرة سويسري بني

الصفات الشكلية:

الأبقار كبيرة الحجم، يتدرج لونها من الرمادي الفاتح حتى الغامق ويصل إلى اللون البني الغامق. لون الأنف واللسان أسود، وكذلك لون شرابة الذيل. الرأس متوسطة الحجم ونحيفة، الأذنان صغيرتان وجانبيتا التوضع على الرأس، الضرع كبير الحجم وملمسه إسفنجي، قوائم الأبقار طويلة ونحيفة. يتراوح الارتفاع عند الغارب للذكور بين 140 - 145 سم، وللإناث بين 135 - 145 سم. تعد حيوانات هذا العرق وديعة وسلسة القيادة.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور تامة النمو بين 750 - 850 كغ، والإناث بين 600 - 625 كغ. متوسط وزن المواليد الذكور 40 كغ، والإناث 37 كغ. ونظراً لكبر حجم الحيوانات فإنها تصلح لإنتاج اللحم، وتتميز الذكور بالنمو السريع.

متوسط العمر عند البلوغ الجنسي 9 أشهر للذكور، والإناث بين 9 - 12 شهراً. تلقح الإناث لأول مرة عند وزن 360 كغ، العمر عند أول ولادة 29.3 شهراً، الفترة بين ولادتين 14.5 شهراً. تفطم الذكور بعمر 3 أشهر، ويصل وزن الذكور

المفطومة إلى 89 كغ والإناث المفطومة إلى 84 كغ. معدل النمو اليومي للذكور 640 غ، وللإناث 550 غ. تسوق الحيوانات بوزن بين 400-420 كغ وبعمر 450-480 يوماً. يتراوح وزن الذبيحة بين 210-260 كغ، بنسبة تصافي 52 % وتشافي 58 %.
متوسط إنتاج الحليب في تونس والكويت 3000 و 4000 كغ على التوالي. بينما يصل متوسط الإنتاج للعرق في بلد المنشأ 6000 كغ، خلال موسم إدرار طوله 305 أيام، وبنسبة دسم 4.4 % وبروتين 3.2 % ولاكتوز 5 %.

ثور سويسري بني

عروق الأبقار
في
دولة الإمارات العربية المتحدة

الأبقار البلدية

المنشأ والانتشار:

نشأت في دولة الإمارات المتحدة، وانتشرت بشكل رئيسي في إمارات العين، أبو ظبي، دبي، و بلغ عددها 55903 رؤوس عام 2005. يتركب القطيع من 20 % ذكور، و80 % إناث.

تتواجد 5 % من الحيوانات وبحيازة 5 - 10رؤوس تحت نظام الرعاية السرحي، و80 % من الحيوانات وبحيازة 20 - 30 رأساً تحت نظام الرعاية المكثف، و 15 % من الحيوانات وبحيازة 40 - 50 رأساً تحت نظام الرعاية شبه المكثف. تتغذى الحيوانات بنسبة 30 % على المراعي و50 % على المركزات، و20 % على المخلفات الزراعية.

الأبقار البلدية

الصفات الشكلية:

لون الحيوانات أحمر وأصفر، لون الوجه بني غامق، الرأس متوسطة الحجم، تتواجد القرون عند الذكور والإناث، الأذنان منتصبتان وقصيرتان، الارتفاع عند الغارب في الذكور 130 سم، وفي الإناث 120 سم، طول الجسم المستقيم في الذكور 160سم، والإناث 155 سم، محيط الصدر عند الذكور 175 سم، والإناث 170سم، عمق الصدر في الذكور 50 سم، والإناث 45 سم.

الصفات الإنتاجية:

تتم رعاية هذه الأبقار لإنتاج اللحم بشكل رئيس ومن ثم الحليب. وزن الذكور تامة النمو 400 كغ، والإناث 310 كغ. متوسط وزن المواليد الذكور 24.5 كغ، والإناث 21.8 كغ.

يبلغ متوسط وزن الذكور المفطومة 120.5 كغ، والإناث المفطومة 112.5 كغ. العمر عند البلوغ 14.5 شهر. متوسط الوزن عند التلقيح الأول 240 كغ. العمر عند الولادة الأولى 30 شهراً ، الفترة بين ولادتين 14 شهراً. تسوق الحيوانات للذبح بعمر 540 يوماً وبوزن 400 كغ. معدل النمو اليومي حتى التسويق 950 غ، وزن الذبيحة 200 كغ، بنسبة تصافي 51 %، وتشافي 48 %. تنتج الأبقار بالمتوسط 365.5 كغ حليب بموسم إدرار طوله 200 يوم، إنتاج الحليب اليومي 1.8كغ. يتكون الحليب من 13 % مواد صلبة كلية، نسبة الدهن بالحليب 5.1 %، والبروتين 3.4 %، واللاكتوز 6.4 %.

الأبقار الهجينة

المنشأ والانتشار:

تنتشر الأبقار الهجينة في بلاد الشام وتركيا، وأدخلت إلى الإمارات العربية المتحدة وبخاصة إمارات أبو ظبي، دبي، رأس الخيمة، الفجيرة، وأم القيوين. بلغت أعدادها 16810 رأس عام 2007. وهي في تزايد مستمر. تبلغ نسبتها 6 % من أعداد الأبقار بشكل عام.

يتركب القطيع من 10 %ذكور و90 % إناث. تتغذى الحيوانات على عليقة تصل فيها نسبة الأعلاف المركزة إلى 40 %والمالئة والخضراء 60 %. نتجت هذه السلالة من الخلط بين الشامي والفريزيان.



الأبقار الهجينة

الصفات الشكلية:

حجم الذكور كبير والإناث متوسط، لون الجسم أحمر أو أبيض وأحمر، الوجه أحمر وأبيض أيضاً، الرأس متوسطة الحجم ذات مقطع مستقيم، الأذنان جانبيتان وقصيرتان. للذكور قرون. الارتفاع عند الغارب في الذكور138سم، وطول الجسم المستقيم 165سم، وعمق الصدر 55 سم.

الصفات الإنتاجية:

تربى هذه الأبقار لإنتاج الحليب أولاً واللحم ثانياً. يبلغ وزن الذكور تامة النمو 800 كغ، والإناث 500 كغ. متوسط وزن المواليد الذكور والإناث 25.5 كغ. متوسط وزن الذكور المفطومة 73 كغ، والإناث 69 كغ. يتراوح العمر عند البلوغ 27 - 30 شهراً .

عروق الأبقار
في
مملكة البحرين

الأبقار المحلية

المنشأ والانتشار:

تنتسب هذه الأبقار إلى عرق الزيبو الآسيوي (الهندي)، وتسمى(الأبقار المحلية) وموطنها الأصلي المنامة، وجد، وحفص. انتشرت إلى مختلف مناطق المملكة. وتتواجد بكثافة واضحة في بلديات المنامة، وجد، وحفص. يشكل عددها 53 % من عدد الأبقار الإجمالي في المملكة، وينتشر الباقي في البلديات الأخرى بنسب تتراوح بين 5 - 11 %. تتم رعاية نحو 84 % من هذه الأبقار في المنازل، وباقي النسبة ضمن الحيازات الزراعية المتنوعة.

الأبقار المحلية في البحرين

الصفات الشكلية:

يعد حجم هذه الأبقار كبيراً، وتتميز بوجود سنام. اللون بني فاتح، أو أشقر، أو أسود. الرأس مستطيلة طويلة ونحيفة ومتوسطة الحجم ذات مقطع مستقيم. القرون ذات أشكال مختلفة قصيرة عند الإناث أحياناً. الأذنان متوسطتا الحجم أفقيتان. الجسم مستقيم يتقعر في الوسط. اللبب كبير نسبياً ذو ثنيات. القوائم طويلة ونحيفة، قمة الذيل غليظة ومرتفعة، الضرع صغير الحجم جيد الشكل، الحلمات متباعدة وغليظة وأحياناً توجد حلمات زائدة. ذات هيكل عظمي ضخم.

الصفات الإنتاجية:

تتأخر هذه الأبقار في الوصول إلى النضج الجنسي، ويقدر عمر البلوغ الجنسي بنحو 24 شهراً، ويمتد موسم التناسل على مدار العام. يبلغ الوزن عند التلقيح الأول 345 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 36 شهراً، والفترة بين ولادتين 12 شهراً، وزن المواليد 14 - 20 كغ، ويبلغ وزن الحيوان بعمر سنة 100 كغ. ومعدل النمو اليومي 230 غ. إنتاج الحليب الكلي 1100 كغ بمعدل يومي يتراوح مابين 4 - 8 كغ.

عروق الأبقار
في
الجمهورية التونسية

أبقار الطارنطلي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه الأبقار في فرنسا، وأدخلت إلى تونس، وتنتشر حالياً في المنطقة الشمالية والوسطى. تعيش 80 % من هذه الأبقار تحت نظام الإنتاج شبه المكثف وبحيازة تتراوح مابين 10 - 20 رأساً، وتعيش 20 % منها تحت نظام الإنتاج المكثف وبحيازة بين 20 - 50 رأساً. يتركب القطيع من 14 % ذكور و 86 % إناث، ونسبة الأبقار المنتجة 63 %.

تتغذى الحيوانات بنسبة 30 % على مخلفات المحاصيل و 30 % على المركزات و40 % على المراعي الطبيعية. بلغ عدد الأبقار المنتجة في تونس 3000 رأس عام 2009. تتأقلم هذه الأبقار خارج موطنها الأصلي بشكل جيد، وتتصف بظاهرة الأمومة وقابلة للتحسين الوراثي، وهي في تزايد.

أنثى أبقار الطارنطلي

الصفات الشكلية:

حجم الذكور كبير،بينما الإناث متوسطة الحجم، لون الجسم والوجه أحمر داكن مع وجود دوائر سوداء اللون حول العينين، الرأس متوسطة الحجم وذات مقطع مستقيم. الأذنان منتصبتان. الارتفاع عند الغارب للذكور 140 - 145سم، وللإناث بين 130 - 135 سم، متوسط طول الجسم المستقيم 145 سم للذكور، و135 سم للإناث، وتمتاز هذه الأبقار بقدرة كبيرة على المسير.

الصفات الإنتاجية:

ثنائية الغرض (لحم وحليب). متوسط وزن الجسم للذكور تامة النمو 750 كغ، والإناث 575 كغ، ويتراوح العمر عند

البلوغ الجنسي للذكور مابين 7 - 9 أشهر، وللإناث بين 9 - 12 شهراً، يمتد موسم التناسل على مدار العام. العمر عند الولادة الأولى 29.3 شهر، والفترة بين ولادتين 13.5 شهر، متوسط وزن الذكور عند الميلاد 37 كغ والإناث 34 كغ. تفطم المواليد بعمر 3 أشهر ويصل وزن الذكور المفطومة إلى 85 كغ والإناث 80 كغ. معدل نمو العجول من الميلاد حتى الفطام 640 غ يومياً والعجلات 550 غ.

تسوق الحيوانات بعمر 450 - 480 يوماً وبوزن بين 380 - 423 كغ، ويتراوح وزن الذبيحة بين 205 - 230 كغ، بنسبة تصافي 52 % وتشافي 56 %.

تنتج الحليب بمتوسط قدره 3453 كغ، في موسم إدرار طوله 284 يوماً، وبنسبة دهن 3.23 % وبروتين 3.35 % ولاكتوز 5 %. يقدر متوسط الإنتاج اليومي للبقرة من الحليب 12 كغ، بينما يتراوح إنتاج العرق في بلد المنشأ بين 4000 - 10000 كغ.

ذكر أبقار الطارنطلي

عروق الأبقار
في
الجمهورية الجزائريـــة
الديمقراطية الشعبية

الأبقار المحليـــة

المنشأ والانتشار:

تنحدر جميع الأبقار الجزائرية المحلية من سلالة واحدة تسمى السلالة السمراء الأطلسية، وموطنها الأصلي الجزائر، وتنتشر في عموم المدن الجزائرية (عنابة، قالمة، سكيكدة، الطارف، جيجل)، وتعود ملكيتها بشكل عام للقطاع الخاص.

تتم رعاية 95 % من الأبقار تحت النظام السرحي وبحيازات أقل من 10 رؤوس، و 5 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف، وبحيازات اقل من 10رؤوس أيضاً. تتركب القطعان من 70 % من الإناث و30 % من الذكور يستخدم منها25 % لإنتاج اللحم، و5 % كثيران (طلائق) للتلقيح.

تتغذى القطعان على المراعي الطبيعية بشكل رئيس 70 - 80 %، وتساهم مخلفات المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 15 - 20 %، والأعلاف المركزة 5 - 10 % فقط في الغذاء المقدم للقطعان.

تتناقص أعدادها نتيجة الخلط الحاصل مع الأبقار المستوردة، وأهم سلالات الأبقار الجزائرية:

الشرفة – القالمية – الشلفية – السطايفية.

أبقار الشرفة

الصفات الشكلية:

تعد هذه الأبقار متوسطة الحجم، اللون الأبيض هو السائد، الرأس متوسطة الحجم، مستقيمة المقطع، الوجه أبيض، الأذنان متوسطتان ومنتصبتان، القرون صغيرة لدى الجنسين. طول الجسم المائل للذكور 165 سم والإناث 160 سم، الارتفاع عند الغارب للذكور 112 سم، والإناث 110 سم.

ذكر أبقار الشرفة

أنثى أبقار الشرفة

الصفات الإنتاجية:

تتم رعاية أبقار الشرفة لإنتاج اللحم أولاً، ثم الحليب. يبلغ وزن الذكور تامة النمو 300 كغ، والإناث 250 كغ. العمر عند البلوغ الجنسي بين 8 - 9 أشهر. وزن الذكور عند الميلاد 18 - 20 كغ، والإناث 16 - 18 كغ. ويبلغ متوسط وزن المواليد عند الفطام 50 كغ. العمر عند الولادة الأولى متأخر 30 شهراً، نسبة التوائم قليلة، والفترة بين ولادتين طويلة 18 شهراً. عمر العجول عند التسويق للذبح 450 يوماً، وبوزن يتراوح بين 250 - 300 كغ. معدل النمو اليومي حتى التسويق 518 غ. وزن الذبيحة 112 - 135كغ، بنسبة تصافي 45 %، الضرع عند الأبقار صغير نسبياً، وإنتاج الأبقار من الحليب قليل، حيث تنتج البقرة 370 كغ بموسم إدرار طوله 185 يوماً، بمعدل إنتاج يومي 2 كغ، ونسبة دهن 4.7 %، وبروتين 4 %.

أبقار القالمية

الصفات الشكلية:

أبقار متوسطة الحجم، اللون رمادي فاتح أو غامق، ومائل للبني الغامق، الوجه رمادي غامق، الرأس متوسطة الحجم ذات مقطع مستقيم، الأذنان متوسطتا الحجم وتتواجد القرون عند الذكور والإناث. طول الجسم المائل للذكور 168سم والإناث 162 سم، الارتفاع عند الغارب للذكور 110سم والإناث 101 سم.

ذكر أبقار القالمية

أنثى أبقار القالمية

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور تامة النمو بين 300 - 350 كغ، والإناث 250 - 270 كغ، وزن الذكور عند الميلاد 20 كغ، والإناث 18 كغ. وزن الفطام 53 كغ للذكور و50 كغ للإناث. عمر البلوغ الجنسي 8 - 9 أشهر، يمتد موسم التناسل طوال العام. العمر عند الولادة الأولى متأخر 30 شهراً، نسبة التوائم ضعيفة، الفترة بين ولادتين طويلة 18 - 24 شهراً .

عمر الذكور عند التسويق 450 - 540 يوماً وبوزن 250 - 300 كغ، معدل النمو اليومي حتى التسويق 518 غ، وزن الذبيحة 115 - 140 كغ، بنسبة تصافي منخفضة 45 %.

إنتاج الحليب عند الأبقار 600 كغ بموسم إدرار طوله 210 أيام وبمعدل إنتاج يومي 3 كغ حليب، بنسبة بروتين 3.8 %.

الأبقار الشلفية

الصفات الشكلية:

أبقار صغيرة الحجم، اللون طوبي (أشهب)، الرأس متوسطة الحجم، الأذنان متوسطتا الحجم ومنتصبتان، وطول الجسم المستقيم 110 - 125 سم للذكور، و100 - 120 للإناث، القرون متوسطة لدى الجنسين.

أبقار الشلفية

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور تامة النمو بين 180 - 300 كغ، والإناث 180 - 250 كغ، العمر عند البلوغ متأخر، العمر عند الولادة الأولى متأخر 36 شهراً، التوائم ضئيلة جداً، الفترة بين ولادتين طويلة جداً 36 - 48 شهراً، وزن المواليد الذكور 18 كغ، والإناث 16 كغ، وزن الفطام 40 كغ للذكور و 35 كغ للإناث، ولا تتوافر معلومات عن إنتاج الحليب.

الأبقار السطايفية

الصفات الشكلية:

الأبقار متوسطة الحجم، اللون أسود باهت، وتتميز بخط بني على طول الظهر. الرأس متوسطة الحجم، القرون صغيرة في الجنسين، الأذنان متوسطتا الحجم، طول الجسم المستقيم 175 سم للذكور، و160 للإناث، الارتفاع عند الغارب 118 سم للذكور، و115 سم للإناث، الذيل أسود طويل يصل أحياناً الى الأرض.

أبقار السطايفية

الصفات الإنتاجية:

تختلف هذه الأبقار بأوزانها باختلاف المنطقة التي تتواجد فيها، ويتراوح إنتاجها من الحليب مابين 8 - 10 كغ يومياً.

عروق الأبقار
في
المملكة العربية السعودية

الأبقار البلدية

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنها من عرق الزيبو الهندي أو نتيجة الخلط الحاصل بين سلالات الأبقار الإفريقية والأوروبية التي أدخلت إلىالمملكة العربية السعودية مع الأبقار المحلية، وتنتشر في المنطقة الجنوبية الغربية، وخاصة في أبها، ونجران، وجيزان على الحدود اليمنية، وهناك عدد قليل في المنطقة الشرقية والوسطى. وهي في تناقص مستمر، وبحيازات 1 - 6 رؤوس، تتم رعايتها تحت النظام شبه المكثف.

الأبقار البلدية

الصفات الشكلية:

صغيرة الحجم، اللون أصفر إلى الأصفر الفاتح (الأكثر شيوعاً)، والأصفر الغامق والبني والرمادي والأسود والأبيض والمبرقع والألوان الأخرى الناتجة عن اختلاطها.

الرأس مستطيلة، الجبهة مقعرة قليلاً في الوسط، الأذنان واسعتان ومتجهتان للجانبين بشكل أفقي، القرون مختلفة الأطوال ومتجهة للجانبين ثم منحنية إلى الأمام، لها سنام شحمي في مقدمة الظهر بأشكال مختلفة، اللبب واضح وأكثر تدلياً عند الذكور، الجسم مندمج وخط الظهر مستقيم إلى المقعر قليلاً. العظام الدبوسية واضحة البروز، طول الجسم المائل نحو 125 سم للذكور و 119 سم للإناث، عمق الصدر نحو 63.5 ذكور، و 58.6 سم للإناث، الارتفاع عند الغارب نحو121 سم عند الذكور و 89 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

تربى هذه الأبقار لإنتاج اللحم والحليب، يبلغ وزن الذكور عند الميلاد 20 كغ، والإناث 15 كغ، يتراوح عمر المواليد عند الفطام بين 1.5 - 4 أشهر، وبوزن بين 35 - 45 كغ.

يتراوح عمر النضج الجنسي عند الذكور والإناث بين 9 - 15 شهراً، عمر الإناث عند أول ولادة 30 - 32 شهراً، يمتد التناسل على مدار العام.

طول الفترة بين ولادتين 12 - 18 شهراً، عمر تسويق العجول للذبح 400 يوم بوزن يصل حتى 184 كغ، وبمعدل نمو يومي وسطي 410 غ. يتراوح إنتاج الحليب الكلي بيـن 369 - 545 كغ بموسم إدرار طوله 141 يوماً، حيث تنتج البقرة 3 - 7 كغ يومياً.

عروق الأبقار
في
سلطنة عُمـــان

الأبقار المحلية (الباطنة)

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنها دخلت من المملكة العربية السعودية. وانتشرت في المنطقة الشمالية من السلطنة، ويتركز انتشارها في مناطق الباطنة، الداخلية، الشرقية، الظاهرة. وفي الحقبة الأخيرة أدخلت إلى المنطقة الوسطى والجنوب. تربى هذه الأبقار بصورة شبه مكثفة بنسبة 96.3 %، ومكثفة بنسبة 2.4%، وسرحي 1.3 %. وحجم الحيازة في المتوسط 2.65 و3.93 و4.81 في النظام السرحي وشبه المكثف والمكثف على التوالي، يتركب القطيع من 85.2 % إناث و14.8 % ذكور. تعتمد في التغذية على مخلفات المحاصيل الحقلية المختلفة بنسبة 75 % و25 % على المركزات. وهي في حالة تناقص نتيجة التهجين بالأبقار المستوردة، قابلة للتأقلم وتستجيب للتحسين الوراثي.

بقرة محلية

الصفات الشكلية:

يسود اللون البني الفاتح غالبية هذه السلالة، بما فيها لون الوجه ، الرأس متوسطة الحجم ومستقيمة المقطع، القرون متوسطة الطول في كلا الجنسين وأقصر وأصغر عند الإناث، والأذنان قصيرتان ومنتصبتان. الارتفاع عند الغارب نحو 115 سم للذكور، و 101 سم للإناث، يتراوح طول الجسم المستقيم بين77 و 96 سم، في الذكور والإناث على التوالي.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الجسم للذكور تامة النمو 150 كغ، والإناث 130.8 كغ، ويقدر عمر البلوغ الجنسي بنحو 24 شهراً، يمتد موسم التناسل على مدار العام. العمر عند الولادة الأولى 29.3 شهر، والفترة بين ولادتين 13.5 شهر، متوسط

وزن الذكور عند الميلاد 13.8كغ والإناث 13.5 كغ. تفطم المواليد بعمر 3 أشهر ويصل وزن الذكور المفطومة إلى 50.8 كغ والإناث 45.5 كغ. معدل نمو العجول من الميلاد حتى الفطام 383 غ يومياً والعجلات 323 غ. تسوق بعمر 450 يوماً وبوزن نحو 120 كغ.

يبلغ متوسط إنتاج هذه الأبقار من الحليب 437.5 كغ بموسم إدرار طوله 175 يوماً وبنسبة دهن 5.28 % وبروتين 3.35% ولاكتوز 5 %. متوسط الإنتاج اليومي للبقرة من الحليب 2.5 كغ.

ثور محلي

الأبقار الظفاري

المنشأ والانتشار:

يتواجد أغلبها في منطقة ظفار في جنوب السلطنة وهي من نوع الظفاري الجبلي. وتنتشر في المنطقة الجبلية. تربى هذه الأبقار بصورة شبه مكثفة بنسبة 96.3 %، ومكثفة 2.4 %، وسرحية 1.3 %. وحجم الحيازة في المتوسط 2.65 و3.93 و4.81 في النظام السرحي وشبه المكثف والمكثف على التوالي، يتركب القطيع من 14.8 ذكور و85.2 إناث، ويعتمد في تغذيتها على مخلفات المحاصيل الحقلية المختلفة بنسبة 75 % و25 % على المركزات وعلى مدار العام. وهي في حالة تناقص نتيجة التهجين بالأبقار المستوردة.

أنثى أبقار الظفارية

الصفات الشكلية:

يغلب اللون الأسود في هذه السلالة أو المبرقش، وكذلك لون الوجه، الرأس متوسطة الحجم ومستقيمة المقطع، القرون متوسطة الطول في كلا الجنسين وصغيرة وقصيرة لدى الإناث، الأذنان قصيرتان ومنتصبتان. متوسط الارتفاع عند الغارب نحو 142.8 سم للذكور، و 126.8 سم للإناث، ومتوسط طول الجسم المائل 145.5 سم للذكور و136.7 للإناث.

الصفات الإنتاجية:

ثنائية الغرض (لحم وحليب). يبلغ متوسط وزن الجسم للذكور تامة النمو 400 كغ، والإناث 247.6 كغ، ويتراوح العمر عند البلوغ الجنسي بين 18 - 24 شهراً، يمتد موسم التناسل على مدار العام. العمر عند الولادة الأولى 29 - 34 شهراً،

والفترة بين ولادتين 13.5 شهر، متوسط وزن الذكور عند الميلاد 17.1 كغ والإناث 16.3 كغ. تفطم المواليد بعمر 3 أشهر ويصل وزن الذكور المفطومة إلى 84.4 كغ والإناث 81.8 كغ. معدل نمو العجول من الميلاد حتى الفطام 283 غ يومياً والعجلات 322 غ.

يبلغ متوسط إنتاج هذه الأبقار من الحليب 437.5 كغ بموسم إدرار طوله 189 يوماً وبنسبة دهن 4.94 % وبروتين 5.27 % ولاكتوز 2.9 %. متوسط الإنتاج اليومي للبقرة من الحليب 2 كغ.

أنثى أبقار الظفارية

عروق الأبقار
في
جمهورية السـودان

أبقار البقّارة

المنشأ والانتشار:

تنحدر أبقار البقّارة من أبقار الزيبو الآسيوية من الهند عبوراً إلى الجزيرة العربية وإفريقيا، وتنتشر غرب السودان وتشكل نحو 6.3 % من أبقار السودان، وترعى وفق النظام السرحي بحيازة بين 100 - 150 رأساً وبتراكيب قطيع متنوعة وفق الرعاية التقليدية.

أنثى أبقار البقارة

الصفات الشكلية:

متوسطة الحجم، متعددة الألوان،(الأبيض، أو الأحمر، أو الأصفر، أو الأسود الذي يتراوح بين الغامق والفاتح والمبقع مع ألوان قاتمة حول العينين). الرأس متوسطة الحجم ومستقيمة أو محدبة المقطع، الأذنان صغيرتان خلف قمة الرأس. القرون قصيرة وأحياناً منعدمة، اللبب متدلي قليل الدهن ذو ثنيات، خط الظهر مستقيم يتسع عند الفقرات القطنية. الذيل طويل يتدلى تحت العرقوب ذو شرابة كثيفة الشعر، القوائم الخلفية قليلة اللحم كثيرة العظم، الضرع صغير والحلمات سوداء اللون، الغارب نامي على شكل سنام عند الذكور والإناث.

الصفات الإنتاجية:

تهدف رعاية هذه الأبقار لإنتاج اللحم، ويبلغ متوسط وزن الذكور عند البلوغ 350 كغ، وقد تصل بعض ذكور التلقيح (طلائق) إلى 600 كغ. أما الإناث فيتراوح وزنها مابين 245 - 274 كغ.

يبلغ متوسط العمر عند أول ولادة نحو 13 شهراً، متوسط وزن الميلاد للذكور 24 كغ، وللإناث 21 كغ، وزن الذكور عند الفطام 120 كغ، والإناث 112 كغ، الفترة بين ولادتين 447 يوماً.

تستجيب الأبقار للتسمين على العلائق المركزة ويتراوح نموها اليومي بين 1010 - 1175 غ في محطات البحوث. وأقل من ذلك بكثير في النظم التقليدية، ويبلغ معدل النمو اليومي 250 غ. يبلغ وزن الذبيحة نحو 158 كغ وبنسبة تصافي 53 % وتشافي 77.3 %.

تنتج الأبقار 1.8 كغ حليب يومياً بموسم إدرار 200 يوم في مراكز البحوث، ويكون الإنتاج اليومي من الحليب أقل من ذلك بكثير تحت نظم الرعاية التقليدية.

ذكر أبقار البقارة

أبقار الكِنانة

المنشأ والانتشار:

تنحدر أبقار الكِنانة من أبقار الزيبو الآسيوية. وتنتشر على الضفة الغربية من نهر النيل الأزرق في المنطقة الممتدة من سنار شمالاً حتى ولايات أعالي النيل جنوباً وتسمى هذه الأبقار محلياً (الرفاعة، الفونج) وتمثل نحو 38 % من أبقار السودان. وترعى وفق النظام السرحي وشبه المكثف وبحيازة 50 - 100 رأسٍ وبتراكيب قطيع متنوعة حسب النظام التقليدي السائد.

ذكر أبقار الكنانة

الصفات الشكلية:

كبيرة الحجم، اللون رمادي فضي يكون داكناً عند الأطراف ويميل الذيل للسواد، لون المواليد بني فاتح يتحول خلال 4 أشهر إلى رمادي. الرأس طويلة والجبهة عريضة. مقطع الرأس محدبة للإناث، ومستقيمة أو مقعرة للذكور، الأذنان كبيرتان نسبياً، العينان محاطتان بهالة سوداء، القرون قصيرة، اللبب جيد النمو غير دهني وله ثنيات عند الذكور والإناث، ينمو الغارب على شكل سنام ويكون عند الذكور (الطلائق) أكبر مما هو عليه عند الإناث، يتدلى الذيل تحت العرقوب وينتهي بشرابة طويلة كثيفة الشعر، القوائم طويلة ونحيفة، الضرع كروي الشكل وجيد التكوين، والحلمات لحمية اللون متوسطة الطول.

الصفات الإنتاجية:

تعد هذه الأبقار ثنائية الغرض (لحم، حليب)، العمر عند البلوغ 18 شهراً، تزن الذكور تامة النمو 400 كغ، والإناث 350 كغ. العمر عند أول ولادة 40 شهراً، الفترة بين ولادتين 400 يوم، وزن المواليد الذكور بالمتوسط 23 كغ، والإناث 21كغ، يصل وزن الذكور عند الفطام إلى 52كغ، والإناث 44 كغ.

معدل النمو اليومي 470 غ للذكور و440 غ للإناث، عمر التسويق 730يوماً بوزن 335 كغ. وزن الذبيحة 186كغ، نسبة التصافي 55.5 %، والتشافي 81.7 %.

تنتج الأبقار يومياً 7.5 كغ حليب تحت نظام الرعاية المكثف في مراكز البحوث وبموسم إدرار طوله 383 يوماً وعند تقديم عليقة مركزة. أما تحت نظم الرعاية التقليدية السائدة فتنتج الأنثى 2.3 كغ حليب فقط.

أنثى أبقار الكنانة

أبقار البُطانة

المنشأ والانتشار:

تنحدر أبقار البُطانة من أبقار الزيبو الآسيوية، وتنتشر في المثلث الذي يحده شرقاً نهر عطبرة وغرباً النيل الأزرق ونهر النيل، وفي المنطقة الشمالية لمحافظة كسلا ودلتا القالش. وتشكل أبقار البطانة نحو 8.7 % من أبقار السودان وترعى وفق نظام الرعاية السرحي وشبه المكثف، وبحيازة 50 - 100 رأس. وبتراكيب متنوعة للقطعان.

ذكر أبقار البطانة

الصفات الشكلية:

الأبقار كبيرة الحجم، اللون أحمر غامق أو فاتح، وأصفر فاتح في بعض أجزاء الجسم، وتوجد بعض العلامات السوداء حول العنق والكتف والسنام والقوائم أحياناً ، الضرع كروي الشكل وصغير وأبيض اللون، الرأس متناسقة مع الجسم ضيقة بين العينين ومحدبة المقطع، الأذنان كبيرتان نسبياً، يتراوح طولها بين 15 - 20 سم، القرون قصيرة ورفيعة ومعدومة أحياناً عند بعض الإناث، اللبب متوسط النمو قليل الثنايا. الجسم طويل قليل اللحم وغير عميق. ارتفاع الغارب عند الذكور 136 - 140 سم، والإناث 126 سم. الذيل طويل يتدلى إلى تحت العرقوب ذو شرابة كثيفة الشعر، القوائم الخلفية طويلة وضعيفة وقليلة اللحم.

الصفات الإنتاجية:

ثنائية الغرض (لحم، حليب). وزن الذكور عند البلوغ 117 كغ والإناث 110 كغ، متوسط وزن المواليد الذكور 26 غ، والإناث 24 كغ. تزن الذكور المفطومة 50 كغ، والإناث 48 كغ، ويقدر معدل النمو اليومي بنحو 200 غ، ويصل وزن الأبقار تامة النمو بالمتوسط 300 كغ والذكور 400 كغ.

العمر عند الولادة الأولى 44 شهراً. الفترة بين ولادتين 416 يوماً، عمر التسويق 365 يوماً، وزن التسويق 195 كغ، ويبلغ معدل النمو اليومي حتى التسويق 867 غ، وزن الذبيحة 99 كغ، نسبة التصافي 52 % والتشافي 80 %، تنتج الأبقار يومياً 5.5 كغ حليب.

أنثى أبقار البطانة

أبقار التابوزا، المورلي

المنشأ والانتشار:

تنتمي لأبقار الزيبو في جنوب السودان وتقوم برعايتها قبائل التابوزا والمورلي، ويمتد انتشارها من شمال بحيرة رودلف جنوباً وحتى نهر البيبور شمالاً وتختلط مع السلالات الأثيوبية والكينية وهي أقل حجماً من أبقار التابوزا.

ثور التابوزا

الصفات الشكلية:

متباينة نتيجة اختلاطها مع أبقار السانقا النيلية من جهة وأبقار الدول المجاورة (كينيا وأثيوبيا). وهي أبقار كبيرة الحجم مقارنة بالأبقار النيلية.

ألوانها متعددة (الأسود والأبيض والرمادي والمبقع الأسود بالأبيض). الرأس متوسطة الحجم والمخطم عريض، الجبهة طبقية الشكل بين العينين، طول الآذان نحو 30 سم، القرون متوسطة الطول، هلالية الشكل في التابوزا لاتزيد عن 30 سم وتمتد للأمام ثم للأعلى في المورلي، السنام هرمي وهو فوق الغارب، اللبب متوسط الحجم. الارتفاع عند الغارب 115 سم.

الصفات الإنتاجية:

تعد من أبقار اللحم ومساهمتها في الاستهلاك المحلي والتصدير محدودة. يقدر وزن الأنثى بنحو 240 كغ، ووزن الذكر يصل إلى 400 كغ.

ثور المورلي

أبقار مَنقلا

المنشأ والانتشار:

تنتمي هذه السلالة لأبقار الزيبو في جنوب السودان وتعرف بأبقار جنوب السودان الجبلية، وتنتشر في المنطقة الغربية لأبقار التابوزا –مورلي، حول بحر الجبل، وتقوم برعايتها قبائل منقلا.

الصفات الشكلية:

أبقار صغيرة الحجم، الألوان فيها متعددة، وهي جيدة اللحم، الارتفاع عند الغارب 100 و 150سم للإناث والذكور على التوالي. الرأس قصيرة، القرون قصيرة 20 - 30 سم وتمتد للأمام ثم للأعلى، اللبب متوسط، الجسم عميق.

الصفات الإنتاجية:

تعد من أبقار اللحم، ويبلغ الوزن في المتوسط 150 كغ ومساهمتها الإنتاجية محدودة.

أبقار جبال النوبة

المنشأ والانتشار:

تنتمي هذه الأبقار إلى مجموعة أبقار الزيبو شمال السودان وتنتشر في جبال النوبة في الوسط. وقد اختلطت مع أبقار البقارة نتيجة الترحال.

الصفات الشكلية:

أبقار صغيرة الحجم، ذات ألوان متعددة، الرأس قصيرة، عريضة المخطم، القرون قصيرة، اللبب جيد النمو، الارتفاع عند الغارب 90 - 115 سم، وعند العجز 97 سم.

الصفات الإنتاجية:

أبقار لحم، إنتاجها من الحليب منخفض لايتعدى 1.5 كغ في اليوم وهي مقاومة لذبابة التسي تسي، لاتتوافر عنها معلومات أخرى.

أبقار السانقا النيلية

الموطن والانتشار:

تعد من أقدم الأبقار السودانية، تنتمي للأبقار طويلة القرون، ويعتقد بأنها ليست نيلية أصيلة إذ تبدو أصغر حجماً وفيها نسبة عالية من دم الزيبو الهندي، وتنتشر حول النيل وروافده في محافظة بحر الغزال، وتسمى بأسماء القبائل التي تقوم برعايتها (الدينكا، نوير، الشلك).

الصفات الشكلية:

متوسطة الحجم بشكل عام، متعددة الألوان كالأبيض (ميبور أو مجوك) الأحمر، البني، الأسود والأصفر. تختلف باختلاف البيئة، بعضها ذو تكوين جسماني ممتلئ باللحم وبعضها سيء التكوين طويل القوائم. القرون طويلة في أبقار الدينكا وتعطيها القبائل أهمية خاصة. وهناك حيوانات قصيرة القرون 30 - 40 سم وأخرى عديمة القرون وربما كان ذلك نتيجة الخلط بالسلالات الأخرى.

الصفات الإنتاجية:

البيانات غير متوفرة بشكل دقيق، ولكن الدراسات أشارت الى ان النضج الجنسي يحدث بعمر 40 - 45 شهراً والعمر عند أول ولادة 49 - 54 شهراً، ومتوسط فترة الحمل 285 يوماً، والفترة بين حملين 115 يوماً، والفترة بين ولادتين 400 يوم، وتتوزع الولادات على فصول السنة المختلفة، وقد يعزى ذلك إلى توفر الغذاء في هذه المنطقة عالية الرطوبة.إنتاج الحليب منخفض يقدر بنحو 606 كغ في موسم إدرار طوله 274 يوماً في محطات البحوث في أحسن الظروف. أما في الظروف العادية ووفق نظام الرعاية التقليدي لايتجاوز الإنتاج السنوي 164 كغ من الحليب.

الأبقار الهجينة

المنشأ والانتشار:

هي أبقار ناتجة عن إدخال ثيران استوردت من دول مختلفة منذ عام 1970 لاستعمالها في تهجين الأبقار المحلية وبخاصة أبقار البطانة. وتنتمي الثيران المستوردة إلى عروق الفريزيان، الايرشاير، الجرسي، الشورتهورن، وتنتشر الأبقار الهجينة في محافظة الخرطوم، وكسلا.

ثور هجين محلي

الصفات الشكلية:

تجمع الأبقار الهجينة بين الصفات الشكلية لأبقار البطانة المحلية والثيران المستخدمة في الهجين وهي ثيران الفريزيان، والايرشاير، والجرسي، والشورتهورن.

الصفات الإنتاجية:

تبلغ الفترة بين ولادتين 413 يوماً، مدة الحمل بالمتوسط 276 يوماً، ويتراوح طول موسم الإدرار بين 263 - 280 يوماً، ويكون إنتاج الأبقار الهجينة تبعاً لنسبة الدم المحلي بين 2457 كغ، و2292 كغ حليب حسب نسبة الخلط الحاصل مقارنة مع 1487 كغ حليب في موسم حلابة طوله 280 يوماً للأبقار المحلية.

عروق الأبقار
في
الجمهورية العربيـــــة الســـورية

الأبقار الشامية

المنشأ والانتشار:

تنحدر هذه الأبقار من عرق الزيبو الآسيوي، ويطلق عليها (الأبقار الشامية)، وموطنها الأصلي غوطة دمشق، وانتشرت إلى مختلف مناطق سورية، وفلسطين، والأردن. وتتواجد بكثافة واضحة في ريف دمشق، وحول مدينة دمشق، وإدلب، والرقة، ودير الزور ، وقد تعرضت للتحسين الوراثي (التدريج مع عرق الفريزيان) لذلك قلت أعدادها بشكل كبير، ففي عام 1978 كانت أعدادها نحو 85359 رأساً، وقد انخفضت لتصبح عام 2007 نحو 1549 رأساً.

تتم رعاية هذه الأبقار تحت النظام المكثف في المحطات التابعة للدولة وبنسبة 10 % ، في حين تتم رعاية 90 % تحت النظام الهامشي (على هامش المزرعة) وبحيازة 5 - 15 رأساً.

يتركب القطيع من 40 % نامي، و60 % منتج، ونسبة الذكور في القطيع المنتج 3 % وفي النامي 23 %، وتتغذى على مخلفات المحاصيل بنسبة 50 % لمدة 180 يوماً، وعلى المركزات بنسبة 50 % على مدار العام.

ثور الأبقار الشامية

الصفات الشكلية:

حجم الأبقار كبير، اللون قرميدي إلى بني غامق، الرأس طويلة ونحيفة ومتوسطة الحجم ذات مقطع مستقيم، القرون ذات أشكال مختلفة تختفي أحياناً. الآذان متوسطة الحجم أفقية، الجسم مستقيم يتقعر في الوسط طوله 173

سم للذكور، و162 سم للإناث، محيط الصدر 207 سم للذكور، و184 سم للإناث. اللبب كبير نسبياً ذو ثنيات، القوائم طويلة ونحيفة، قمة الذيل غليظة ومرتفعة، الضرع كبير الحجم جيد الشكل، الحلمات متباعدة وغليظة وتتواجد حلمات زائدة أحياناً، الهيكل العظمي ضخم.

الصفات الإنتاجية:

وزن الذكور البالغة 340 كغ، والإناث 290 كغ، وتتأخر الحيوانات بالوصول للنضج الجنسي حيث تصل للبلوغ بعمر 14 شهراً، وتلقح الإناث بوزن 345 كغ وبعمر 17 شهراً . العمر عند أول ولادة 27 شهراً، نسبة التوائم 2 %. الفترة مابين ولادتين 12 شهراً، وزن المواليد الذكور 29 كغ، والإناث 26 كغ، وزن الفطام للذكور 80 كغ، والإناث 74 كغ، معدل النمو اليومي حتى الفطام 600 غ للذكور و500 غ للإناث.

بقرة شامية بالغة

يتم تسويق العجول بعمر 550 يوماً وبوزن 400 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 400 غ، وزن الذبيحة 216 كغ، بنسبة تصافي 54 % وتشافي 75 %. وتعد هذه السلالة من سلالات الحليب ولكنها تحتاج إلى تحسين في مجال إنتاج الحليب عن طريق الانتخاب، وتنتج الأبقار بالمتوسط 2200 كغ حليب بموسم إدرار طوله 192 يوماً وبمعدل يومي 11 كغ.
يتركب الحليب من 12.8 % مواد صلبة كلية، 3.8 % دهن، 3.8 % بروتين، 4 % لاكتوز.

الأبقار العكشية

المنشأ والانتشار:

الموطن الأصلي بلاد الشام، وتمثل نحو 9 % من الأبقار السورية وتنحدر من عرق الزيبو الآسيوي، ذات مقدرة جيدة على تحمل ظروف الرعاية والغذاء القاسية. وهي في تناقص مستمر نتيجة عمليات الخلط والتهجين. يشكل القطيع المنتج 68 % من القطيع الكلي وبنسبة ذكور 21 %، بينما يشكل القطيع النامي 32 % وبنسبة ذكور 2 %. وتتغذى هذه الأبقار على 33 % مراعي طبيعية، و 33 % مخلفات محاصيل، و 34 % مركزات علفية.

الأبقار العكشية

الصفات الشكلية:

الحجم متوسط للذكور وصغير للإناث، اللون أشقر إلى بني غامق، وأسود ورمادي أحياناً ونادراً أبيض. الرأس متوسطة الحجم بشكل مستطيل طوله ضعف عرضه تقريباً، الجبهة مستقيمة، القرون قصيرة للإناث والذكور، الآذان جانبية ، الجسم مقعر في الوسط، الحوض ضيق، الكرش صغير، المفاصل بارزة، طول الجسم 145 سم للذكور و115 سم للإناث، محيط الصدر 165 سم للذكور، و 150 سم للإناث، عمق الصدر 66 سم للذكور، و 59 سم للإناث. الارتفاع عند الغارب 126 سم للذكور، و 112 سم للإناث، القوائم نحيفة وقوية تلاءمت للسير في المناطق الجبلية الوعرة.

الصفات الإنتاجية:

تتم رعاية الأبقار العكشية بهدف الحصول على اللحم والحليب، وزن الذكور البالغة 235 كغ، والإناث 210 كغ. العمر عند البلوغ للذكور 18 - 20 شهراً، وللإناث 11 - 16 شهراً. معدل الولادات مرة في العام.

الوزن عند التلقيح الأول 230 كغ، يمتد التناسل على مدار العام. العمر عند أول ولادة 18 - 24 شهراً، الفترة بين ولادتين 12 شهراً، وزن الذكور عند الميلاد 21 كغ، والإناث 19 كغ، وزن الفطام للعجول 65 كغ، والعجلات 55 كغ، ومعدل النمو اليومي للعجول 500 غ وللعجلات 400 غ، وتسوق العجول بعمر 750 يوماً وبوزن 350 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 550 غ، ووزن الذبيحة 200 كغ بنسبة تصافي 57 %، وتشافي 79 %.

تنتج الأبقار بالمتوسط 900 كغ حليب بموسم إدرار طوله 155 يوماً وبإنتاج يومي 6 كغ. يتكون الحليب من 12.3 % مواد صلبة كلية، نسبة الدهن 4.3 %، والبروتين 3.7 %، واللاكتوز 3.4 %.

الأبقار الجولانية

المنشأ والانتشار:

تتحدر من عرق الزيبو الآسيوي، موطنها الأصلي بلاد الشام ، تتم رعايتها وفق النظام السرحي، وهي في تناقص نتيجة التهجين، حجم الحيازة 5 - 50 رأساً، ويتركب القطيع من 22 % ذكور و 78 % إناث، يشكل القطيع النامي 32 % وبنسبة ذكور 2 %، بينما يشكل القطيع المنتج 68 % وبنسبة ذكور 21 %. تتغذى هذه الأبقار على المراعي الطبيعية، ومخلفات المحاصيل، وتشكل المركزات نسبة 33 % من الغذاء.

ذكر الأبقار الجولانية

الصفات الشكلية:

الحجم متوسط، اللون أسود غالباً والأسود المبقع بالأبيض أو الأحمر الداكن أحياناً، الرأس متوسطة الحجم مستطيلة الشكل ذات جبهة مستقيمة، القرون قصيرة، الآذان قصيرة وجانبية، متوسط طول الجسم في الذكور 138 سم، وأقل في الإناث 112 سم، محيط الصدر 165 سم للذكور و150 سم للإناث، عمق الصدر 60 سم للذكور، و50 سم للإناث، الارتفاع عند الغارب 122 سم للذكور، و110 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

تتم رعاية الأبقار الجولانية بهدف إنتاج اللحم والحليب، تزن الذكور البالغة 242 كغ، والإناث البالغة 215 كغ.
عمر البلوغ الجنسي للذكور 18 - 20 شهراً، والإناث 11 - 16 شهراً، يمتد التناسل على مدار العام. الوزن عند التلقيح

230 كغ. معدل الولادات مرة واحدة بالعام. العمر عند الولادة الأولى 18 - 24 شهراً، الفترة بين ولادتين 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 21 كغ، والإناث 19كغ.
وزن الذكور المفطومة 52 كغ، والإناث 46 كغ. معدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور 600 غ، وللإناث 450 غ.
تسوق العجول للذبح بعمر750 يوماً وبوزن 350 كغ، معدل النمو اليومي حتى التسويق 550 غ. وزن الذبيحة 215 كغ بنسبة تصافي 54 % وتشافي 80 %.
يتراوح إنتاج الأبقار من الحليب بين 900 - 1400 كغ، بموسم إدرار 155 يوماً وبإنتاج يومي 6 - 8 كغ، يتكون الحليب من 11.6 % مواد صلبة كلية، بنسبة دهن 3.9 %، وبروتين 3.5 % ولاكتوز 3.4 %.

أنثى الأبقار الجولانية

الأبقار الهجينة

المنشأ والانتشار:

وهي الأبقار الهجينة الناتجة عن مشروع التدريج الذي قامت به الدولة لتحسين السلالات المحلية (الشامي الجولاني، والعكشي) بالتهجين مع سلالة الهولشتاين فريزيان المستوردة بأشكاله المختلفة. وشمل هذا المشروع كافة المحافظات السورية، وتشكل هذه الأبقار المهجنة نحو 85 % من الأبقار في سورية، وهي في تزايد مستمر.

ذكر الأبقار الهجينة

وتتم رعاية هذه الأبقار بنظام شبه مكثف بنسبة 10 % وبحيازة 5 - 10 رؤوس، وعلى هامش المزارع بنسبة 90 % وبحيازة 2 رأس. وتتغذى على مخلفات المحاصيل الزراعية بنسبة 50 % والمركزات بنسبة 50 %. ويشكل القطيع النامي 30 % (15 %ذكور و15 % إناث) في حين يشكل القطيع المنتج 70 % (56 % إناث و14 % ذكور).

الصفات الشكلية:

الحجم متوسط، اللون أسود وأبيض أو أبيض وأحمر، مع بقعة بيضاء مثلثة الشكل على الجبهة، الرأس كبيرة الحجم ذات مقطع محدب، القرون تتواجد عند الذكور والإناث وهي أقصر عند الإناث، الرقبة متوسطة الطول وهي أقصر عند الإناث. الآذان جانبية قصيرة إلى متوسطة، القوائم غليظة وقوية، الجسم مستقيم، طوله عند الذكور 155 سم، وعند الإناث 145 سم، محيط الصدر 185 سم للذكور و 170 سم للإناث، عمق الصدر 72 سم للذكور و 79 سم للإناث، الارتفاع عند الغارب 123 سم للذكور، و115 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

تزن الذكور البالغة 375كغ، والإناث 325 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 15 شهراً، يمتد موسم التناسل على مدار العام. الوزن عند التلقيح 350 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 27 شهراً، ونسبة التوائم 1 % والفترة بين ولادتين 11.5 شهر، ومتوسط وزن الذكور عند الولادة 35 كغ، والإناث 30 كغ. متوسط وزن الذكور المفطومة 77 كغ، والإناث 75 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى الفطام 500 غ لكل من الإناث والذكور.

تسوق العجول للذبح بعمر سنة وبوزن 375 كغ. معدل النمو اليومي حتى التسويق 800 غ. وزن الذبيحة 180كغ، بنسبة تصافي 51 %، وتشافي 83 %. تنتج الإناث بالمتوسط 3000 كغ حليب بموسم إدرار طوله 260 يوماً.

أنثى الأبقار الهجينة

عروق الأبقار
في
جمهورية العـــراق

أبقار الكرادي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزء الشمالي الشرقي من العراق في المناطق الجبلية، وانتشرت في محافظات السليمانية، وأربيل، ودهوك، يطلق عليها محلياً اسم (كوجي) ومعناه صغيرة الحجم.

تتم رعايتها وفق النظام السرحي بنسبة 90 % وبحيازة 2 - 10 رؤوس ووفق النظام شبه المكثف بنسبة 10 % وبحيازة 10 - 50 رأساً.

يتركب القطيع النامي من 50 % لكل من الذكور والإناث، والقطيع المنتج 10 % ذكور، و90 % إناث. وتعتمد هذه الأبقار في تغذيتها على الرعي بنسبة 70 % ومخلفات المحاصيل بنسبة 20 %، والمركزات بنسبة 10 %.

أنثى أبقار الكرادي

الصفات الشكلية:

أبقار صغيرة الحجم، اللون أسود مائل إلى البني الغامق، وبعضها بلون رمادي أو أملح، الرأس متوسطة الحجم ذات جبهة مقوسة قليلاً، القرون لدى الجنسين قصيرة غالباً ومتوسطة الطول مقوسة أحياناً.

الأذنان قصيرتان جانبيتا التوضع، الرقبة قصيرة ذات لبب صغير، الجسم مستقيم والظهر عريض نسبياً. طول الجسم المائل 150 سم للذكور و130 سم للإناث. محيط الصدر 95 - 100 سم عمق الصدر 75 - 80 سم، الارتفاع عند الغارب 145سم و 130 سم لكل من الذكور والإناث على التوالي. الضرع صغير جداً وبأشكال مختلفة وملتصق بالبطن، الحلمات قصيرة ورفيعة.

الصفات الإنتاجية:

تستغل هذه الأبقار لإنتاج اللحم والحليب، وزن المواليد الذكور 14.5 كغ والإناث 13.5 كغ، تصل الذكور إلى 50 كغ عند الفطام، والإناث إلى 40 كغ، وبمعدل نمو يومي حتى الفطام 600 غ للذكور و 500 غ للإناث. العمر عند البلوغ الجنسي 16 شهراً، وتلقح الإناث بوزن 120 كغ، والعمر عند أول ولادة 24 شهراً، ويمتد التناسل على مدار العام.

الفترة بين ولادتين 405 أيام . وزن الذكور البالغة 220 كغ والإناث 208 كغ.

يتم تسويق العجول للذبح بوزن 150 كغ وبعمر 360 يوماً، ويتراوح معدل النمو اليومي حتى التسويق 400 - 500 غ.

الإنتاج الكلي للحليب 1050كغ في موسم إدرار طوله 270 يوماً في أحسن الأحوال. تنتج البقرة يومياً 2 - 4 كغ، ويتركب الحليب من 11.5 % مواد صلبة كلية، 5.5 % دهن، 3.5 % بروتين، و4.5 % لاكتوز.

ذكر أبقار الكرادي

أبقار الجنوبي

المنشأ والانتشار:

لا يعرف موطنها الأصلي بالضبط ويعتقد أنه البصرة. وتنتشر هذه الأبقار في جنوب ووسط العراق. تتم رعايتها تحت النظام السرحي بنسبة 70 % وبحيازة 10 - 50 رأساً، وتحت النظام شبه المكثف بنسبة 20 % والمكثف بنسبة 10 %.

يتركب القطيع النامي من 50 % لكل من الذكور والإناث. والقطيع المنتج 93 % ذكور و7 % إناث وتعتمد هذه الأبقار في تغذيتها على الرعي بنسبة 40 % ومخلفات المحاصيل بنسبة 50 %، والمركزات بنسبة 10 %، وهي في تناقص نتيجة التهجين والخلط بالعروق الأخرى.

ذكر أبقار الجنوبي

الصفات الشكلية:

اللون أحمر غامق يميل إلى البني في الذكور وإلى الأصفر الفاتح في الإناث، وتتميز بوجود سنام واضح في الذكور وصغير في الإناث، ووجود لبب واضح في الثيران.

الرأس متوسطة وتختلف باختلاف الأفراد، فهي طويلة ورفيعة في البعض، وعريضة في البعض الآخر. العيون واسعة ذات أهداب سوداء أو بنية محمرة. الأذنان طويلتان شبه منتصبتين، القرون قصيرة في كلا الجنسين وتتجه للخارج. الرقبة قصيرة في الذكور وطويلة نسبياً في الإناث، محيط الصدر 100 - 120 سم، عمق الصدر 70 و 80 سم لكل من الذكور والإناث على التوالي. الجسم الكامل قصير طوله 180 سم للذكور، و 160 سم للإناث. الارتفاع عند الغارب

160 سم ذكور و150 سم إناث، القوائم طويلة ونحيفة، الذيل طويل ذو ضفيرة بيضاء أو بنية محمرة، الضرع صغير، الحلمات صغيرة متناسقة الشكل.

الصفات الإنتاجية:

تربى هذه الأبقار لإنتاج اللحم والحليب معاً، وزن الذكور عند الولادة 21.8 كغ، والإناث 20 كغ، وتصل الذكور لوزن 60 كغ، والإناث إلى 55 كغ، بمعدل نمو يومي حتى الفطام 550 غ للذكور و520 غ للإناث. العمر عند البلوغ الجنسي 20 شهراً للإناث، وزن الذكور تامة النمو 315 كغ والإناث 306 كغ، وزن الإناث عند التلقيح 200 كغ. ويمتد التناسل على مدار العام. تسوق العجول للذبح بعمر 12 شهراً وبوزن 150 كغ، معدل النمو اليومي حتى التسويق 250 غ، وزن الذبيحة 100كغ، نسبة تصافي الذبيحة 55 %، والتشافي 75 %. إنتاج الحليب الكلي 1400كغ للبقرة، وبموسم إدرار طوله 300يوم والإنتاج اليومي 4.6 كغ، ويتكون الحليب من 11.5 % مواد صلبة كلية، 4.6 % دهن، 4.1 % بروتين، و4.5 % لاكتوز.

أنثى أبقار الجنوبي

أبقار الشرابي

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنها جاءت من بلاد الأناضول (تركيا) وانتشرت في المناطق الشمالية الغربية من نهر دجلة في محافظة نينوى قضاء زُمّار والقرى التابعة له، ومحافظة دهوك والقرى التابعة لها (باشاي، خبان، روتك، جديدة، دبرج) وأعداد محدودة في محافظة الموصل.

ذكر أبقار الشرابي

تتم رعايتها وفق نظام سرحي بنسبة 90 % وبحيازة 2 - 10رؤوس. ونظام شبه مكثف بنسبة 10 % وبحيازة 10 – 50 رأساً. يتركب القطيع النامي من 50 % لكل من الذكور والإناث والمنتج 93 % إناث و7 % ذكور، وتعتمد هذه الأبقار في تغذيتها على المراعي بنسبة 30 % ومخلفات المحاصيل بنسبة 60 % والمركزات 10 %.

الصفات الشكلية:

اللون الغالب هو الأسود مع وجود خط أبيض (عريض أحياناً) على طول الظهر والبطن والصدر ويشمل اللون الأبيض الرأس أيضاً. وتوجد بعض الأفراد بلون أبيض أو أسمر مبقع بالأسود، وتنتشر البقع في كافة أنحاء الجسم.
الرأس قصيرة وكبيرة نسبياً مقارنة بالأبقار المحلية الأخرى. الفك السفلي عريض، القرون لدى الجنسين قصيرة، الأذنان قصيرتان منتصبتان إلى الخلف. الرقبة قصيرة وعميقة مع وجود لبب كبير في الذكور وأصغر عند الإناث. الجسم طويل، والظهر مقعر قليلاً في الوسط. طول الجسم المائل 190 سم للذكور، و170 سم للإناث، محيط الصدر

200 سم للذكور و150 سم للإناث. الارتفاع عند الغارب 180 سم و160 سم لكل من الذكور والإناث على التوالي. القوائم قصيرة نسبياً، الضرع كروي الشكل وكبير نسبياً مقارنة بالسلالات المحلية الأخرى وغير متدلي، الحلمات كبيرة نوعاً ما.

الصفات الإنتاجية:

تهدف رعاية هذه الأبقار للحصول على اللحم والحليب، وزن المواليد الذكور 21.8 كغ، والإناث 20 كغ، وزن الذكور عند الفطام 60 كغ، والإناث 55 كغ.

النمو اليومي 550 غ للذكور و520 غ للإناث، عمر البلوغ 20 شهراً، وزن الذكور تامة النمو 315 كغ والإناث 306 كغ. يمتد التناسل على مدار العام، معدل الوزن عند التلقيح 200 كغ، العمر عند الولادة الأولى 37 شهراً، طول الفترة بين ولادتين 400 يوم.

أنثى أبقار الشرابي

عمر تسويق العجول للذبح 12 شهراً، وزن التسويق 150 كغ، معدل النمو اليومي حتى التسويق 250 غ، وزن الذبيحة 100كغ، نسبة تصافي الذبيحة 55 %.

تنتج الأبقار بالمتوسط 1400 كغ بموسم إدرار طوله 300 يوم وبمعدل يومي 4.5 كغ، يتركب الحليب من 11.5 % مواد صلبة كلية ، 4.1 % دهن، 4.6 % بروتين، 4.5 % لاكتوز.

أبقار الرستاكي

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنها نشأت في منطقة الفرات الأوسط وانتشرت في محافظات المنطقة الوسطى من العراق، محافظتي بابل وواسط، وذات أعداد محدودة حول المدن الكبيرة وتواجدها أقل من السلالات الأخرى. وأعدادها في تناقص نتيجة الخلط بالسلالات الأخرى، تتم رعايتها وفق نظام سرحي بنسبة 60 % وبحيازة 5 - 50 رأساً، وشبه مكثف بنسبة 20 % ومكثف بنسبة 20 %.

ذكر أبقار الرستاكي

يتركب القطيع النامي بنسبة 50 % للذكور والإناث. والقطيع المنتج بنسبة 10 % ذكور و90 % إناث وتعتمد هذه الأبقار في تغذيتها على الرعي بنسبة 50 % ومخلفات المحاصيل بنسبة 40 % والمركزات 10 %.

الصفات الشكلية:

حجم الحيوانات كبير، اللون بني غامق مائل إلى الاحمرار الداكن أو الفاتح، وبعض الأفراد بلون أبيض أو أبيض مصفر مائل إلى الاسمرار. الرأس متوسطة الحجم، القرون صغيرة، الأذنان قصيرتان جانبيتان شبه منتصبتين، اللبب أسفل الرقبة، وسنام نامي في منطقة الغارب عند الذكور، محيط الصدر للذكور 100 سم، والإناث 90 سم، عمق الصدر للذكور 70 سم والإناث 60 سم، الارتفاع عند الغارب للذكور 140 سم والإناث 130 سم. القوائم طويلة، الضرع متوسط الحجم، الحلمات سوداء ومتوسطة الطول وسميكة.

الصفات الإنتاجية:

أبقار الرستاكي ثنائية الغرض (لحم، حليب)، متوسط وزن المواليد 20 كغ للذكور، و 18 كغ للإناث. يبلغ وزن الذكور عند الفطام كغ والإناث 40 كغ، بمعدل نمو يومي 550 غ و 450 غ للذكور والإناث على التوالي.

العمر عند البلوغ الجنسي 20 شهراً، يصل وزن الذكور البالغة إلى 400 كغ والإناث إلى 350 كغ، ويمتد التناسل على مدار العام. الوزن عند التلقيح 200 كغ ، العمر عند الولادة الأولى 30 شهراً، الفترة بين ولادتين 405 أيام. ومعدل الولادات مرة في العام.

أنثى أبقار الرستاكي

وزن الذبيحة لعجول التسويق 100 كغ بنسبة تصافي 55 % وتشافي 80 %.يبلغ إنتاج الحليب الكلي 1200 كغ بموسم إدرار طوله 288 يوماً وبمعدل يومي 3 - 5 كغ. ويتركب الحليب من 11 % مواد صلبة كلية، 4.9 % دهن، 4.5 % بروتين، 4.5 % لاكتوز.

الأبقار الهجينة

المنشأ والانتشار:

وهي الأبقار الهجينة الناتجة عن خلط عرق الفريزيان المستورد مع إحدى السلالات المحلية (الأبقار الشرابية والأبقار الجنوبية) وتسمى محلياً (المضرب، المضربة، الأسود والأبيض)، وتنتشر في جميع أنحاء العراق بسبب انتشار التلقيح الاصطناعي للأبقار المحلية المختلفة من ثيران الفريزيان. وتتم رعاية هذه الأبقار الهجينة وفق نظم الرعاية السائدة في العراق.

الصفات الشكلية:

اللون أبيض وأسود وقد يلاحظ اللون الأحمر البني أو الأصفر مختلطاً بالأبيض. الرأس متوسطة الحجم بين المحلي والفريزيان. الجسم ممتلئ، البطن كبيرة، القوائم متوسطة الطول إلى طويلة خاصةً إذا كان التهجين مع أبقار الجنوبي المحلية، الضرع كبير إسفنجي، والحلمات طويلة.

الصفات الإنتاجية:

الأبقار الهجينة ثنائية الغرض (لحم، حليب)، وزن الهجين الناتج من (فريزيان x شرابي) بالمتوسط 34 كغ، ووزن الهجين الناتج من (فريزيان x جنوبي) بالمتوسط 26 كغ، وزن الهجن المفطومة وبعمر 140 يوماً 125و 114 كغ للذكور والإناث على التوالي. وعند عمر سنة تصل لوزن 200 كغ و 180 كغ للذكور والإناث على التوالي أيضاً.

الوزن عند تسويق العجول 325 كغ، فترة التسمين 120 - 150 يوماً، ومعدل النمو اليومي 850 غ، والوزن عند بدء التسمين 200 كغ، ووزن الذبيحة 169كغ، ونسبة التصافي 52 %، والتشافي 75 %.

تنتج الأبقار الهجينة من (فريزيان x شرابي) 1703 كغ حليب بموسم إدرار طوله 254 يوماً، أما الأبقار الهجينة الناتجة من (فريزيان x جنوبي) فتنتج 2244 كغ حليب بموسم إدرار طوله 254 يوماً .

عروق الأبقار
في
الجماهيرية
العربيـــــة
الليبيـــــة
الشـــعبية
الاشـتراكية
العظمـــى

أبقار الأطلس
في الجماهيرية الليبية

المنشأ والانتشار:

وسميت أيضاً الأبقار المحلية والوطنية. وانتشرت في ليبيا والمغرب العربي. تعيش تحت نظام الرعاية السرحي بنسبة 80 % وتحت نظام الرعاية شبه المكثف بنسبة 20 %، حجم الحيازة 20 - 50 رأساً. تتغذى على المراعي وبقايا المحاصيل والمركزات، وهي في تناقص مستمر، وقابلة للتحسين الوراثي، وتم خلطها مع الجرسي والفريزيان، وتمتاز بظاهرة الأمومة.

ثور الأطلس

الصفات الشكلية:

صغيرة الحجم، لون الجسم والوجه عند الإناث أحمر طوبي فاتح، وعند الذكور مائل للبني الداكن وبخاصة أسفل الجسم، الأذنان صغيرتان جانبيتا التوضع، القرون عند الجنسين هلالية الشكل، الرأس متوسطة الحجم ومستقيمة المقطع، الارتفاع عند الغارب للذكور 120 سم وللإناث 110 سم.

الصفات الإنتاجية:

متوســـط وزن الذكور تامة النمو 340 كغ، والإناث 380 كغ. نســـبة تصافي الذبيحة 45 %. يتراوح إنتـــاج الحليب مابين 300 - 600 كغ في موسم إدرار طوله 180 يوماً .

إناث أبقار الأطلس

عروق الأبقار
في
جمهورية موريتـانيا الإسلامية

أبقار الزيبو مور

المنشأ والانتشار:

يعتقد بأن أصلها الزيبو الهندي، وتشكل نحو 80 % من أبقار موريتانيا، وترعى هذه الأبقار في مناطق القبائل المرتحلة (قبائل المور)، وقد تأقلمت مع مناطق المراعي الفقيرة، وتتحمل المناطق الجافة حيث نقص الغذاء والماء والسير لمسافات طويلة، وعادة ماتسقى مرة كل يومين.

نظام الرعاية سرحي بنسبة 80 % وبحجم حيازة 80 رأساً وشبه مكثف بنسبة 20 % وبحيازة 40 - 50 رأساً ويشكل القطيع النامي 50 % من القطيع الكلي وبتركيب 31 % إناث و19 % ذكور والقطيع المنتج 50 % وبتركيب 47 % إناث و3 % ذكور.

أبقار الزيبومور

الصفات الشكلية:

الأبقار كبيرة الحجم، اللون في الغالب أحمر داكن وفي الغرب مختلط مع الأبيض والأسود وفي الشرق يختلط مع الأبيض، الجسم غير متناسق، الرأس طويلة وضيقة ذات مقطع مستقيم، القرون هلالية قصيرة مستديرة المقطع وأخف عند الإناث، لون القرون رمادي يميل أحياناً للبني. الرقبة رفيعة ومفلطحة متوسطة الطول، اللبب صغير نسبياً، ينمو الغارب على شكل سنام 20 سم عند الذكور وأصغر للإناث. الصدر طويل قليل العمق، الذيل رفيع مثبت في أعلى الكفل، الارتفاع عند الغارب 150 سم للذكور و140 سم للإناث. الضرع جيد التكوين والحلمات كبيرة، القوائم كبيرة غليظة وثخينة العظام.

الصفات الإنتاجية:

الأبقار ثنائية الغرض (لحم وحليب) يصل متوسط وزن الذكور 350 كغ والإناث 300 كغ، ومتوسط وزن المواليد 20 كغ للجنسين، ووزن الفطام 100 كغ للذكور و90 كغ للإناث، ومعدل النمو اليومي حتى الفطام 400 غ للذكور و340 غ للإناث. العمر عند البلوغ 36 شهراً، والوزن عند التلقيح 250 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 46 شهراً، والفترة بين ولادتين 18شهراً.

يتم تسويق العجول للذبح بعمر 900 يوم وبوزن 260 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 300 غ، ووزن الذبيحة 180 كغ بنسبة تصافي 42 %.

متوسط إنتاج الأبقار من الحليب 675 كغ بموسم إدرار طوله 225 يوماً، و تنتج البقرة 3 كغ حليب يومياً.

أبقار الزيبو بل

المنشأ والانتشار:

تنتسب إلى الفولاني كبير القرون المنتشر في دول غرب إفريقيا من السنغال إلى النيجر، وتنسب حسب الاسم إلى قبائل البل التي تعيش في مناطق الحدود المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال. وتنتشر على ضفاف الأنهار وشرق البلاد وقد أدخلت إلى وسط البلاد أيضاً. ترعى وفق النظام السرحي والنظم الأخرى وبحيازات متنوعة ويمثل القطيع النامي 48 % من القطيع (21 %ذكور و27 %إناث) والقطيع المنتج 52 %(8 %ذكور و44 %إناث) وتعتمد في التغذية على الرعي.

أبقار الزيبو بل

الصفات الشكلية:

متوسطة الحجم، اللون الغالب الأبيض إلى الرمادي الفاتح، وهناك أفراد سوداء اللون وأخرى تختلط فيها الألوان، الرأس متوسطة الحجم ذات مقطع محدب. القرون طويلة لدى الجنسين ومتجهة للأعلى، الأذنان أفقيتان متوسطتا الطول، واللبب لدى الجنسين، الجسم مستقيم، وينمو الغارب على شكل سنام عند الذكور والإناث.الذيل بنفس لون الجسم، وينتهي بشرابة شعر. الارتفاع عند الغارب 140 سم للذكور و130 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

تتم رعاية الأبقار بهدف الحصول على اللحم والحليب، تزن الذكور تامة النمو 400 كغ، والإناث 350 كغ، متوسط وزن المواليد الذكور والإناث 20 كغ، ويصل وزن الذكور عند الفطام 90 كغ، والإناث 80 كغ.

معدل النمو اليومي عند الذكور 440 غ، وعند الإناث 350غ، العمر عند البلوغ 36 شهراً، والوزن عند التلقيح 250 كغ. العمر عند الولادة الأولى 46 شهراً، والفترة بين ولادتين 18 شهراً.

تسوق العجول بعمر 900 يوم، وبوزن 280 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 360 غ. وزن الذبيحة 230 كغ، ونسبة التصافي 45 %.

تنتج الأبقار بالمتوسط 550 كغ حليب بموسم إدرار طوله 190يوماً، وبإنتاج يومي 2.7 كغ.

عروق الأبقار
في
الجمهورية اليمنيـــة

الأبقار المحلية اليمنية

تنحدر من أبقار الزيبو الهندية وتشكل 98 % من أبقار اليمن أي نحو 1.535 مليون رأس وتشبه إلى حد كبير الأبقار التي تعرف باسم زيبو جنوب جزيرة العرب التي تتميز بصغر الحجم وقصر القرون.
وتنتشر بدرجة رئيسة في المناطق الجبلية الغنية بالمراعي الطبيعية وفي مناطق الزراعة المروية على الشريط الساحلي والمناطق الداخلية عدا وادي حضرموت. وتتميزكل من محافظتي لحج والحديدة بتواجد عدد كبير من هذه الأبقار وتسمى محلياً (الأبقار اليمنية، الأبقار الردمانية، أبقار الموزع) وترعى وفق نظام سرحي بنسبة 98 % وبحيازة صغيرة 2 - 3 رؤوس، وبنسبة 2 % وحيازة 10 - 20 رأساً وفق نظم الرعاية الأخرى.

ذكر أبقار محلية

يتركب القطيع المنتج من 20 % ذكور و80 % إناث. وتكون نسبة الذكور والإناث متساوية في القطيع النامي.
تعتمد أبقار اليمن في تغذيتها على المراعي الطبيعية بنسبة 20 % ولفترة 120 - 150 يوماً وعلى مخلفات المحاصيل الحقلية المختلفة بنسبة 79 % ولمدة 60 يوماً، وعلى الأعلاف المركزة بنسبة 1 % وعلى مدار العام.

الصفات الشكلية:

حجم الأبقار صغير، لونها السائد الطوبي الأحمر الغامق أو الفاتح ليصل إلى الأبيض، لون الوجه طوبي أو أبيض أو مبقع، الرأس متوسطة الحجم ذات مقطع مستقيم والجبهة مقعرة قليلاً في الوسط، القرون متوسطة الطول وأقصر عند الإناث، الأذنان طويلتان تتجهان للجانب، الجسم مربع الشكل بطول 130 سم للذكور و123 للإناث، ومحيط الصدر 148 سم، و146سم، الارتفاع 119 سم، و115 سم للذكور والإناث على التوالي. السنام مختلف الأشكال والأحجام. اللبب أسفل العنق إلى مابين القوائم وأكثر تدلياً عند الذكور، القوائم نحيفة وقوية. الذيل طويل يلامس الأرض أحياناً. الضرع صغير، والحلمات قصيرة وثخينة ومتناسقة.

الصفات الإنتاجية:

تختلف هذه الخصائص من منطقة لأخرى ومن موسم لآخر وذلك باختلاف الموارد العلفية بين المواسم والمناطق. تتم رعاية هذه الحيوانات بهدف الحصول على اللحم والحليب.

يتراوح وزن الحيوانات مابين 200 - 300 كغ، البلوغ الجنسي مبكر 9 أشهر، ولكن الولادة الأولى تتم بعمر 3 سنوات، غالبا ماتلد الإناث مرة في السنة، وقد تمتد الفترة مابين ولادتين إلى سنتين في مواسم الجفاف تزن المواليد الذكور 13 كغ والإناث 11 كغ. مدة الرضاعة 2.5 - 6 أشهر. أما العجول المعدة للبيع فتفطم بعمر 1.5 - 4 أشهر. يتراوح وزن الحيوانات بعمر 3 أشهر مابين 32 - 40 كغ. هناك اختلافات كبيرة بموسم الإدرار ويتراوح طول الموسم مابين 5 ويصل حتى 11شهراً حسب التغذية. تنتج الأبقار مابين 500 - 700 كغ حليب في الموسم وبإنتاج يومي بين 2 - 3 كغ حسب التغذية.

لاتعبر هذه الأبقار عن تراكيبها الوراثية الحقيقية بسبب عدم حصولها على الحصة العلفية اللازمة. وهي حيوانات قابلة للتحسين الوراثي.

أنثى أبقار محلية

أبقار جزيرة سُقطرى

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنها ناتجة عن خلط عدة عروق أوروبية مع السلالات المحلية الأصيلة المتواجدة في الجزيرة وتشكل2 % من أبقار اليمن أي نحو 30 ألف رأس. ترعى هذه الأبقار وفق النظام السرحي بنسبة 98 % وبحجم حيازة 2 - 3 رؤوس وبنسبة 2 % وبحيازة 1 - 2 رأس في نظم الرعاية الأخرى.

أبقار جزيرة سقطرى

نسبة الذكور والإناث متساوية في القطيع بشكل عام، ويحتوى القطيع المنتج 30 % من الذكور و 70 % من الإناث.
تعتمد هذه الأبقار في تغذيتها على المراعي الطبيعية بنسبة 95 % وعلى المخلفات الزراعية بنسبة 4 % وعلى الأعلاف المركزة بنسبة 1 %.

الصفات الشكلية:

تختلف كلياً عن الأبقار المحلية، صغيرة الحجم متعددة الألوان (الأشقر، البني، الأبيض، الأبيض والأسود). عديمة السنام، ذات قرون مختلفة الطول، الوجه مستطيل يزيد طوله عن ضعف عرضه، المقطع الجانبي للرأس مستقيم، الأذنان 15سم جانبيتان، العنق قصير (أقصر من المحلية)، الجسم مربع ويزيد طوله قليلاً عن ارتفاعه، طول الجسم المائل 116سم عند الإناث، و132 سم للذكور، ارتفاع الجسم 103 سم عند الإناث، 104سم للذكور.

الصفات الإنتاجية:

ثنائية الغرض (لحم، حليب)، وهي صغيرة الحجم، يتراوح وزنها بالمتوسط بين 200 - 250 كغ، وقد تصل إلى 300 كغ.
تلقح الإناث لأول مرة بعمر سنتين، وتتكرر الولادات بمعدل مرة كل سنتين وخاصة في مواسم الجفاف. طول موسم الإدرار 10 - 15 شهراً.
تنتج الإناث الجيدة نحو 5 كغ حليب يومياً ولمدة 4 أشهر ثم تنخفض الإنتاجية تدريجياً حتى نهاية الموسم. معدل إنتاج البقرة السنوي من الحليب نحو 700 كغ.

عروق الجاموس
في الدول العربية

الجاموس السوري
(جاموس البحر الأبيض المتوسط)

المنشأ والانتشار:

الموطن الأصلي الهند، يعتقد بأنه أدخل إلى بلاد الشام في العصر الأموي، ويتواجد الجاموس في سورية في مناطق المستنقعات والمناطق ذات المستوى العالي لمياه التربة، لذلك كانت منطقة الغاب منطقة نموذجية لانتشاره. كما يتواجد في منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، وتتواجدأعداداً قليلة منه في محافظة درعا، وسمي بجاموس المستنقعات، وقد استخدم للحليب واللحم وأعمال الجر والحراثة. وتتم رعايته وفق النظام السرحي بنسبة 70 % وبحيازة 2 - 5رؤوس، ووفق النظام شبه المكثف 30 % وبحيازة 5 - 25 رأساً.

أنثى الجاموس السوري

يمثل القطيع النامي 40 % (20 % ذكور و20 % إناث)، والقطيع المنتج 60 % (5 % ذكور و55 % إناث)، ويعتمد في غذائه على الرعي بنسبة 25 %، وعلى المخلفات الزراعية بنسبة 50 %، وعلى المركزات بنسبة 25 %، وبلغ تعداد رؤوس الجاموس في سورية عام 2007 نحو 5651 رأساً.

الصفات الشكلية:

كبير الحجم، اللون أسود مع وجود بقع بيضاء على الرأس، والقوائم، والذيل، الجلد مائل للخشونة مغطى بالشعر، الرأس كبيرة ذات مقطع مستقيم، القرون غليظة متجهة إلى الخلف في الذكور والإناث، الأذنان طويلتان جانبيتان،

الجسم مستقيم ذو انحناء في الوسط طوله 200 سم للذكور و196 سم للإناث، محيط الصدر 205 سم للذكور و190 سم للإناث، عمق الصدر 73 سم للذكور و66 للإناث، الارتفاع عند الغارب 133 سم للذكور و131 سم للإناث، القوائم قوية وغليظة، الضرع كروي الشكل ومتوسط الحجم.

الصفات الإنتاجية:

تهدف رعاية الجاموس لإنتاج اللحم والحليب، ويتراوح وزن الذكور البالغة مابين 800 - 900 كغ، والإناث البالغة مابين 750 - 850 كغ، تزن المواليد الذكور بين 38 - 42 كغ، والإناث بين 32 - 38 كغ.

وزن الذكور المفطومة 90 كغ، والإناث 80 كغ، متوسط النمو اليومي للذكور 650 غ وللإناث 550 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي بين 22 - 24 شهراً، ويمتد موسم التناسل على مدار العام.

ذكر الجاموس السوري

الوزن عند التلقيح 280 كغ ومعدل الولادات 98 %، والعمر عند الولادة الأولى بين 33 - 36 شهراً، والفترة بين ولادتين 390 - 400 يوم.

تسوق الحيوانات للذبح بعمر 1.5 - 2 سنة وبوزن بين 250 - 300 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 730 - 760 غ، ويتراوح وزن الذبيحة بين 150 - 200 كغ، وبنسبة تصافي 48 %.

يتراوح إنتاج الحليب الكلي بين 700 - 1200كغ بموسم إدرار طوله 180 - 200 يوم وبإنتاج يومي 6 كغ. يتكون الحليب من 19.6 % مواد صلبة كلية، بنسبة دهن 8.3 %، وبروتين 4.9 %، و لاكتوز 5.7 %.

الجاموس العراقي

المنشأ والانتشار:

اختلفت الآراء حول أصل الجاموس في العراق، فمنهم من رأى أن أصله هندي وأدخل قبل آلاف السنين، ومنهم من رأى أنه أدخل في العصر الأموي أو العباسي، والثابت أنه في عام 1920 تم إدخال 3000 رأس من الجاموس قادمة من الهند إبان الاحتلال الانكليزي للعراق.

أنثى الجاموس العراقي

وقد انتشر الجاموس في جميع أنحاء العراق، وخاصةً في المناطق القريبة من مدن الموصل، السليمانية، والأهوار، واستخدم كحيوان ثنائي الغرض (لحم، حليب)، حيث بلغت أعداده عام 2008 نحو ثلاثة آلاف رأس، وهو في تناقص مستمر.

ويمكن تقسيم الجاموس في العراق إلى مجموعتين حسب المناطق البيئية التي يعيش فيها، وهي جاموس الأهوار والجاموس الذي يعيش حول المدن الكبيرة وضفاف الأنهر. ويعتقد أنه لاتوجد فروقات وراثية كبيرة بينهما، إلا أن الثاني أكبر حجماً وأكثر إنتاجاً حيث تتوافر له ظروف تغذية ورعاية أفضل.

تتم رعاية الجاموس بنظام سرحي بنسبة 80 % وبحيازة 5 - 20 رأساً وبنظام شبه مكثف بنسبة 20 % وبحيازة 5 - 25 رأساً.

الصفات الشكلية:

اللون أسود وتظهر في البعض بقع بيضاء وخاصة في مقدمة الرأس وعلى القوائم والذيل الذي يكون طويلاً وينتهي بخصلة شعر سوداء أو بيضاء أحياناً. الوجه أسود أو رمادي أو أبيض. الرأس طويلة ونحيفة ذات قرون طويلة لدى الجنسين. الأذنان صغيرتان قليلتا الشعر.

الجسم عميق طوله 200 سم في الذكور و190 سم للإناث، محيط الصدر 125 سم و115 سم، وعمق الصدر 100سم و90سم، والارتفاع عند الغارب 145سم و 140 سم لكل من الذكور والإناث على التوالي.

الصفات الإنتاجية:

يتأخر النضج الجنسي في إناث الجاموس بالمقارنة مع الأبقار، وتلد الإناث لأول مرة بعد أربع سنوات وبمعدل ولادتين كل ثلاث سنوات، ويعتبر ضعف الخصوبة من أهم المشاكل التي تواجه الجاموس في العراق. إلا أن الجاموس يتصف بعمر إنتاجي طويل يزيد عن 15 سنة.

ذكر الجاموس العراقي

يعد الجاموس ثنائي الغرض (لحم وحليب)، ويتراوح وزن الذكور تامة النمو بين 400 - 750 كغ، والإناث 350 - 600 كغ، ويتراوح وزن المواليد بين 20 - 40 كغ لكل من الذكور والإناث، ووزن الفطام 115 كغ للذكور، و195 كغ للإناث، ومعدل النمو اليومي حتى الفطام 1004 غ للذكور و900 غ للإناث. العمر عند البلوغ الجنسي 24 شهراً، والوزن عند التلقيح 300كغ، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 36 - 48 شهراً.

يبلغ عمر تسويق العجول للذبح 540 يوماً بوزن 250 كغ، وبمعدل نمو يومي 500 غ، ويصل وزن الذبيحة 170 كغ، بنسبة تصافي 48 %، ونسبة تشافي 58 %.

يتراوح إنتاج الحليب الكلي لأنثى الجاموس بين 680 - 1800 كغ حسب ظروف رعايتها. يتكون الحليب من 17.9 % مواد صلبة كلية، و7.64 % دهن، و4.36 % بروتين، و4.8 % لاكتوز.

الجاموس المصري

المنشأ والانتشار:

نشأ الجاموس المصري أصلاً من الجاموس النهري الهندي، وانتشر في مصر، وهناك ثلاث مجموعات من الجاموس في مصر (المنوفي، البحيري، والصعيدي). وينتشر أكثر من 95 % من الجاموس لدى الفلاحين وبحجم حيازة مابين 1 - 5 رؤوس. وتبلغ أعداده في مصر نحو 3.9 مليون رأس، منها 25 % بعمر أقل من سنة و25 % بعمر مابين 1 - 2 سنة ونحو 50 % بعمر يزيد عن سنتين.

ذكر الجاموس المصري

الصفات الشكلية:

الجسم كبير الحجم، الجلد سميك مغطى بشعر قصير، اللون الغالب للشعر والجلد رمادي مائل للأسود أو الإردوازي، ويصبح اللون فاتحاً عند بقاء الحيوانات في الظلام لمدة طويلة، وقد توجد بعض البقع البيضاء الصغيرة على الوجه والقوائم. القرون غليظة المنبت طويلة وغالباً لونها وردي، الفخذين رفيعين والذيل رفيع وطويل، الأذنان كبيرتان جانبيتا التوضع، الضرع جيد التكوين ومنتظم الحلمات، القوائم ثخينة والأظلاف كبيرة.

الصفات الإنتاجية: (إنتاج لحم وحليب)

متوسط وزن الجسم عند الذكور البالغة 750 كغ، والإناث 650 كغ، ويتراوح العمر عند البلوغ الجنسي للذكور والإناث مابين 9.9 - 24.8 شهراً، ويتراوح العمر عند أول ولادة مابين 27.3 - 41.7 شهراً، طول مدة الحمل 307 - 316 يوماً، والفترة بين ولادتين 471 - 585 يوماً.

تزن الذكور عند الميلاد بالمتوسط 36.8 كغ، والإناث 34 كغ. ووزن الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي بين 250 - 350 كغ. الوزن عند أول ولادة بين 370 - 500 كغ، ويعتبر الجاموس مصدر هام لإنتاج اللحم في مصر، فقد تزايدت كميات لحم الجاموس من 125 ألف طن عام 1980 إلى 157 ألف طن عام 1990 إلى 270 ألف طن عام 2005. ويعد البتللو من أفخر أنواع اللحوم التي تنتجها عجول الجاموس الصغيرة العمر. كما تنتج إناث الجاموس الحليب (اللبن)، ويتراوح إنتاج الأنثى من الحليب مابين 1750 - 2250 كغ في موسم إدرار طوله بين 217 - 365 يوماً بنسبة دهن بين 6 - 8.5 %، و بروتين بين 3.3 - 4.6 %. و لاكتوز بين 3.9 - 5.4 %.

عروق الإبـل
في الدول العربيـة

عروق الإبل
في
دولــة الإمارات العربيــة المتحدة

الإبل المحلي
(البوش)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه الإبل في الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وأدخلت إلى منطقة العين ودبي، وتركز انتشارها في العين، فلج المعلا وأم القيوين، وتسمى محلياً البوش. تعيش 35 % منها تحت النظام الرعاية السرحي، و55 % منها تحت نظام الرعاية شبه المكثف، و10 % منها تحت نظام الرعاية المكثف.

تتغذى الإبل بنسبة 10 % على المراعي الطبيعية و90 % على الأعلاف المركزة. يبلغ تعدادها 378227 رأساً في عام 2007 وهي في تزايد مستمر، وتتأقلم الحيوانات خارج موطنها الأصلي وتستجيب للتحسين الوراثي.

الإبل المحلية (البوش)

الصفات الشكلية:

إبل البوش متوسطة الحجم، لون الجسم بني فاتح إلى أبيض، الرأس متوسطة الحجم ومقطعه محدب، الآذان قصيرة ومنتصبة، الارتفاع عند الغارب للذكور 1.9 متر، وللإناث 1.75 متر. طول الجسم المستقيم مابين 2.8 - 3 متر، ارتفاع الجسم حتى نهاية السنام للذكور 2.15 متر وللإناث 2 متر. محيط الصدر للذكور 2.2 متر، وللإناث 2 متر.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور البالغة مابين 380 - 400 كغ، وللإناث البالغة 300 - 400 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 3 سنوات والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات. تلقح الناقة لأول مرة بوزن 400 كغ، معدل الولادات مرة كل سنتين، نسبة التوائم 0.1 %، الفترة بين ولادتين 24 شهراً.

يتراوح وزن المواليد الذكور مابين 30 - 35 كغ، والمواليد الإناث مابين 28 - 30 كغ. تسوق الحيوانات بوزن 160 كغ وبعمر مابين 6 - 8 أشهر، وزن الذبيحة 160 كغ، ونسبة تصافي الذبيحة 40 %، ونسبة التشافي 60 %.

ويتراوح الإنتاج اليومي من الحليب للناقة مابين 6 - 8 كغ، في موسم إدرار طوله 305 أيام، وتستخدم هذه الإبل للسباق أيضاً.

عروق الإبل
في
الجمهورية التونسية

إبل المغربي
(تونس)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزيرة العربية، وانتشرت في شمال إفريقيا، وأدخلت إلى تونس، وتركز انتشارها في الجنوب التونسي، والساحل (ولاية القيروان والوطن القبلي)، وتسمى محلياً التاريفي، القعودي، العربي أو الساحلي، المرزوقي، والارنوطي. تعيش 80 % منها تحت نظام الرعاية السرحي وبحجم حيازة 40 رأساً، و20 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف وبحجم حيازة 100 رأس.

وتتغذى هذه الإبل بنسبة 60 % على المراعي الطبيعية، و20 %على مخلفات المحاصيل الحقلية، و20 % على الأعلاف المركزة.

بلغ تعدادها 79.5 ألف رأس عام 2009، وهي في تناقص. وتتأقلم خارج موطنها الأصلي، وتستجيب للتحسين الوراثي.

ذكر إبل مغربي

الصفات الشكلية:

حجم الذكور والإناث كبير، لون الجسم والوجه أحمر أو أشقر أو بني أو رمادي، الرأس صغير مقطعه محدب، الآذان قصيرة ومنتصبة. الارتفاع عند الغارب للذكور 175 سم، وللإناث 165 سم، طول الجسم المستقيم بالمتوسط 140 سم، ومحيط الصدر 198سم.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 560 كغ وللإناث البالغة 465 كغ، ومتوسط العمر للبلوغ الجنسي 48 شهراً للذكور و36 شهراً للإناث، موسم التناسل مابين شهر كانون الأول/ديسمبر وحتى بداية نيسان/أبريل. تلقح الإناث بوزن وسطي 380 كغ، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً، الفترة بين ولادتين 25 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 36كغ والمواليد الإناث 33 كغ. تفطم الذكور بوزن 160كغ والإناث بوزن 150كغ. يبلغ معدل النمو اليومي حتى الفطام 640 غ للذكور و550 غ للإناث.

تسوَّق الحيوانات بوزن مابين 400 - 460 كغ وبعمر مابين 450 - 570 يوماً، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 240 - 270 كغ، بنسبة تصافٍ مابين 58 - 59 % ونسبة تشافٍ 62 %. يتراوح إنتاج الناقة الكلي من الحليب مابين 942 - 3300 كغ في موسم حلابة طوله 190 - 400 يوم، تنتج كل ناقة يومياً مابين 4.5 - 14 كغ حليب تحت نظام الرعاية المكثف بنسبة دهن مابين 2.5 - 5.6 %، ونسبة بروتين 2.2 - 5.5 % وبنسبة اللاكتوز 2.6 - 5.1 %.

عروق الإبل
في
الجمهورية الجزائريـــة
الديمقراطية الشعبية

إبل أجار

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزائر (الموطن الأصلي)، وانتشرت في مناطق تاسيلي أجار، وتعيش أغلبها تحت النظام السرحي، ونسبة قليلة تحت النظام شبه السرحي.

إبل أجار

الصفات الشكلية:

متوسطة الحجم.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي نحو 3 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، والفترة بين ولادتين سنتان، ومعدل الولادات مرة كل سنتين، يبدأ موسم التناسل في شهر تشرين الأول/اكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو.
تنتج الناقة يومياً 3 كغ حليب. وتستخدم هذه الإبل للحمل (نقل السلع) وأيضاً للركوب.

إبل آيت خباش

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزائر (الموطن الأصلي)، وانتشرت في الجنوب الغربي (جنوب عين الصفراء)، تعيش 98 % منها تحت نظام الرعاية السرحي و2 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

إبل آيت خباش

الصفات الشكلية:

إبل آيت خباش متوسطة الحجم، لون الحيوان أصفر إلى كريمي.

الصفات الإنتاجية:

متوسط العمر عند البلوغ الجنسي نحو 3 سنوات، العمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، الفترة بين ولادتين 2 سنة، معدل الولادات مرة كل سنتين. يبدأ موسم التناسل في شهر تشرين الأول/اكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو من كل عام. متوسط إنتاج الناقة اليومي 3 كغ حليب، وتستخدم هذه الإبل في النقل.

إبل البربري

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزائر (الموطن الأصلي)، وتنتشر في المناطق الصحراوية والتليّة. تعيش 98 % منها تحت نظام الرعاية السرحي، و2 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

إبل البربري

الصفات الشكلية:

إبل البربري متوسطة الحجم، لون الجسم أبيض أو كريمي إلى بني فاتح، الآذان صغيرة ومنتصبة.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح إنتاج الناقة الكلي من الحليب مابين 1000-1300 كغ في موسم إدرار طوله 330 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي للناقة من الحليب بـ 4 كغ.

إبل ازرغاف

المنشأ والانتشار:

هي احدى مجموعات سلالة الترقي، أو طوارق الصحراء، نشأت في الجزائر موطنها الأصلي، وتنتشر في منطقة الهقار ووسط الصحراء. تعيش 98 % منها تحت نظام الرعاية السرحي، و2 % منها تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

الصفات الشكلية:

إبل ازرغاف

إبل ازرغاف متوسطة الحجم، لون الجسم بني فاتح (أشقر) أو أحمر، وقد يكون الرأس وأسفل الجسم والأرجل ملونة بلون أبيض، والوبر قصير والآذان قصيرة ومنتصبة، الذيل متوسط الطول، الرأس صغير نسبياً.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور البالغة مابين 400 - 448 كغ، والإناث البالغة 400 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي نحو3سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، الفترة بين ولادتين سنتان، ومعدل الولادات مرة كل سنتين، يبدأ موسم التناسل في شهر تشرين الأول/اكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو.

يتراوح إنتاج الناقة من الحليب مابين 1500 - 1900كغ في موسم حلابة طوله 330 يوماً، يقدر إنتاج الناقة من الحليب 6 كغ يومياً. وتستخدم هذه الإبل في الركوب والنقل، وتعتبر أفضل حيوان للنقل ليلاً في الصحراء.

إبل أولاد سيدي الشيخ

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزائر (الموطن الأصلي)، وتعتبر إبل التلال، وتنتشر في الجنوب الغربي من الجزائر وفي شمال شرق موريتانيا. تعيش 98 % منها تحت نظام الرعاية السرحي و 2 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

إبل أولاد سيدي الشيخ

الصفات الشكلية:

إبل أولاد سيدي الشيخ صغيرة الحجم، لون الحيوانات أصفر إلى كريمي.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 430 كغ والإناث البالغة 370 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي نحو 3 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، الفترة بين ولادتين سنتان، معدل الولادات مرة كل سنتين. يبدأ موسم التناسل في شهر تشرين الأول/اكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو من كل عام.

متوسط إنتاج الناقة اليومي 5 كغ حليب، وتستخدم الإبل للركوب والنقل والأعمال الزراعية.

إبل الشعامبي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزائر (الموطن الأصلي)، وتعتبر من إبل التلال، وتنتشر في الجنوب الأوسط من الجزائر، وولاية ورقلةحيث تربيها قبيلة الشعامبة.

إبل الشعامبي

الصفات الشكلية:

إبل الشعامبي متوسطة الحجم، لون الحيوانات بني فاتح، ولون المواليد أبيض.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 400 كغ وللإناث البالغة 350 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي نحو 3 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، الفترة بين ولادتين سنتان، معدل الولادات مرة كل سنتين، يبدأ موسم التناسل في شهر تشرين الأول/اكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو من كل عام. يتراوح إنتاج الناقة الكلي من الحليب مابين 1500 - 1600كغ في موسم إدرار طوله 330 يوماً، ومتوسط الإنتاج اليومي 5 كغ من الحليب لكل ناقة.

إبل المروكي

المنشأ والانتشار:

تعد إبل المروكي أحد مجموعات سلالة الترقي، أو إبل طوارق الصحراء التي نشأت في الجزائر (الموطن الأصلي)، وتنتشر في الصحراء وفي منطقة الهقار. تعيش 98 % منها تحت نظام الرعاية السرحي، و 2 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

أنثى المروكي

ذكر المروكي

الصفات الشكلية:

إبل المروكي حيوانات ذات حجم متوسط إلى صغير، تتراوح ألوانها بين الرمادي والبني الفاتح، لها وبر قصير وآذان قصيرة، الارتفاع عند الغارب 187 سم للذكور، و178 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة نحو 439 كغ، والإناث البالغة 391 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي نحو 3 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، الفترة بين ولادتين سنتان، ومعدل الولادات مرة كل سنتين.

يبدأ موسم التلقيح من شهر تشرين الأول/أكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو. يعتبر الترقي والمروكي والمهري من سلالات الحليب إذ يتراوح إنتاج الناقة الكلي من الحليب مابين 2500 - 2600 كغ في موسم إدرار طوله 330 يوماً. ويقدر الإنتاج اليومي من الحليب للناقة 8 كغ، تستخدم للركوب.

إبل المهري

المنشأ والانتشار:

إبل المهري احدى مجموعات سلالة الترقي أو إبل طوارق الصحراء موطنها الأصلي الجزائر، وتنتشر في الصحراء ووسطها، تعيش 98 % منها تحت نظام الرعاية السرحي، و2 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

ذكر المهري

أنثى المهري

الصفات الشكلية:

إبل المهري ذات حجم متوسط، لون الجسم أبيض، الرأس صغير الحجم، الآذان قصيرة ومنتصبة والوبر قصير، الذيل قصير نسبياً، الارتفاع عند الغارب للذكور 195 سم، وللإناث 180 سم.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 500 كغ، والإناث البالغة 403 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي نحو 3 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، والفترة بين ولادتين سنتان، معدل الولادات مرة كل سنتين.

يبدأ موسم التناسل في شهر تشرين الأول/أكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو. يتراوح إنتاج الناقة من الحليب مابين 2500 - 2600 كغ في موسم إدرار طوله 330 يوماً، متوسط الإنتاج اليومي للناقة من الحليب 8 كغ، وتستخدم هذه الإبل في الركوب وفي السباق.

عروق الإبل
في
جمهورية السـودان

الإبل العربية السودانية

المنشأ والانتشار:

نشأت في السودان، وهي الأكثر انتشاراً وعدداً في السودان، وتمثل نحو 80 % من مجموع الإبل أي 3.5 مليون رأس تقريباً. ففي كردفان ودارفور والنيل الأزرق، تمثل الإبل العربية نسبة تقارب 96 % وفي شرق السودان تمثل نحو 55 % من مجموع الإبل بتلك المناطق.



ذكر سلالة العربي (كردفان)

وتربى الإبل العربية من قبل القبائل العربية في شرق السودان مثل اللحويين والشكرية والكواهلة، و تربى أيضاً في كردفان من قبل قبائل دار حامد والكبابيش والهواوير والشنابلة وتربيها في النيل الأزرق قبيلة كنانة وقبيلة رفاعة، وتربيها قبائل الرزيقات والزغاوة وغيرها في دارفور، وهناك أعداد من الإبل العربية السودانية في مصر، وتربى بغرض التسمين.

تعيش الإبل العربية في السودان تحت النظام السرحي بنسبة 95 % وبنسبة 5 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف. ويتراوح حجم القطيع مابين 30 - 100 رأس، ولاتقدم لها أعلاف مركزة.

الصفات الشكلية:

معظم إبل هذه السلالة كبيرة الحجم، وهي ذات عضلات ممتلئة وسنام عضلي كبير، ويغلب عليها لون الجسم الرملي مع وجود أفراد بلون بني فاتح وغامق، وهناك تفاوت في أحجامها حسب تحت السلالة المرتبطة بالقبيلة، فنجد أن أضخمها العربي الكباشي والعربي الكناني الذي يمتاز بطول الرقبة ووجود شعر اسود كثيف في العرف ورمش العين والسنام والآذان. أما العربي اللحوي فهو متوسط الحجم، بينما العربي من مجموعة الزغاوي والميدوب والهواوير والدهاسيري الذي تربيه قبائل البني عامر في شرق السودان فهو أقل حجماً.

أنثى العربي (كردفان)

الصفات الإنتاجية:

الإبل العربية السودانية بصورة عامة هي إبل لحم، وهناك أفراد من هذه السلالة ذات إدرار عالي من الحليب. تبلغ الذكور والإناث جنسياً بعمر 3 سنوات ويتم تلقيحها بعمر 5 سنوات، وتكون أول ولادة بعمر 6 سنوات، الفترة بين ولادتين سنتان، ومتوسط عدد الولادات 8 - 10 مواليد خلال الحياة الإنتاجية للناقة.

إبل الرشايدي

المنشأ والانتشار:

نشأت في السودان، وتنتشر في شرق السودان (كسلا، ساحل البحر الأحمر، طوكر ومرافيت)، وتسمى محلياً (الدعيلي، الذبيدي، الحمرة) وتربى من قبل قبيلة الرشايدة، وتعيش هذه الإبل بنسبة 95 % تحت نظام الرعاية السرحي، وبنسبة 5 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف. ويتراوح حجم القطيع مابين 70 - 120 رأساً، ولاتقدم لها الأعلاف المركزة.

ناقة الرشايدي

الصفات الشكلية:

تتصف إبل الرشايدي بقصر القامة والجسم الممتلئ واللون البني المحمر، وهي ذات حجم ووزن متوسط ولها آذان طويلة مائلة للجنب.

الصفات الإنتاجية:

تمتاز هذه الإبل بالبلوغ الجنسي المبكر 18 - 24 شهراً، كما أنها تكتسب الوزن بسرعة في المراعي الطبيعية الجيدة، وتفقد وزنها ببطء في الظروف الصعبة وبالتالي هي من أكثر السلالات مقاومة للجفاف.

يتم تلقيح الإناث بعمر 3 - 4 سنوات تقريباً، وتتراوح الفترة بين ولادتين من سنة ونصف إلى سنتين.

إبل العنَّافي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه الإبل في السودان، وتنتشر في شمال ووسط البطانة وشمال نهر عطبرة، وتربيها قبائل الشكرية والكواهلة وبعض قبائل البجة، وتربيها حالياً قبيلة الرشايدة حول منطقة كسلا. وتشكل نسبتها نحو 19 % من الإبل السودانية، وتعيش 80 % من هذه الإبل تحت نظام الرعاية السرحي، و20 % منها تحت نظام الرعاية شبه المكثف. ويتراوح حجم القطيع مابين 30 - 70 رأساً تحت نظام الرعاية السرحي، ومابين 5 - 10 رؤوس تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

إبل العنافي

الصفات الشكلية:

إبل العنافي ذو قوائم طويلة ورقبة طويلة، ورأس صغير وطويل مع جبهة دائرية منخفضة وصدر عريض وبطن ضامر، وهي من أسرع سلالات الإبل وخاصة في المسافات القصيرة، الذيل ثخين وقصير.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي 3 سنوات، ويتم تلقيح الإناث بعمر 5 سنوات وتكون أول ولادة بعمر 6 سنوات تقريباً، الفترة بين ولادتين سنتان، ومتوسط عدد الولادات 8 - 10 مواليد خلال عمر الناقة الإنتاجي.

إبل البِشاري

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في السودان، وتضم إبل متباينة من خفيفة الى متوسطة الوزن، تسمى محلياً الإبل البجاوية، وتقسم إلى مجموعات فرعية حسب القبيلة التي تربيها، (الاميرابي، الهدندوي، البِشاري الأبيض، والجرايش)، وتشكل هذه الإبل 12 % من الإبل السوداني، تعيش 90 % من هذه الإبل تحت نظام الرعاية السرحي، و10 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف. ويتراوح حجم القطيع مابين 30 - 70 رأساً و5 - 10 رؤوس للنظام السرحي وشبه المكثف على التوالي. وهناك مجموعة من الإبل البِشارية تسمى الشلاقية تربيها قبيلة البني عامر على ساحل البحر الأحمر، وتمتاز بحجم متوسط وإنتاج عالي من الحليب.

ناقة بشارية شلاقية

الصفات الشكلية:

تمتاز إبل البشاري (البجة) بأنها صغيرة الحجم، والقوائم قصيرة نسبياً وعظامها قوية وعضلاتها متناسقة، الرقبة قصيرة نسبياً وعضلية، الآذان قصيرة ومنتصبة للأمام، والصدر عريض مع ضلوع بارزة، والظهر قصير، والسنام صغير نسبياً، اللون الغالب هو البني الفاتح، ويتراوح اللون بين الأبيض والأحمر والبني.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي 4 سنوات، تلقح الإناث بعمر 5 سنوات، وتكون أول ولادة بعمر 6 سنوات تقريباً، والفترة بين ولادتين سنتان ونصف، وعدد الولادات 8 - 10مواليد خلال عمر الناقة الإنتاجي، الإبل البشارية هي إبل ركوب وسباق بشكلٍ عام وإنتاجها من الحليب قليل باستثناء الإبل الشلاقية التي تمتاز بإنتاج حليب غزير يتراوح مابين 10 - 12كغ يومياً عند توفر المراعي الطبيعية.

عروق الإبل
في
المملكة العربية السعودية

إبل المجاهيم

المنشأ والانتشار:

نشأت في المملكة العربية السعودية، وانتشرت في أغلب مناطقها وبخاصة منها الرياض والشرقية والقصيم، وتقل نسبتها في مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، وأعدادها قليلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان ونجران والباحة، وتتواجد أعداد منها في الشمال الشرقي لدولة الكويت، ولها تسميات محلية (السود، الملحة، الخوارة). وتقسم المجاهيم إلى تحت سلالتين المجاهيم الملحاء والصهباء وأحيانا إلى المجاهيم الدوسرية والمجاهيم المرية وتمتاز الدوسرية بجمال شكلها وصغر حجمها. لقد تحول نظام إنتاجها حديثاً من السرحي بالكامل، إلى شبه المكثف، بالإضافة إلى الرعي تقدم لها مخلفات المحاصيل والأعلاف المركزة بكميات جيدة.

إبل المجاهيم

الصفات الشكلية:

إبل المجاهيم كبيرة الحجم، لونها داكن، يتراوح لون الوبر بين البني الضارب للحمرة والبني الداكن والأسود. إبل المجاهيم الملحاء لونها بني داكن والمجاهيم الصهباء لونها بني فاتح. الرأس متوسطة الحجم، الآذان طويلة ومنتصبة للأمام، وتمتاز هذه الإبل بقابليتها للتحسين الوراثي.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور والإناث البالغة مابين 500 - 800 كغ، تنضج الذكور جنسياً بعمر 5 سنوات، ويعتمد عليه للقيام بالتلقيح الطبيعي بعمر 6 سنوات، أما الإناث فتلقح بعمر 4 - 5 سنوات، معدل الولادات مرة كل سنتين، معدل الإنتاج اليومي للحليب مابين 6 - 7 كغ، و تنتج بعض النوق المحسنة مابين 15 - 25 كغ يومياً في موسم إدرار طوله 240 يوماً.

إبل المغاتير

المنشأ والانتشار:

نشأت في المملكة العربية السعودية، وهي ثاني أكثر السلالات انتشاراً في مناطق مختلفة من المملكة، وبخاصة في حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك. وتقل نسبتها في مناطق الرياض، الشرقية، والقصيم، وهناك أعداد من هذه السلالة في دول الخليج العربي مثل قطر التي تمتلك 42 ألف رأس من إبل المغاتير أو الإبل البلدية كما يسمونها، وقد توجد إبل المغاتير في الكويت، وسورية، والأردن، والعراق.

ذكر المغاتير

الصفات الشكلية:

إبل المغاتير متوسطة الحجم إلى كبيرة، الرأس كبير نسبياً، اللون المميز لتحت السلالة (الوضح) هو الأبيض، أما تحت السلالة (الشقحاء) فيميزها اللون الأصفر المحمر، الآذان قصيرة ومنتصبة للخلف.

الصفات الإنتاجية:

تتراوح أوزان الإبل البالغة مابين 480 - 700 كغ. ينضج الذكر جنسياً بعمر 5 سنوات، ويعتمد عليه للقيام بالتلقيح بعمر 6 سنوات، أما الإناث فتلقح في عمر 4 - 5 سنوات، ومعدل الولادات مرة كل سنتين. تربى إبل المغاتير لإنتاج الحليب واللحم، ولكن معدل إنتاج الحليب أقل من إبل المجاهيم بشكل عام.

أنثى المغاتير

عروق الإبل
في
الجمهورية العربية السورية

الإبل الشامية

المنشأ والانتشار:

الموطن الأصلي لهذه السلالة الجمهورية العربية السورية، وتنتشر في بادية الشام، وتم إدخالها إلى ريف دمشق، حمص، حماة، السويداء ودرعا، وتوجد أيضاً في الأردن وشمال المملكة العربية السعودية وغرب العراق.

تعيش 95 % من الإبل الشامية تحت نظام الرعاية السرحي، و 5 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف. يتراوح حجم القطيع مابين 50 - 200 رأس، وتكون نسبة الذكور النامية والبالغة بحدود 15 %. وتتغذى الإبل الشامية بنسبة 75 % على المراعي الطبيعية و20 % على مخلفات المحاصيل الحقلية و5 % على الأعلاف المركزة. بلغ تعدادها 27358 رأساً عام 2007، وهي في تزايد مستمر.

أنثى الإبل الشامية

الصفات الشكلية:

الإبل الشامية عموماً كبيرة إلى متوسط الحجم، لون الجسم متباين من الأبيض، الأصفر، البني إلى الأسود. الآذان قصيرة ومنتصبة والذيل قصير نسبياً، وبعض الأفراد له شعر كثيف على العرف والآذان ورمش العين والسنام، ويمكن أن تتأقلم خارج موطنها الأصلي ولها استجابة جيدة للتحسين الوراثي.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم البالغ للذكور نحو 450 كغ، وللإناث 400 كغ، وتمتاز الإبل الشامية بعمرٍ بلوغ مبكر، ويتراوح مابين 16 - 20 شهراً. والعمر عند الولادة الأولى 3 إلى 4 سنوات، الفترة بين ولادتين 24 - 30 شهراً.

يبلغ متوسط إنتاج الناقة الكلي من الحليب مابين 1200 - 1500 كغ في موسم إدرار طوله 304 أيام. وتنتج الناقة الشامية 5 كغ حليب يومياً.

أنثى الإبل الشامية

عروق الإبل
في
جمهورية العراق

إبل الخوار

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في العراق (الموطن الأصلي)، وانتشرت في البادية الشمالية والغربية وبادية الجزيرة ووسط وجنوب العراق، وتتواجد أيضاً في الأجزاء الشرقية من سورية المتاخمة للعراق، وتعيش تحت نظام الرعاية السرحي، ويتراوح حجم القطيع مابين 100 - 200 رأس ويتكون القطيع من 20 % ذكور و 80 % إناث.

إبل الخوار

الصفات الشكلية:

إبل الخوار ذات حجم متوسط، ولها رأس صغير، وقوائمها طويلة ودقيقة، ولون الجسم بني فاتح إلى أحمر فاتح وأحياناً أبيض، ولها رقبة طويلة، وذيل رفيع متوسط الطول.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 500 كغ وللإناث البالغة 450 كغ، يتراوح عمر البلوغ الجنسي للأنثى والذكر مابين 3 - 4 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، والفترة بين ولادتين نحو 24 شهراً، ومعدل الولادات مرة كل سنتين.

الإنتاج الكلي لأنثى الخوار من الحليب مابين 500 - 1500كغ في موسم إدرار طوله مابين 210 - 540 يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي من الحليب لكل ناقة مابين 1.5 - 3 كغ.

عروق الإبل
في
جمهورية موريتانيا الإسلامية

إبل افطـوط

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في شرق وجنوب موريتانيا، والجنوب الغربي من الجزائر (الموطن الأصلي)،ويسمى أفتوت، وتنتشر في هذه المناطق. وتعيش 97 % منها تحت نظام الرعاية السرحي، و3 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف، إذ تقدم لها المخلفات الزراعية والأعلاف المركزة. ويتراوح حجم الحيازة مابين 20 - 80 رأساً، وتكون نسبة الذكور مابين 25 - 30 % من القطيع الدائم، ويتم الاحتفاظ عادة بثمانية ذكور بالغة في كامل القطيع، تمثل إبل افطوط نحو 56 % من الإبل في موريتانيا، وبلغ تعداد هذه السلالة 700 ألف رأس عام 2004، وهي في تزايد مستمر.

إبل افطوط

الصفات الشكلية:

إبل افطوط ذات حجم كبير، وهي ذات رأس متوسط الحجم، وآذان قصيرة ومنتصبة وسنام صغير، لون الجسم أبيض إلى بني فاتح.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 600 كغ، والإناث 450 كغ، متوسط العمر عند البلوغ الجنسي 4 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 6 سنوات، بينما تكون الفترة بين ولادتين 24 شهراً، ويبلغ عدد الولادات نحو 9 ولادات خلال العمر الإنتاجي للناقة.

يبلغ متوسط إنتاج الحليب الكلي 1640 كغ في موسم حلابة طوله 365 يوماً، تنتج الناقة يومياً 4.5 كغ حليب، بالإضافة لذلك فإن هذه الإبل تستخدم في الركوب.

إبل الرقيبي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في شمال موريتانيا وجنوب غرب الجزائر (الموطن الأصلي)، وتنتشر في شمال وشرق موريتانيا وولاية تندوف في الجزائر، تعيش 95 % منها تحت نظام الرعاية السرحي، و5 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

إبل الرقيبي

الصفات الشكلية:

لون الجسم لجميع أفراد السلالة بني فاتح إلى أبيض، وهي حيوانات متوسطة الحجم.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 410 كغ والإناث البالغة 350 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 3 سنوات، والعمر عند الولادة الأولى 5 سنوات، الفترة بين ولادتين سنتان، معدل الولادات مرة كل سنتين، موسم التناسل يبدأ من شهر تشرين الأول/أكتوبر ويمتد حتى شهر أيار/مايو من كل عام. ويتراوح إنتاج الحليب الكلي للناقة مابين 1000 - 1200كغ في موسم إدرار طوله 330 يوماً.

عروق الإبل
في
الجمهورية اليمنية

إبل الأراك (الطوري)

المنشأ والانتشار:

نشأت إبل الأراك في اليمن (الموطن الأصلي)، وانتشرت في المناطق الساحلية والجبلية والوسطى والهضاب. تعيش تحت نظام الرعاية السرحي، وفي قطعان بحجم مابين 30 - 40 رأساً. يبلغ تعدادها 195 ألف رأس عام 2008، وهي في تزايد مستمر.

إبل الأراك

الصفات الشكلية:

حجم الحيوانات متوسط إلى كبير، ولونها بني فاتح وهي ذات وبر قصير فوق الكتف، الآذان قصيرة ومنتصبة، الرقبة طويلة.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي مابين 3 - 4 سنوات، العمر عند الولادة الأولى 4 - 5 سنوات، ولايوجد موسم تناسل محدد، لكن يزداد التزاوج في فصلي الربيع والشتاء. يبلغ متوسط الإنتاج اليومي للناقة من الحليب 7 كغ. وتستخدم الحيوانات لأغراض الحمل والركوب والأعمال الزراعية.

إبل الحرة

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في اليمن (الموطن الأصلي)، وانتشرت في المناطق الجبلية والصحراوية من اليمن. وتعيش تحت نظامي الرعاية السرحي وشبه المكثف، ويتراوح حجم القطيع مابين 30 - 40 رأساً. يبلغ تعدادها 80000 رأس، وهي في تزايد مستمر.

إبل الحرة

الصفات الشكلية:

إبل الحرة ذات حجم متوسط، لون الحيوانات بني فاتح، الرأس متوسط الحجم، الآذان قصيرة ومنتصبة، القوائم رفيعة وطويلة، الرقبة متوسطة الطول.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط إنتاج الناقة اليومي من الحليب 7 كغ، وتستخدم في الحمل والركوب.

إبل الشرسية

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في اليمن (الموطن الأصلي) وتسمى أيضاً إبل الخوار، وانتشرت في المنطقة الساحلية (لحج، أبين، الحديدة وحجة)، تعيش تحت نظام الرعاية السرحي وفي قطعان بحجم 5 - 12 رأساً. بلغ تعدادها 40 ألف رأس عام 2008، وهي في تزايد مستمر.

الصفات الشكلية:

إبل الشرسية كبير الحجم، لون الجسم بني فاتح.

الصفات الإنتاجية:

لا تتوفر أية بيانات إنتاجية.

إبل العاضة

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في اليمن (الموطن الأصلي) وتسمى أيضاً إبل الحزمية، وانتشرت في مناطق الحُديدة، حجة، وتعز. تعيش تحت نظام الرعاية السرحي، وتتراوح أفراد القطيع مابين 5 - 12 رأساً. بلغ تعدادها 90000 رأس عام 2008.

إبل العاضة

الصفات الشكلية:

إبل العاضة (الحزمية) ذات حجم كبير، ولون الجسم غالباً أسود، الرأس متوسط الحجم، الآذان قصيرة ومنتصبة، الرقبة متوسطة الطول، الذيل قصير نسبياً.

الصفات الإنتاجية:

متوسط العمر عند البلوغ الجنسي 3 - 4 سنوات، بينما العمر عند أول ولادة 4 - 5 سنوات.

عروق وسلالات الأغنام
في الدول العربية

عرق أغنام منتشـر في أكثر من دولة عربيـــة

غنم العواس

تعد أغنام العواس من أهم عروق الأغنام في الوطن العربي، وأوسعها انتشاراً، ويقدر عددها بنحو31 مليون رأس، تشكل نحو 17 % من عدد الأغنام في الدول العربية المقدر بنحو 185 مليون عام 2008.

اهتم المركز العربي (أكساد) منذ عام 1972 بتحسين الأغنام في الدول العربية بالتعاون مع الوزارات المعنية في الدول العربية ومنها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية السورية، حيث أنشأ محطة خاصة لتحسين أغنام العواس بالانتخاب منذ عام 1973. كما أنشأ أكساد محطة خاصة لتركيز عمليات التحسين الوراثي لأغنام العواس في محطة بحوث ازرع (محافظة درعا) في سبيل نشر الحيوانات المحسنة منها إلى أكبر قدر من الدول العربية سواء على شكل حيوانات حية (ذكور وإناث) أو على شكل قشات سائل منوي مجمد من الذكور النخبة، كما أنشأ عام 2010 في البادية السورية محطة بحوث وادي العذيب (محافظة حماة) لتنفيذ دراسات خاصة على تأقلم هذه السلالة مع أقسى ظروف المناخ.

ذكر غنم العواس

المنشأ و الانتشار:

منشؤه منطقة مابين النهرين دجلة والفرات، وانتشر في شرقي المتوسط وجنوبي تركيا وأدخل إلى شمال المتوسط، وشمال إفريقيا، والجزيرة العربية، وبخاصة الجمهورية العربية السورية ولبنان والعراق والأردن وفلسطين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا. ويسمى محلياً (عواس، عواسي، عويسي، شامي، بلدي، النعيمي، الشفالي).

مساهمته النسبية 90 % تحت النظام السرحي، و 10 % تحت النظام شبه المكثف، وحجم الحيازة في النظام السرحي

مابين 100 - 1000 رأس، ومابين 100 - 300 رأس في النظام شبه المكثف، ويتركب القطيع النامي من 21 % ذكور، ومن 21 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 3 - 6 % ذكور و 52 - 87 %إناث، ونسبة أيام الرعي 25 % والتغذية على المخلفات 55 % والتغذية على المركزات 20 %، وفترة الرعي 90 يوماً وفترة التغذية على المحاصيل 200 يوم وفترة التغذية على المركزات 75 يوماً، وبلغت أعداده نحو 23 مليون رأس في عام 2007 في سورية، وهو في تزايد، وقابل للتحسين الوراثي ويتأقلم خارج موطنه الأصلي ويمتاز بظاهرة الأمومة ويقاوم الأمراض، وتم خلطه مع عروق أخرى.

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض مائل إلى الصفرة (كريمي)، ولون الوجه أشقر أو أحمر أو أسود أو بني، أو أبيض ورأسه كبير وتتواجد القرون عند الذكور، ونادراً عند الإناث ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، يبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 78 سم وعند الإناث 70 سم وطول الجسم عند الذكور 78 سم وعند الإناث 72 سم، ويصنف من الأغنام المنتجة للصوف الخشن الذي يستخدم في صناعة السجاد، الذيل غليظ (الإلية).

إناث غنم العواس

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 64 - 85 كغ، وللإناث مابين 43 - 56 كغ، أما عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي فيتراوح مابين 6 - 8 أشهر. وموسم التناسل في نهاية الصيف، تلقح النعجة بوزن 45 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 24 شهراً، ونسبة التوائم 2 - 30 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

يتراوح وزن المواليد الذكور مابين 4.3 - 5.0 كغ، والمواليد الإناث مابين 3.8 - 4.8 كغ، ووزن الذكور المفطومة 17.1 - 22.4 كغ، والإناث المفطومة 16.8-19.7 كغ ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 250 غ، وللإناث 200 غ.

تسوق الحيوانات للذبح بوزن مابين 45 - 50 كغ وبعمر 200 يوم، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 38 - 53 كغ وبنسبة تصافي مابين 48 - 53 % ونسبة تشافي 70 %.

متوسط إنتاج النعجة من الحليب مابين 105 - 215 كغ، في موسم إدرار طوله 150 - 210 أيام، ويقدر الإنتاج اليومي من الحليب مابين 500 - 750 غ، وتتراوح نسبة المواد الصلبة الكلية مابين 16.2 - 19.9 %، ونسبة الدهن مابين 4.4 - 8.3 % والبروتين 4.2 - 6.2 %، واللاكتوز 5.8 %، ووزن جزة الصوف الخام للذكور 4.2 كغ، وللإناث 2.8 كغ. بينما متوسط وزن الجزة المغسولة 1.2 كغ، وطول الخصلة 8 - 23 سم.

عروق وسلالات الأغنام المدخلة

الى بعض دول الخليج العربي

الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

دولة قطر

دولة الكويت

غنم الرأس الأحمر الداكن

المنشأ و الانتشار:

منشؤه إيران، وانتشر منها إلى دول كثيرة، وتركز انتشاره في العراق وجميع دول الخليج، وأدخل بخاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساهمته النسبية 4 %، ويعيش تحت نظام الرعاية شبه المكثف، ويتركب القطيع من 25 % ذكور و75 % إناث، يتغذى بنسبة 6 % على المراعي الطبيعية و14 % على مخلفات المحاصيل الحقلية و80 % على الأعلاف المركزة. بلغ تعداده 73 ألف رأسٍ عام 2008.

تتأقلم الحيوانات خارج موطنها الأصلي، وتستجيب للتحسين الوراثي وعندها ظاهرة الأمومة، وهي في تزايد.



غنم الرأس الأحمر الداكن

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أحمر داكن. الرأس متوسط الحجم ومقطعه مستقيم، تتواجد القرون عند الذكور، الآذان طويلة ومتدلية. ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 81 - 82 سم، والإناث 71 سم، وطول الجسم المستقيم عند الذكور 74 سم، وعند الإناث 66 سم، الذيل رفيع وقصير.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم عند الذكور التامة النمو 53.5 كغ، وعند الإناث مابين 37 - 38 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 5.5 - 6 شهور. العمر عند الولادة الأولى مابين 12 - 15 شهراً، تلقح الإناث بوزن مابين 35 - 42 كغ، معدل الولادات 80 - 84 %، نسبة التوائم 5 %، الفترة بين ولادتين 7 - 8 شهور. متوسط وزن المواليد الذكور مابين 3 - 3.5 كغ، والمواليد الإناث 3كغ، تفطم المواليد الذكور بوزن 13 كغ، والمواليد الإناث 12 كغ. معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام مابين 80 - 100 غ، وزن الذبيحة 30 كغ.

غنم الكيوس

المنشأ و الانتشار:

منشؤه أستراليا، ومنها انتشر إلى دول عديدة من العالم، وأدخل إلى مملكة البحرين عن طريق قبرص، وانتشر في مناطق عديدة من مملكة البحرين، ويعيش تحت نظام الرعاية المكثف.

غنم الكيوس

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، وحجم الحيوانات كبير ونادراً مايكون باللون البني، الوجه أبيض مع وجود بقع سوداء بخاصة حول العيون ومقدمة الفم، أو قد يكون لون الوجه أسود أحياناً. القوائم طويلة، الرأس كبير الحجم ومقطعه مستقيم، الآذان طويلة متدلية.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 65 - 90 كغ، ووزن الجسم للإناث مابين 48 - 70 كغ. تلقح الإناث بعمر مابين 8 - 9 أشهر، متوسط وزن المواليد مابين 3.75 - 3.85 كغ. تفطم الحملان بعمر 45 يوماً وبوزن مابين 14.8-15.61كغ.
النضج الجنسي مبكر ومعدل التبويض عالي وفرص إنتاج التوائم كبيرة.
تنتج النعاج الحليب، ويتراوح إنتاج النعجة في الموسم مابين 120 - 300 كغ حليب، ويعتمد هذا الإنتاج على نظام الرعاية المتبع. تنتج الحيوانات الصوف متوسط النعومة، ويتراوح وزن جزة الصوف الخام مابين 1.2 - 2.2 كغ.

غنم المرينو

المنشأ و الانتشار:

منشؤه شمال أوروبا، وانتشر إلى أستراليا، وأدخل منها إلى مملكة البحرين، وانتشر في مناطق عديدة من المملكة. ويتأقلم في بيئات مختلفة، ويتحمل الظروف المناخية الصعبة.

غنم المرينو

الصفات الشكلية:

حجم الحيوانات كبير، الجسم مسطح ومكتنز باللحم، والوجه عاري من الصوف، لون الحيوانات من الخارج رمادي ولون الألياف الصوفية الداخلية بيضاء، الرأس صغير الحجم وعديم القرون، ومقطعه مستقيم، الآذان صغيرة ومنتصبة.

الصفات الإنتاجية:

نمو الحيوانات سريع والجسم مكتنز باللحم، والصوف ناعم، ويتراوح جزة الصوف الخام مابين 7 - 8 كغ. وتم استيراده للمملكة من أجل اللحم الذي يقبل عليه المستهلك البحريني نتيجة رخص ثمنه.

غنم الرأس الأسود الصومالي

المنشأ والانتشار:

منشؤه منطقة القرن الإفريقي، وأدخل إلى سلطنة عمان ومعظم دول الخليج العربي وبخاصة قطر والبحرين، ومناطق انتشاره الرئيسية إفريقيا ودول الخليج، ويسمى في دول الخليج الصومالي. مساهمته النسبية 50 - 60 % في النظام شبه المكثف، و35 - 45 % في النظام المكثف، و5 % في النظم الأخرى، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور ومن 60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 10 % ذكور و90 % إناث، ونسبة التغذية على المخلفات الزراعية 65 %، والتغذية على المركزات 35 %، وفترة التغذية على المخلفات الزراعية 365 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 360 يوماً، وهو حيوان قابل للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج الموطن الأصلي وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وتم خلطه مع عروق أخرى.

غنم الرأس الأسود الصومالي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أسود، رأسه متوسط الحجم وعديم القرون، ومقطع الرأس مستقيم والآذان متدلية وقصيرة، ويوجد لبب تحت الرقبة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور بين 60 - 70 سم وعند الإناث بين 55 - 65 سم وطول الجسم عند الذكور بين 90 - 95 سم، وعند الإناث 80 - 95 سم، والصوف خشن.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 55 - 60 كغ وللإناث 50 - 55 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث البالغة جنسياً مابين 6 - 8 أشهر. موسم التناسل الرئيس يبدأ بشهر حزيران/يونيو ويمتد حتى أيلول/سبتمبر، تلقح الإناث بوزن مابين 30 - 35 كغ، معدل الولادات 80 %. والعمر عند الولادة الأولى بين 14 - 15 شهراً، ونسبة التوائم 2 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً. يتراوح وزن المواليد الذكور مابين 2 - 3 كغ، والمواليد الإناث 2 - 2.5 كغ، تفطم الذكور بوزن بين 20 - 25 كغ، والإناث بين 18 - 20 كغ. تسوق الحيوانات بوزن 40 كغ وبعمر 180يوماً، نسبة تصافي الذبيحة 65 %، ونسبة تشافيها 55 %، وزن جزة الصوف الخام 2.5 - 3 كغ، والجزة المغسولة النظيفة (2 - 2.8) كغ. أما إنتاج الحليب فيكفي الحملان الرضيعة.

غنم الرأس الأسود الصومالي

عروق الأغنام
في
المملكة العربية السعودية

غنم النجدي

المنشأ والانتشار:

منشؤه المملكة العربية السعودية، وانتشر في كافة مناطق المملكة، وبخاصة المنطقة الوسطى، وبعض دول الخليج والدول المجاورة مثل الأردن، ومساهمته النسبية 80 % في النظام السرحي 20 % في النظام شبه المكثف وحجم الحيازة في النظام السرحي مابين 20 - 50 رأساً، وحجم الحيازة في النظام شبه المكثف 50 - 100 رأسٍ، ويتركب القطيع النامي من 5 % ذكور ومن 10 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 15 % ذكور و70 % إناث، ونسبة التغذية على المرعى 90 %، والتغذية على المواد العلفية المركزة 10 % وفترة الرعي 200 يومٍ، والتغذية على المركزات 100 يومٍ، وهو في تزايد.

غنم النجدي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود أو أبيض أو ملون أسود وأبيض، ولون الوجه أبيض أو ملون أبيض وأسود، ورأسه متوسط الحجم وتتواجد القرون عند الذكور بنسبة قليلة ومقطع الرأس محدب عند الذكور والإناث والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 80 - 90 سم، وعند الإناث 75 - 80 سم، وطول الجسم عند الذكور 110 - 125 سم، وعند الإناث 100 - 115 سم، ويصنف من أغنام الصوف الخشن والذيل الغليظ.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح متوسط وزن الذكور التامة النمو مابين 55 - 60 كغ، والإناث 50 - 55 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ

الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، وموسم التناسل على مدار العام، تلقح الإناث لأول مرة بوزن مابين 35 - 45 كغ، ومعدل الولادات 85 %، والعمر عند الولادة الأولى 12 - 18 شهراً، ونسبة التوائم 20 - 50 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 3 كغ والمواليد الإناث 2.3 كغ، ووزن الذكور المفطومة 25 كغ، والإناث المفطومة 20 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 300 غ وللإناث 250 غ، تسوق الحيوانات بوزن 45 كغ وبعمر 200 يوم، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى التسويق 184 غ. وتتراوح أوزان الذبائح مابين 43 - 53 كغ، ونسبة تصافي الذبيحة 45 - 50 %. يبلغ إنتاج النعجة من الحليب مابين 1.2 - 1.5 كغ يومياً في موسم إدرار طوله 120 - 150يوماً. ويتراوح وزن جزة الصوف الخام مابين 2.2 - 3 كغ، ووزن الجزة المغسولة النظيفة مابين 1.3 - 2.2 كغ وطول الخصلة مابين 13 - 20 سم وقطر الليفة مابين 20 - 68 ميكرون.

غنم النجدي

غنم الحري الحبصي

المنشأ والانتشار:

منشؤه هضبة الحبشة وانتشر منها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية وأهمها جبال عسير والحجاز، وبعض دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، ويسمى محلياً الحبشي، والحجري، والحري، حبص طمطمة، مساهمته النسبية 60 % في النظام السرحي، و40 % في النظام المكثف، ونسبة التغذية على المرعى 60 %، نسبة التغذية على المخلفات الزراعية 25 %، ونسبة التغذية على المواد العلفية المركزة 15 %، ويمتاز هذا الحيوان بقابليته للتحسين الوراثي، وبتأقلمه بشكل جيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ومقاوم للأمراض، وتم خلطه مع سلالات أخرى.

غنم الحري الحبصي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أبيض أو ملون، ورأسه كبير وتتواجد القرون عند الذكور بنسبة قليلة ومقطع الرأس محدب عند الذكور والإناث، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 80 - 90 سم وعند الإناث 60 - 80 سم، وطول الجسم عند الذكور 90 - 100 سم وعند الإناث 80 - 95 سم، ويصنف من أغنام الصوف الخشن، الذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 30 كغ، وللإناث 25 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، وموسم التناسل على مدار العام، تلقح الإناث لأول مرة بوزن 35 كغ، ومعدل الولادات 80 %، والعمر عند الولادة الأولى 12 - 18 شهراً، ونسبة التوائم 20 - 50 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً. المواليد صغيرة، يبلغ متوسط وزن المواليد الذكور 2 كغ، والمواليد الإناث 1 كغ، ووزن الذكور المفطومة 6 كغ، والإناث المفطومة 5 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 50 غ.

تسوق الحيوانات بوزن 40 كغ وبعمر 240 يوماً، ومعدل النمو اليومي من الميلاد وحتى التسويق 180 غ، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 46 - 50 كغ، ونسبة تصافي الذبيحة 45 - 50 % . أما إنتاج الحليب فهو قليل جداً، تنتج النعجة بالمتوسط 30 كغ فقط. الصوف خشن وطول الخصلة 20 - 30 ميكرون.

غنم الحري الحبصي

غنم الحري دعدي

المنشأ والانتشار:

منشؤه المملكة العربية السعودية، وانتشر في كافة مناطق المملكة، وبخاصة منطقة الطائف والمناطق الغربية من المملكة، ويسمى محلياً دعدي، مساهمته النسبية 80 % في النظام السرحي و 20 % في النظام شبه المكثف، ونسبة التغذية على المرعى 80 %، وعلى المخلفات الزراعية 15 %، والمركزات 5 %، ويمتاز هذا الحيوان بقابليته للتحسين الوراثي وبتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ومقاوم للأمراض، وتم خلطه مع سلالات أخرى، وهو في تزايد مستمر.

غنم الحري دعدي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أبيض، ورأسه كبير وتتواجد القرون عند الذكور بنسبة قليلة جداً، ومقطع الرأس محدب عند الذكور والإناث والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 90 - 97 سم وعند الإناث 70 - 89 سم، وطول الجسم عند الذكور 120 سم وعند الإناث 100 سم، والذيل على شكل الإلية متوسط الحجم ينتهي بطرف دقيق مع التواء خفيف، والصوف خشن .

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 30 كغ، وللإناث 25 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، وموسم التناسل على مدار العام، تلقح الإناث لأول مرة بوزن 35 كغ، ومعدل الولادات 85 %، والعمر

عند الولادة الأولى 12 - 18 شهراً، ونسبة التوائم 20 - 50 %، والفترة مابين ولادتين 8 - 12 شهراً.
متوسط وزن المواليد الذكور 2 كغ، والمواليد الإناث 1 كغ، ووزن الذكور المفطومة 7 كغ، والإناث المفطومة 6 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 55 غ.
تسوق الحيوانات بوزن 45 كغ وبعمر 240 يوماً، ومعدل النمو اليومي من الميلاد وحتى التسويق 180غ، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 46 - 56 كغ ونسبة التصافي فيها 45 - 50 % . أما إنتاج الحليب فيكاد يكفي للمواليد الرضيعة، ووزن جزة الصوف الخام 1 كغ وطول الخصلة 35 سم.

غنم الحري دعدي

غنم الحري رفيدي

المنشأ والانتشار:

منشؤه المملكة العربية السعودية الساحل الغربي، وانتشر في المنطقة الغربية، وتركز انتشاره في المنطقة الجنوبية، ويسمى محلياً رفيدي، مساهمته النسبية 70 % في النظام السرحي، و 30 % في النظام شبه المكثف، ونسبة أيام الرعي 80 %، والتغذية على المخلفات الزراعية 20 %، ويمتاز هذا الحيوان بقابليته للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ومقاوم للأمراض، وتم خلطه مع سلالات أخرى، وهو في تزايد مستمر.

غنم الحري رفيدي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أبيض، ورأسه متوسط الحجم، وعديم القرون ومقطع الرأس محدب عند الذكور والإناث والآذان قصيرة جداً، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 80 - 87 سم وعند الإناث 60 - 80 سم، وطول الجسم عند الذكور 99 سم وعند الإناث 90 سم، والذيل متوسط الحجم ينتهي بطرف دقيق مع التواء خفيف، والصوف خشن.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 25 كغ، وللإناث 22 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، وموسم التناسل على مدار العام، ومعدل الولادات 85 %، والعمر عند الولادة الأولى 12 - 18 شهراً، ونسبة التوائم 20 - 50 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 % شهراً.

متوسط وزن المواليد الذكور 1.6 كغ، والمواليد الإناث 1 كغ، ووزن الذكور المفطومة 7 كغ، والإناث المفطومة 6 كغ، تسوق الحيوانات بوزن 45 كغ وبعمر 240 يوماً، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور والإناث 180 غ.

تتراوح أوزان الذبائح مابين 46 - 56 كغ ونسبة التصافي فيها 45 - 50 % . وزن جزة الصوف الخام 1 كغ وطول الخصلة 20 سم.

غنم الحري رفيدي

غنم الحري دقسي

المنشأ والانتشار:

منشؤه المملكة العربية السعودية، وانتشر بشكل خاص في المنطقة الغربيةمنها، ويسمى محلياً دقسي أو قدسية، مساهمته النسبية 90 % في النظام السرحي، و 10 % في النظام شبه المكثف، ونسبة أيام الرعي 90 %، ونسبة التغذية على المخلفات الزراعية 10 %، وعدده 300 رأسٍ وهو في تناقص ونادر.

غنم الحري دقسي

الصفات الشكلية:

لون الجسم بني متموج، ولون الوجه بني، ورأسه متوسط وعديم القرون، ومقطع الرأس محدب عند الذكور والإناث والآذان متدلية طويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 90 - 95 سم، وعند الإناث مابين 65 - 80 سم، وطول الجسم عند الذكور 100سم وعند الإناث 95 سم، والذيل متوسط الحجم ينتهي بطرف دقيق مع التواء خفيف، والصوف خشن.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 30 كغ، وللإناث 25 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، وموسم التناسل على مدار العام، تلقح الإناث لأول مرة بوزن وسطي 35 كغ، ومعدل الولادات 85 %، والعمر عند الولادة الأولى 12 - 18 شهراً، ونسبة التوائم 20 - 50 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 % شهراً.

متوسط وزن المواليد الذكور 2 كغ، والمواليد الإناث 1 كغ، ووزن الذكور المفطومة 7 كغ، والإناث المفطومة 6 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور والإناث 55 غ.

تسوق الحيوانات بوزن 45 كغ وبعمر 240 يوماً، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى التسويق 180 غ، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 46 - 56 كغ، ونسبة التصافي مابين 45 - 50 % . ووزن جزة الصوف الخام (1) كغ وطول الخصلة 20 سم.

غنم الحري دقسي

عروق الأغنام
في
جمهورية السودان

غنم الكبّاش

المنشأ و الانتشار:

منشؤه نموذج من الأغنام الصحراوية السودانية، وانتشر في شمال ووسط ولايتي كردفان ودارفور، ومناطق الانتشار الرئيسة غرب النيل في محافظتي كردفان ودارفور، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسمى محلياً الكبابيش. مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي. وهو حيوان يتأقلم خارج موطنه الأصلي وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض.

أنثى غنم الكبّاش

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض أو بني، رأسه كبير، وتتواجد القرون عند الذكور وبنسبة قليلة، مقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 91 سم، وعند الإناث 76 سم، وطول الجسم عند الذكور 97 سم، وعند الإناث 86 سم، الصوف خشن والذيل رفيع وطويل.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، موسم التناسل مابين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، معدل الولادات 62 %، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 19 شهراً، ونسبة التوائم 15 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً. متوسط وزن المواليد الذكور 3 كغ، والمواليد الإناث 2 كغ. متوسط وزن الذكور المفطومة 17 كغ، والإناث المفطومة

15 كغ. معدل النمو اليومي حتى الفطام 103 غ، متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 90 كغ والإناث 70 كغ. وزن التسويق 65 كغ بعمر 180 يوماً، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 150غ، يتراوح وزن الذبائح مابين 46 - 54 كغ وبمتوسط نسبة تصافي 45 - 50 %. يبلغ إنتاج النعاج من الحليب مابين 150 - 200 كغ في موسم إدرار طوله 150 - 200 يوم بإنتاج 1كغ حليب يومي لكل نعجة.

ذكر غنم الكباش

غنم الوتيش

المنشأ و الانتشار:

نموذج من الأغنام الصحراوية السودانية، ومنشؤه جنوب الجزيرة، وانتشر في الهدى ووسط الجزيرة، ومناطق الانتشار الرئيسة خطي العرض 9 - 15 شمالاً وخطي الطول 32 و 33 شرقاً البطانة وجنوب الجزيرة، ويسمى محلياًالوتيش. مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، وحجم الحيازة بين 50 - 250 رأساً في النظام السرحي، ويتركب القطيع النامي من 10 % ذكور ومن 20 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 50 % ذكور و50 % إناث، ونسبة التغذية على المرعى 20 % والتغذية على مخلفات المحاصيل 50 % والتغذية على المواد العلفية المركزة 30 %. حيوان يستجيب للتحسين الوراثي، ويتأقلم بشكل جيد خارج موطنه الأصلي وعنده ظاهرة الأمومة ويقاوم الأمراض.

غنم الوتيش

الصفات الشكلية:

لون الجسم بني وأبيض، ولون الوجه أبيض وأحمر، رأسه صغير وللذكور قرون صغيرة ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 88 سم ، وعند الإناث 79 سم، وطول الجسم عند الذكور 75 سم، وعند الإناث 65 سم، والصوف ناعم، والذيل رفيع وقصير.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 7 - 12 شهراً، وموسم التناسل مابين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، تلقح الإناث لأول مرة بوزن مابين 30 - 35 كغ، ومعدل الولادات 80 %، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 19 شهراً، ونسبة التوائم 25 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً.

متوسط وزن المواليد الذكور 3 كغ والمواليد الإناث 2 كغ، تفطم الذكور بوزن 16 كغ والإناث 14 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور 150غ وللإناث 148 غ، وزن الجسم للذكور التامة النمو 30 كغ وللإناث 28 كغ. تسوق الحيوانات بوزن 55 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 150غ وعمر التسويق مابين 365 - 730 يوماً، ويتراوح أوزان الذبائح مابين 46 - 54 كغ، ونسبة التصافي 49 % ويتراوح إنتاج الإناث من الحليب مابين 27 - 54 كغ خلال فترة إدرار 60 - 90 يوماً، وبإنتاج حليب يومي مابين 0.5 - 1.5 كغ لكل نعجة.

غنم الوتيش

غنم الدُباسي

المنشأ و الانتشار:

منشؤه نموذج من الأغنام الصحراوية السودانية، شرق الجزيرة، وانتشر في شرق ووسط الجزيرة، ومناطق الانتشار الرئيسة سهل البطانة من عفيرة إلى كسلا شرق ووسط الجزيرة، ويسمى محلياً الابرق، البطانة، المسلمي. مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، وحجم الحيازة بين 100 - 300 رأسٍ في النظام السرحي.

غنم الدُباسي

يتركب القطيع النامي من 10 % ذكور، و20 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 25 % ذكور و 75 % إناث، ونسبة التغذية على المراعي 20 % والتغذية على مخلفات المحاصيل 50 %، والتغذية على المواد العلفية المركزة 30 %، وهو حيوان يستجيب للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وتم خلطه مع سلالة الأشقر.

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض وأسود، ولون الوجه أبيض وأسود، رأسه متوسط ولا يوجد قرون ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 91 سم وعند الإناث 79 سم وطول الجسم عند الذكور 94 سم وعند الإناث 83 سم، والصوف نصف ناعم والذيل رفيع وطويل.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 7 - 9 أشهر، وموسم التناسل مابين آذار/مارس وأيار/مايو، وتلقح الإناث لأول مرة بوزن مابين 35 - 45 كغ، ومعدل الولادة 85 %، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 19 شهراً، ونسبة التوائم 30 % والفترة بين ولادتين 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 4 كغ، والمواليد الإناث 3 كغ، وتفطم الذكور بوزن 20 كغ، والإناث 15كغ، ومعدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور 150غ، وللإناث 148 غ، ووزن الجسم البالغ للذكور 35كغ والإناث 30 كغ، وتسوق الحيوانات بوزن 45 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 150غ وعمر التسويق 420 يوماً، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 46 - 56 كغ ومتوسط نسبة التصافي 49 %. يبلغ إنتاج النعاج من الحليب مابين 90 - 150 كغ خلال فترة إدرار طولها 60 - 180 يوماً، وبإنتاج يومي 0.5 - 1.5كغ حليب لكل نعجة.

غنم الدُباسي

غنم الأشقر

المنشأ و الانتشار:

منشؤه نموذج من الأغنام الصحراوية السودانية غرب الجزيرة، وانتشر في ولاية نهر النيل والشمالية، ومناطق الانتشار الرئيسة سهل البطانة والجزيرة والنيل الأبيض، ويسمى محلياً الأشقر. مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، وبحجم حيازة بين 100 - 500 رأس، ويتركب القطيع النامي 10 % ذكور، و20 % إناث، أما الحيوانات المنتجة (15 %) ذكور و85 % إناث، ونسبة التغذية على المراعي 20 % والتغذية على مخلفات المحاصيل 50 %، والتغذية على المواد العلفية المركزة 30 %، وهو حيوان يستجيب للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وتم خلطه مع سلالة الدباسي.

نعاج غنم الأشقر

الصفات الشكلية:

لون الجسم أشقر بني فاتح، ولون الوجه أشقر، رأسه متوسط وتتواجد القرون عند الذكور بنسبة قليلة، ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 98 سم و عند الإناث 78 سم وطول الجسم عند الذكور 94 سم وعند الإناث 84 سم، والصوف نصف ناعم والذيل رفيع وطويل.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 7 - 9 أشهر، وموسم التناسل ما بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، وتلقح الإناث لأول مرة بوزن مابين 35 - 45 كغ، ومعدل الولادة 85 %، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 19 شهراً، ونسبة

التوائم 50 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 4 كغ، والمواليد الإناث 3 كغ، وتفطم الذكور بوزن 20 كغ، والإناث 18كغ، ومعدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور 130غ وللإناث 128غ، ووزن الجسم البالغ للذكور 35 كغ، والإناث 30 كغ، وتسوق الحيوانات بوزن 45 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 50 غ وعمر التسويق 420 يوماً، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 46 - 56 كغ، ومتوسط نسبة التصافي 49 %. يبلغ إنتاج النعاج من الحليب مابين 90 - 150كغ خلال فترة إدرار طولها 60 - 180يوماً، وبإنتاج يومي 0.5 - 1.5كغ حليب لكل نعجة.

كبش غنم الأشقر

الغنم النيلي السوداني

المنشأ و الانتشار:

منشؤه من الأغنام المصرية القديمة أو محلي، وانتشر في جنوب السودان وجبال النوبة، ومناطق الانتشار الرئيسة جنوب السودان وجبال النوبة، ويسمى محلياً السودانية الجنوبية. مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، وبحجم حيازة 50 رأساً، وهو يستجيب للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض.

الغنم النيلي السوداني

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض مع بقع بنية أو سوداء، الرأس متوسط الحجم، وتتواجد القرون عند الذكور بنسبة قليلة، ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية طويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 98 سم، وعند الإناث 78 سم، وطول الجسم عند الذكور 94 سم وعند الإناث 89 سم، والصوف ناعم والذيل رفيع وطويل.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 7 - 8 أشهر، وموسم التناسل على مدار العام. تلقح الإناث بوزن وسطي 24 كغ، ومعدل الولادة 60 %، والعمر عند الولادة الأولى مابين 12 - 16 شهراً، ونسبة التوائم 0 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً، متوسط وزن الذكور عند الميلاد 2.5 كغ، والإناث 2.2 كغ، وتفطم الذكور بوزن 12.6 كغ، والإناث بوزن 11.7 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور 112 غ، والإناث 104 غ، ومتوسط وزن الجسم للذكور البالغة 24 كغ،

وللإناث البالغة 19 كغ، تسوق الحيوانات بوزن 45 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 126 غ، وعمر التسويق 420 يوماً، ومتوسط وزن الذبيحة 45 كغ، ونسبة التصافي 50 %.
يبلغ إنتاج النعاج من الحليب بشكل وسطي 38 كغ خلال فترة إدرار 97 يوماً وبإنتاج يومي للحليب لكل نعجة 0.37 كغ.

الغنم النيلي السوداني

غنم البَيجة

المنشأ و الانتشار:

منشؤه نموذج من الأغنام الصحراوية السودانية شرق السودان ، وانتشر في شرق السودان، بين نهر عطبرة والبحر الأحمر. مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، وحجم الحيازة بين 100 - 200 رأس في النظام السرحي، ويتركب القطيع النامي 10 % ذكور، و20 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور، و65 % إناث، ونسبة التغذية على الرعي 20 % والتغذية على المخلفات 50 % والتغذية على المركزات 30 % ويستجيب للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة ويقاوم الأمراض.

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض ، ولون الوجه أبيض مع بني و أسود ، رأسه متوسط ولا يوجد قرون، ومقطع الرأس محدب، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 64 سم، و عند الإناث 53 سم، ويصنف من أغنام الشعر والذيل الرفيع، والذيل رفيع وطويل.

الخصائص الإنتاجية:

يبلغ عمر الذكور والإناث عند البلوغ 7 - 9 شهور، وموسم التناسل غير موسمي، والوزن عند التلقيح 35 - 45 كغ، ومعدل الولادات 85 %، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 19 شهرا ونسبة التوائم نادرة والفترة بين ولادتين 12 شهراً.يبلغ وزن الذكور عند الميلاد 3 كغ والإناث 2.5 كغ، ووزن الفطام للذكور والإناث بين 15 - 17 كغ ومعدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور غ والإناث بين 148 - 150غ، ووزن الجسم البالغ عند الذكور35 كغ، والإناث 30كغ، ووزن التسويق 45 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 100 غ، ووزن الذبيحة 45 كغ، والصوف نصف ناعم .

غنم الزَغاوة

المنشأ و الانتشار:

منشؤه شمال غرب دارفور ، وانتشر بين خطي العرض 15 - 16 شمالاً وحول خط الطول 24 شرقاً. مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، وحجم الحيازة بين 100 - 200 رأس في النظام السرحي، ويستجيب للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، والاتجاه بتناقص.

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أسود، رأسه متوسط الحجم ويوجد قرون للذكور فقط، ومقطع الرأس محدب قليلاً، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 76 - 86 سم و عند الإناث 71 - 76 سم ، ويصنف من أغنام الشعر والذيل الرفيع.

الخصائص الإنتاجية:

يبلغ عمر الذكور والإناث عند البلوغ 9 شهور، وموسم التناسل بين آذار/مارس ونيسان/أبريل ، والوزن عند التلقيح 35-40 كغ، ومعدل الولادات 85 %، ونسبة التوائم 5 % والفترة بين ولادتين 7 - 10 شهور. يبلغ وزن الذكور عند الميلاد 3 كغ، والإناث 2.5 كغ، ووزن الفطام للذكور والإناث بين 15-17 كغ ومعدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور والإناث بين 140 - 150غ، ووزن الجسم البالغ عند الذكور 36 كغ والإناث 29 كغ، ووزن التسويق 45 كغ، ومعدل النمو اليومي حتى التسويق 100 غ ، ووزن الذبيحة 41 كغ.

عروق الأغنام
في
جمهورية العراق

غنم العرابي

المنشأ و الانتشار:

منشؤه بلاد مابين النهرين دجلة والفرات، انتشر في جنوب شرقي العراق، وأدخل إلى شرقي السعودية، والكويت، يسمى محلياً العرابي. مساهمته النسبية 80 % في النظام السرحي وبحيازة مابين 100 - 400 رأس، و 20 % في النظام شبه المكثف بحيازة مابين 100 - 200 رأس، ويتركب القطيع النامي من 50 % ذكور و50 % إناث، أما المنتج 5 % ذكور و95 % إناث، ويعتمد في التغذية على الرعي بنسبة 75 % والمخلفات الزراعية 25 %، قابل للتحسين الوراثي، يتأقلم خارج موطنه، مقاوم للأمراض، وهو في تزايد مستمر.

ذكر غنم العرابي

الصفات الشكلية:

اللون أبيض، أو أسود، أو بني، أو بني مائل إلى الحمرة، الوجه أبيض، أو أسود، أو بني، الرأس صغير ذو قرون عند الذكور، مقطع الرأس محدب، الآذان متدلية وطويلة، ارتفاع الجسم عند الذكور 100 سم، وعند الإناث 80 سم، طول الجسم عند الذكور 110 سم، وعند الإناث 100 سم، الصوف خشن، الذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم التام النمو للذكور 40 كغ، وللإناث 38 كغ، يتراوح العمر عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، التناسل مرتين في العام بالصيف والربيع، والموسم الرئيس يبدأ في حزيران/ يونيو ويستمر حتى أيلول/ سبتمبر. تلقح الإناث بوزن 40 كغ، معدل الولادات 80 - 90 %، العمر عند الولادة الأولى 13 - 19 شهراً، نسبة التوائم 1 - 5 % الفترة

بين ولادتين 12 شهراً، متوسط وزن الذكور الفردية عند الميلاد 4.8 كغ، والإناث 4.1 كغ. وزن الذكور المفطومة 16 كغ، والإناث المفطومة 15 كغ. معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 186 غ وللإناث 180 غ.

تسوق الحيوانات للذبح بوزن 35 كغ وبعمر 200 يوم، معدل النمو من الميلاد حتى التسويق 178 غ. نسبة تصافي الذبيحة (51 %)، وتتراوح نسبة التشافي مابين 70 - 75 % .

متوسط إنتاج النعجة من الحليب 52 كغ في موسم إدرار طوله 85 يوماً، ويقدر متوسط الإنتاج اليومي من الحليب 600 غ، ويتكون الحليب من 16 % مواد صلبة كلية، ونسبة دهن 5.5 - 6.5 %، وبروتين 6 %، ولاكتوز 5 %، وزن جزة الصوف الخام 1.5 كغ، وتتراوح طول خصلة الصوف مابين 8 - 16.8 سم.

أنثى غنم العرابي

غنم الكرادي

المنشأ و الانتشار:

منشؤه منطقة شمال العراق، وانتشر في المحافظات الشمالية منه، ويسمى محلياً الكردية، الهركية، الجاف، الدزدية، الحمدانية. مساهمته النسبية 60 % في النظام السرحي، و20 % في النظام شبه المكثف، و20 % في النظام المكثف، وحجم الحيازة في النظام السرحي مابين 50 - 300 رأس، و50 - 200 رأس في النظام شبه المكثف، ومابين 50 - 100 رأس في النظام المكثف، ويتركب القطيع النامي من 50 % ذكور، ومن 50 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 10 % ذكور، و90 % إناث، ونسبة أيام الرعي 75 %، والتغذية على المخلفات الزراعية 25 %، وفترة الرعي 270 يوماً وفترة التغذية على المخلفات 90 يوماً، وبلغت أعداده 2.4 مليون رأس عام 2007، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، ويمتاز بظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وتم خلطه مع عروق أخرى، وهو في تزايد.

غنم الكرادي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الجه أسود أو بني غامق، رأسه كبير ولا توجد قرون، ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 120 سم، وعند الإناث 90 سم، وطول الجسم عند الذكور 120 سم، وعند الإناث 110 سم، والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 70 كغ، وللإناث 60 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث البالغة جنسياً مابين 6 - 8 أشهر. موسم التناسل موسمين بالسنة، والموسم الرئيس يبدأ في حزيران/يونيو، ويمتد حتى أيلول/سبتمبر.

تلقح النعاج لأول مرة بوزن 42 كغ، معدل الولادات مرتين بالسنة، العمر عند الولادة الأولى 14 - 19 شهراً، ونسبة التوائم 1 - 5 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً.

متوسط وزن المواليد الذكور الفردية 4.4 كغ، والإناث الفردية 4 كغ، ووزن الذكور المفطومة 24 كغ، والإناث المفطومة 23 كغ. ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 300 غ، وللإناث 250 غ.

يتراوح وزن الحيوانات عند التسويق مابين 35 - 45 كغ، معدل النمو اليومي من الميلاد حتى التسويق 260 - 328غ، العمر عند التسويق 200 يوم. نسبة تصافي الذبيحة 52 %، وتشافي الذبيحة 35 % .
يبلغ إنتاج النعجة من الحليب مابين 59.2 - 91.6 كغ في موسم إدرار طوله 85 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي من الحليب مابين 696 - 1007 غ، يتركب الحليب من 16 % مواد صلبة كلية، وتتراوح نسبة الدسم مابين 3.5 - 5.5 %، ونسبة البروتين 6 %، ونسبة اللاكتوز 5.5 %، ويتراوح وزن جزة الصوف الخام مابين 2.5 - 4 كغ، ويصل طول الخصلة إلى 19.3 سم.

عروق الأغنام
في
سلطنة عمان

الغنم العماني

المنشأ و الانتشار:

منشؤه سلطنة عمان وتحديداً شمال السلطنة، وانتشر في مناطق ظفار، وتركز انتشاره في مسقط، الباكية، مستدم، الظاهرة، الداخلية، ومختلف المناطق في سلطنة عمان، ويسمى محلياً العماني، مساهمته النسبية 8.78 % في النظام السرحي، و90.15 % في النظام شبه المكثف، و 1.06 % في النظام المكثف، وحجم الحيازة في النظام السرحي مابين 3 - 12 رأساً، و12 رأساً في النظام شبه المكثف، و 13 رأساً في النظام المكثف، ويتغذى على المراعي والمخلفات الزراعية، وبلغت أعداده 338.226 رأساً في عام 2003، ويستجيب للتحسين الوراثي، ومقاوم للأمراض، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي وهو في تزايد.

أنثى غنم عماني

ذكر غنم عماني

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، بني، أسود، ولون الوجه بني، أسود، ورأسه متوسط والمقطع محدب قليلاً ويوجد قرون للذكر، والآذان متدلية قصيرة، والصوف خشن والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 41.3 كغ والإناث البالغة 38 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 12 - 18 شهراً، وموسم التناسل على مدار العام. وتلقح الإناث بوزن 35 كغ، ومعدل الولادات 100 %، والعمر عند الولادة الأولى 18 - 20 شهراً، ونسبة التوائم 35 - 40 % والفترة بين الولادتين 8 - 12 شهراً.

متوسط وزن الذكور عند الميلاد 3.2 كغ والمواليد الإناث 2.9 كغ، وزن الذكور المفطومة 14.25 كغ والإناث المفطومة 13.16 كغ.

معدل النمو اليومي من الميلاد وحتى الفطام للذكور 102 غ وللإناث 99 غ. تسوق الحيوانات بوزن 27.99 كغ، أما أوزان الذبائح فيتراوح مابين 40 - 45كغ ومتوسط نسبة التصافي 52 %، ويتراوح إنتاج النعجة من الحليب مابين 90 - 126 كغ بموسم إدرار طوله مابين 180 - 210 أيام، ويقدر الإنتاج اليومي من الحليب مابين 0.5 - 0.7 كغ.

تنتج الحيوانات الصوف الخشن ويتراوح وزن جزة الصوف الخام مابين 1.5 - 2 كغ، والصوف المغسول النظيف 0.75 - 1 كغ.

عروق الأغنام في دول المغرب العربي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

الجمهورية التونسية

غنم أولاد جلال

المنشأ و الانتشار:

منشؤه الهضاب الوسطى والشرقية من الجزائر، وانتشر من وادي الطويل في وسط الجزائر حتى غرب تونس، ومناطق انتشاره الرئيسة أولاد نايل، الجلفة، سيدي عيسى، بوسعادة، السيلة، بريكة، سطيف، عين مليلة، عين البيضاء، تيارت وأولاد جلال، ويسمى محلياً الضنية (أولاد نايل)، الشلالية، الجلالية، العربية البيضاء، الغربية (في تونس)، مساهمته النسبية 80 % في النظام السرحي، و20 % في النظام شبه المكثف، ويتراوح حجم الحيازة في النظام السرحي مابين 10 - 3000 رأس، و250 - 1000 رأس في النظام شبه المكثف، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور، و60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور، و95 % إناث، ونسبة أيام الرعي 98 %، والتغذية على المركزات بنسبة 2 %، وفترة الرعي 305 أيام، وهو في تزايد. وهو حيوان قابل للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي بشكل جيد، وعنده ظاهرة الأمومةً ويقاوم الأمراض.

ذكر غنم أولاد جلال

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أبيض ورأسه متوسط ويوجد قرون للذكور ونادراً عند الأنثى، ومقطع الرأس محدب عند الذكور، ومستقيم عند الإناث، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 80 سم، وعند الإناث 70سم، وطول الجسم عند الذكور 89 سم، وعند الإناث 77.7 سم، والصوف متوسط النعومة والذيل رفيع.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 83 كغ، وللإناث 60 كغ. يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ مابين 8 - 10 أشهر، موسم التناسل في الربيع، تلقح النعجة لأول مرة بوزن 45 كغ. العمر عند الولادة الأولى 14 - 15 شهراً، ونسبة التوائم 5 % والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

يتراوح وزن المواليد الذكور مابين 3.5 - 3.8 كغ، والإناث مابين 3.4 - 3.5 كغ، ووزن الذكور المفطومة مابين 24 - 29 كغ، والإناث المفطومة مابين 23 - 26 كغ. معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 200 غ، وللإناث 187.5 غ، وزن الذبيحة 45 - 50 كغ، ونسبة التصافي 30 - 35 %.

تنتج النعجة الواحدة مابين 10 - 150 كغ من الحليب بموسم إدرار طوله 120 يوماً. ويقدر الإنتاج اليومي مابين 1 - 1.8كغ.

وزن جزة الصوف الخام 2.5 كغ للذكور و1.5 كغ للإناث على التوالي، ووزن الجزة المغسولة النظيفة 1.2-1.8 كغ، طول الخصلة 8 سم، وقطر الليفة الصوفية 23 - 30 ميكرون.

أنثى غنم اولاد جلال

غنم البربر

المنشأ و الانتشار:

منشؤه المناطق الجبلية التلية (الأطلس التلي) ، إفريقيا الشمالية، ومناطق انتشاره الرئيسة المرتفعات الجبلية الشمالية في الجزائر، ويسمى محلياً بربر، ازولي، مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي وحجم الحيازة في النظام السرحي 5 - 50 رأساً، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور، و60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور، و95 % إناث، ونسبة أيام الرعي 70 %، والتغذية على المخلفات الزراعية 30 %، وفترة الرعي 270 يوماً، وفترة الرعي على المخلفات الزراعية 95 يوماً، وهو في تناقص، قابل للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة .

غنم البربر

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أبيض وأحياناً منقط بالأسود، ورأسه متوسط ويوجد قرون للذكور ونادراً عند الإناث، ومقطع الرأس محدب عند الذكور والإناث، والآذان متدلية، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 65 سم، و عند الإناث 60 سم، وطول الجسم عند الذكور 70 سم، وعند الإناث 64 سم.

الصفات الإنتاجية :

يبلغ عمر الذكور والإناث عند البلوغ 8 - 10 شهور، وموسم التناسل في الربيع، والوزن عند التلقيح 45 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 17 - 23 شهراً، ونسبة التوائم 8 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً.

يبلغ وزن الذكور عند الميلاد 2 كغ، والإناث 2 كغ، ووزن الفطام للذكور 18 - 19 كغ، والإناث 15 - 17 كغ، ومعدل النمو من الميلاد حتى الفطام للذكور 120 - 130غ، وللإناث 90 - 110 غ، ووزن الجسم التام النمو للذكور 45 كغ، وللإناث 41 كغ، ووزن التسويق 30 - 40 كغ، ومعدل النمو من الميلاد حتى التسويق 80 - 100غ، وعمر التسويق 240 - 305أيام، ووزن الذبيحة 35 - 45 كغ، ونسبة التصافي 45 - 50 %. والصوف خشن، ووزن الجزة الخام 1.5كغ للذكور، وطول الخصلة 8 - 9 سم، وقطر الليفة 33 ميكرون، ويصنف من أغنام الصوف الخشن، والذيل رفيع يصل حتى العرقوب.

غنم البربري
(عربي)

المنشأ و الانتشار:

نشأ في الشرق الأدنى، وينتشر في شمال إفريقيا من غرب الإسكندرية إلى الجماهيرية الليبية ، وتونس، وحتى شرق الجزائر، ويسمى محلياً برقي، درناوي، صحراوي، بدوي، عربي، واد صوف، المحلي الوطني. مساهمته النسبية 80 % في النظام السرحي، وبحجم حيازة مابين 300 - 1000 رأس، و 20 % في النظام شبه المكثف، وبحجم حيازة مابين 200 - 300 رأس. ويتركب القطيع النامي من 10 % ذكور، و 25 % إناث. أما القطيع المنتج فيتركب من 4 - 6 % ذكور، و95 % إناث، ويتغذى على المرعى بنسبة 50 %، وعلى المخلفات الزراعية بنسبة 20 %، وعلى المواد العلفية المركزة بنسبة 30 %. متوسط فترة التغذية على المرعى 180يوماً، وعلى مخلفات المحاصيل 60 يوماً، وهو قابل للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وتم خلطه بالعواس، وبلغت أعداده 3.987 مليون رأس في عام 2007.

كبش غنم البربري

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، لون الوجه أسود أو بني أو أبيض أو أبيض مبقع بالأسود، تتواجد القرون عند الذكور، و تتواجد نادراً عند الإناث، ومقطع الرأس مستقيم، والآذان متوسطة الحجم ومتدلية. يبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 65 - 75سم، وعند الإناث 65 سم.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 40 - 60 كغ، وللإناث مابين 35 - 50 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين (7 - 9) أشهر. موسم التناسل على مدار السنة، وتلقح الإناث بعمر مابين 35 - 40 كغ، ومعدل الولادات 90 %، والعمر عند الولادة الأولى مابين 15 - 18 شهراً، ونسبة التوائم 8 - 10 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

وتنتج النعجة مابين 31 - 45 كغ حليب بموسم إدرار طوله 150 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي مابين 300 - 500 غ، ويحتوى الحليب على نسبة من المواد الصلبة الكلية مابين 16.2 - 19.9 %. ونسبة الدهون 5.9 %، ونسبة البروتين 5.3 %، ونسبة اللاكتوز 5.6 %. يتراوح وزن الذكور عند الميلاد مابين 2 - 3 كغ، والإناث 3 كغ، تفطم الذكور بوزن 25 كغ، والإناث بوزن 22 كغ. تسوق الحيوانات بوزن مابين 40 - 48 كغ، وبعمر 120-360 يوماً، متوسط وزن الذبيحة 22 كغ، وبنسبة تصافي مابين 48 - 50 %، ونسبة تشافي 30 %.

قطيع البربري

غنم بربرين

المنشأ و الانتشار:

نشأ في الجزائر وتونس، وانتشر في الجنوب الشرقي (واد سوف) على الحدود الجزائرية التونسية، ومساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور، و60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور و95 % إناث، ونسبة أيام الرعي 100 %، وفترة الرعي 365 يوماً، ويمتاز الحيوان بقابليته للتحسين الوراثي، وبتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، وهو في تناقص مستمر.

ذكر غنم بربرين

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أسود أو أبيض أو أحمر، ورأسه صغير، وللذكور قرون، ومقطع الرأس مستقيم، والآذان متدلية، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 55 سم، و عند الإناث 50 سم، والصوف متوسط النعومة والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

يتراوح متوسط وزن الذكور التامة النمو مابين 55 - 60 كغ، والإناث 45 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ مابين 8 - 10 شهور، العمر عند الولادة الأولى 13 - 24 شهراً، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

يتراوح وزن المواليد الذكور والإناث مابين 2.5 - 3 كغ، والذكور والإناث المفطومة مابين 16 - 18 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور وللإناث 70 - 90 غ، تسوق الحيوانات بوزن مابين 25 - 28 كغ، وبعمر 240 - 305 أيام.

أنثى غنم البربرين

غنم الرامبي

المنشأ و الانتشار:

منشؤه وسط الجزائر، وانتشر من وادي الطويل في وسط الجزائر من شرق البلاد إلى الغرب، وفي مناطق تيارت، صفير، افلو، جبل عمور، جبل ناضور في الجزائر، مساهمته النسبية 80 % في النظام السرحي، و20 % شبه المكثف، وحجم الحيازة في النظام السرحي مابين 10 - 3000 رأس، و 250 - 1000 رأس في النظام شبه المكثف، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور، ومن 60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور، و95 % إناث، ونسبة أيام الرعي 95 %، والتغذية على المخلفات الزراعية 4.5 %، والتغذية على المركزات 0.5 %، وفترة التغذية 305 أيام، وفترة الرعي على المخلفات الزراعية 60 يوماً، وهو قابل للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وهو في تزايد.

ذكر غنم الرامبي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أسمر باهت أو أشهب، أو أشقر، ورأسه متوسط، و للذكور قرون كبيرة وقصيرة للإناث، ومقطع الرأس محدب عند الذكور والآذان متدلية، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 79 سم، و عند الإناث 72 سم، وطول الجسم عند الذكور 77 سم، وعند الإناث 73 سم، والصوف متوسط النعومة والذيل رفيع ومتوسط الطول.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 80 كغ، وللإناث 60 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 8 - 10 أشهر. موسم التناسل في الربيع، والوزن عند التلقيح 45 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 24 شهراً، ونسبة التوائم 10 - 15 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

يبلغ وزن الذكور عند الميلاد 4 كغ، والإناث 3.8 كغ، ووزن الذكور المفطومة 28 كغ، والإناث المفطومة 25 كغ. ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 220 غ، وللإناث 160 غ، ووزن الذبيحة مابين 45 - 50 كغ، ونسبة التصافي 30 - 35 % .

يبلغ إنتاج النعجة من الحليب 40 - 60 كغ في موسم إدرار طوله 250 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي مابين 0.5 - 1 كغ، يتراوح وزن جزة الصوف الخام 2 - 3.5 كغ، ووزن الجزة المغسولة النظيفة 1.2 - 1.8 كغ، طول الخصلة 8 سم، وقطر الليفة 23 - 25 ميكرون.

أنثى غنم الرامبي

غنم الحمراء

المنشأ و الانتشار:

منشؤه مناطق الهضاب بين الجزائر والمغرب، وانتشر منها إلى أقاليم كثيرة، وأهم مناطق انتشاره الرئيسة (البيض، النعامة، سعيدة، تلمسان، سيدي بلعباس) في الجزائر، وأقاليم (وجدة، وفكيك، جرادة، بولمان وميسور) في المغرب العربي، ويسمى محلياً بني أغيل (بني جيل) Beni Guil، الدغمة، مساهمته النسبية 95 % في النظام السرحي، و5 % شبه المكثف، ويتراوح حجم الحيازة في النظام السرحي مابين 10 - 1500 رأس، و50 - 200 رأس في النظام شبه المكثف، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور و60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور و95 % إناث، ونسبة أيام الرعي 95 % والتغذية على المخلفات الزراعية بنسبة 4.5 % والتغذية على المركزات بنسبة 0.5 %، وفترة الرعي 305 أيام، وفترة التغذية على المخلفات الزراعية 60 يوماً، ويمتاز هذا الحيوان بقابليته للتحسين الوراثي ويتأقلم خارج موطنه الأصلي وعنده ظاهرة الأمومة ويقاوم الأمراض، وهو في تزايد.

كبش غنم الحمراء

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض أو أسمر، ولون الوجه أحمر إلى بني داكن، يميل إلى السواد، ورأسه كبير وتوجد قرون للذكور ومقطع الرأس محدب عند الذكور، والآذان متدلية، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 71 - 88 سم، و عند الإناث 60 - 80 سم، وطول الجسم عند الذكور 90 - 105 سم، وعند الإناث 80 - 100 سم، والصوف متوسط النعومة.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 50 كغ، وللإناث 44 كغ، يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 8 - 10 شهور، موسم التناسل في الربيع، تلقح الإناث لأول مرة بوزن 45 - 50 كغ، نسبة الولادات 90 %، والعمر عند الولادة الأولى مابين 13 - 20 شهراً، ونسبة التوائم مابين 10 - 15 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً.

متوسط وزن المواليد الذكور والإناث 3 كغ، ومتوسط وزن الذكور والإناث المفطومة 22 كغ، يتراوح معدل النمو اليومي من الميلاد وحتى الفطام للذكور 150 - 180 غ، وللإناث 130 - 150 غ. تسوق الحيوانات بوزن 45 - 50 كغ، وبعمر 240 - 305 أيام، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى التسويق 100 - 110 غ. وزن الذبيحة 45 - 50 كغ، ونسبة تصافي الذبيحة مابين 30 - 35 % .

متوسط إنتاج النعجة من الحليب 50 - 60 كغ في موسم إدرار طوله 120 - 150 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي مابين 0.5 - 0.7 كغ، يتراوح وزن الجزة الخام مابين 1.2 - 2 كغ، ووزن الجزة المغسولة 1.2 - 1.8كغ، وطول الخصلة 5 - 7 سم، وقطر الليفة 26 ميكرون.

أنثى غنم الحمراء

غنم تادميت

المنشأ و الانتشار:

منشؤه مناطق السهوب في الجزائر، ومناطق انتشاره الرئيسة الجلفة، والأغواط، وهو هجين بين السلالة الفرنسية (ميريتوس) وسلالة أولاد جلال، مساهمته النسبية 95 % في النظام السرحي، و5 % في النظام شبه المكثف، ويتراوح حجم الحيازة في النظام السرحي مابين 10 - 3000 رأس، و200 - 300 رأس في النظام شبه المكثف، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور، و 60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور، و 95 % إناث، ويمتاز الحيوان بقابليته للتحسين الوراثي، وبتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة ويقاوم الأمراض، وهو في تناقص مستمر.

ذكر غنم تادميت

أنثى غنم تادميت

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، ورأسه صغير، وتوجد قرون للذكور ومقطع الرأس محدب عند الذكور والإناث، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 71 سم، و عند الإناث 66 سم، وطول الجسم عند الذكور 74 سم، وعند الإناث 67 سم، ويصنف من أغنام الصوف الناعم والذيل الرفيع.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور التامة النمو 73 كغ، والإناث 47 كغ، يتراوح عمر البلوغ الجنسي للذكور والإناث مابين 8 - 10 شهور، وموسم التناسل في الربيع، تلقح الإناث لأول مرة بوزن مابين 45 - 50 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 34 شهراً، والفترة بين ولادتين 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور والإناث 3 كغ، ومتوسط وزن الذكور والإناث المفطومة 25كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 150 - 180 غ، وللإناث 130 - 150 غ. وزن الذبيحة مابين 45 - 50 كغ، ونسبة تصافي الذبيحة 30 - 35 %، ويتراوح وزن الجزة الخام للذكور مابين 3 - 3.8 كغ، وللإناث مابين 2 - 2.5 كغ.

غنم سوداء تيبار

المنشأ و الانتشار:

منشؤه منطقة تيبار الغربي في تونس، وانتشر منها إلى المناطق الشمالية الرطبة منها. ويسمى محلياً تيبار، أو مارنوس. يعيش 80 % منه تحت نظام الرعاية السرحي وبحجم حيازة أقل من 100 رأس، و 20 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف وبحجم حيازة مابين 200 - 300 رأس. يتركب القطيع المنتج من 3 - 7 % ذكور، و94 % إناث. يتغذى بنسبة 70 % على المراعي الطبيعية، و10 % على مخلفات المحاصيل، و20 % على الأعلاف المركزة. بلغ أعداد النعاج المنتجة 71.3 ألف رأس عام 2009.

غنم سوداء تيبار

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود مائل إلى البني الداكن، ولون الوجه أسود أو بني، الرأس كبير ومقطعه محدب، الذكور والإناث عديمة القرون، الآذان قصيرة ومنتصبة، ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 66 - 70 سم، والإناث مابين 60 - 65 سم، الذيل رفيع وطويل. يمتاز الحيوان بتأقلمه خارج موطنه الأصلي ويستجيب للتحسين الوراثي. ويمتاز بمقاومته للتسمم بنبتة الحمراء المتواجدة في المراعي التونسية.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 70 - 75 كغ، وللإناث 50 - 60 كغ، متوسط العمر عند البلوغ الجنسي للذكور 9 أشهر، وللإناث 10 أشهر. موسم التناسل خلال الفترة مابين شهر شباط/ فبراير وحتى أيار/ مايو. العمر عند الولادة الأولى 15 شهراً، نسبة التوائم 25 %، الفترة مابين ولادتين 8 - 12 شهور. يتراوح وزن المواليد الذكور مابين 2.8 - 4 كغ، والمواليد الإناث مابين 2.5 - 3.5 كغ. تفطم الذكور بوزن مابين 26 - 32 كغ، والإناث بوزن 25 - 30 كغ. معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام 285 غ للذكور، وللإناث 270 غ.

تسوق الحيوانات بوزن مابين 25 - 35 كغ وبعمر مابين 120 - 180 يوماً. معدل النمو اليومي حتى التسويق مابين 270 - 290 يوماً، تتراوح نسبة التصافي للذبائح مابين 48 - 50 %. تنتج الحيوانات الصوف الخشن، وزن الجزة الخام مابين 1.5 - 3 كغ، والجزة المغسولة النظيفة 1 - 2 كغ.

غنم الصقلي السردي

المنشأ و الانتشار:

منشؤه جنوب إيطاليا، أدخل إلى المناطق الشمالية الرطبة والشبه الرطبة في تونس، وتركز انتشاره في مدينة باجه وبنزرت ماطر، ويسمى محلياً طليان. يعيش تحت نظام الرعاية المكثف بنسبة 100 % وبحجم حيازة أقل من 100رأس، يتركب القطيع المنتج من 3 - 7 % ذكور، و94 % إناث. يتغذى بنسبة 60 % على المراعي الطبيعية، و 10 % على مخلفات المحاصيل الحقلية، و 30 % على الأعلاف المركزة. يتأقلم خارج موطنه الأصلي، ويستجيب للتحسين الوراثي.

غنم الصقلي السردي

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، الرأس متوسط الجسم ومقطعه محدب، تتواجد القرون عند الذكور، الآذان قصيرة ومنتصبة، ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 55 - 60 سم، والإناث مابين 55 - 60 سم. الذيل رفيع وطويل، يصنف من أغنام الصوف الخشن.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 55 - 60 كغ، والإناث مابين 45 - 50 كغ، متوسط العمر عند البلوغ الجنسي للذكور 8 أشهر، والإناث مابين 6 - 10 أشهر، موسم التناسل مابين شباط/ فبراير ويمتد حتى أيار/ مايو. العمر عند الولادة الأولى 11 - 15 شهراً، نسبة التوائم 136 % والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً. متوسط وزن المواليد الذكور مابين 2.6 - 3.2 كغ، والمواليد الإناث 2.3 - 3 كغ. تفطم المواليد الذكور بوزن مابين 13 - 15 كغ، والمواليد الإناث مابين 11 - 13 كغ.

معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 285 غ، وللإناث 256 غ. تسوق الحيوانات بوزن مابين 11 - 20 كغ وبعمر مابين 60 - 90 يوماً، معدل النمو حتى التسويق مابين 270 - 290 يوماً. متوسط نسبة تصافي الذبائح 43 %.

تنتج الحيوانات الحليب، ومتوسط إنتاج النعجة من الحليب مابين 100 - 140 كغ بموسم إدرار طوله 120 - 200 يوم، وبنسبة دهن 6.1 % ونسبة بروتين 5.7 %، ونسبة لاكتوز مابين 3.4 - 4.3 %. يتراوح وزن جزة الصوف الخام مابين 1.7 - 2.6 كغ، والصوف المغسول النظيف مابين 1 - 2 كغ.

غنم الدمان

المنشأ و الانتشار:

منشؤه منطقة المغرب العربي، وانتشر في واحات غرب الجزائر وجنوب المغرب، ومناطق الانتشار الرئيسة الواحات الصحراوية في الجزائر والمغرب، مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، بحجم حيازة مابين 10 - 100 رأساً، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور، و60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 5 % ذكور، و95 % إناث، ونسبة أيام الرعي 100 %، وفترة الرعي 365 يوماً، وهو في تزايد. ويمتاز بقابليته للتحسين الوراثي وبتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة.

غنم الدمان

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض أو ملون أبيض أو أسود أو أسمر داكن، ولون الوجه أبيض أو ملون أو أسود، ورأسه متوسط، وتوجد قرون للذكور ونادراً عند الإناث، ومقطع الرأس مستقيم عند الذكور و الإناث، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 70 سم، و عند الإناث 60 سم، وطول الجسم عند الذكور 74 سم، وعند الإناث 65 سم. ويصنف من أغنام الصوف الخشن.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 45 كغ، والإناث البالغة 37 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ مابين 5 - 7 شهور، موسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن 40 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 10 - 12 شهراً، ونسبة التوائم 75 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 2.5 كغ، والمواليد الإناث 2 كغ، ومتوسط وزن الذكور المفطومة 15كغ، والإناث المفطومة 14 كغ. وتتراوح أوزان الذبائح مابين 18 - 20 كغ، كما تتراوح نسبة التصافي للذبائح مابين 45 - 50 %. وزن الجزة الخام 0.5 - 1 كغ، والمغسولة النظيفة 0.3 - 0.6 كغ، وطول الخصلة 6.7 سم، وقطر الليفة 26 - 34 ميكرون.

غنم السردي

المنشأ و الانتشار:

منشؤه مناطق الهضاب الوسطى الداخلية في المغرب، وانتشر في مناطق الهضاب الوسطى والغربية في المغرب، وأهم مناطق انتشاره الرئيسة أقاليم (سطات، وخريبكة، قلعة السراغنة، سهل تادلة) في المغرب العربي، ويسمى محلياً بني مسكين، مساهمته النسبية 100 % في النظام السرحي، وبحجم حيازة مابين 80 - 150 رأساً.

يتركب القطيع النامي 6 % ذكور، و10 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 4 % ذكور، و 95 % إناث، ونسبة التغذية على الرعي 70 %، والتغذية على المخلفات الزراعية 15 %، والتغذية على المركزات 15 %، وفترة الرعي 165يوماً، وفترة الرعي على المخلفات الزراعية 80 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 120 يوماً، ويمتاز بقابليته للتحسين الوراثي، ولا يتأقلم في المناطق الرطبة، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض وهو في تزايد مستمر.

ذكر غنم السردي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض، ولون الوجه أبيض مع بقع سوداء عند العيون والفم، ورأسه كبير وتوجد قرون للذكور ومقطع الرأس محدب عند الذكور، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 85 - 90 سم، وعند الإناث 60 - 80 سم، وطول الجسم عند الذكور 100 - 120 سم، وعند الإناث 95 - 110 سم، والصوف متوسط النعومة والذيل رفيع وطويل.

الصفات الإنتاجية:

حيوانات كبيرة الحجم، يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 70 - 100 كغ، وللإناث مابين 45 - 60 كغ، يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 8 - 10 شهور، وموسم التناسل يمتد من شهر آذار/ مارس ويستمر حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر ، تلقح الإناث لأول مرة بوزن 30 - 35 كغ، ونسبة الولادات 95 %، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 20 شهراً، ونسبة التوائم 5 - 10 %، والفترة بين ولادتين 12شهراً.

يبلغ متوسط وزن المواليد الذكور 3.6 كغ والمواليد الإناث 3.4 كغ، ويتراوح وزن الذكور المفطومة مابين 28 - 32 كغ، والإناث المفطومة 25 - 28 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام 146غ للذكور، و100 غ للإناث. تسوق الحيوانات بوزن 60 - 80 كغ وبعمر 420 - 540 يوماً.

معدل النمو اليومي من الميلاد وحتى التسويق 140 - 150 غ، ويتراوح أوزان الذبائح مابين 30 - 40 كغ، ونسبة التصافي 48 - 50 %، وزن الجزة الخام 1.8 - 2.2 كغ، ووزن الجزة المغسولة النظيفة 0.7 كغ، وطول الخصلة 5 - 7 سم، وقطر الليفة 26 ميكرون.

أنثى غنم السردي

عروق الأغنام
في
جمهورية موريتانيا الإسلامية

غنم الطوارق (سيداو)

المنشأ و الانتشار:

منشؤه وموطنه الأصلي في السودان ومنطقة جنوب موريتانيا والصحراء الكبرى، وانتشر في غرب ووسط وشرق موريتانيا، والصحراء الكبرى في جنوب الجزائر، يسمى محلياً غنم قصيرة، قولبي، سيداو، سيداون، قوارارا، ترقي، مساهمته النسبية 70 % في النظام السرحي و30 % في النظم الأخرى، وحجم الحيازة في النظام السرحي 100 رأس و50 رأساً في النظم الأخرى، ويتركب القطيع النامي 10 % ذكور و23 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 19 % ذكور و48 %إناث، ونسبة أيام الرعي 70 %، والتغذية على مخلفات المحاصيل 20 % والتغذية على المركزات 10 %، وفترة الرعي 215 أيام وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 80 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 70 يوماً، وبلغت أعداده 4.9 مليون رأس عام 2004، وهو قابل للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، وهو في تزايد.

كبش غنم الطوارق (سيداو)

نعجة غنم الطوارق (سيداو)

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود وأبيض أو أصفر، ورأسه متوسط الحجم، وتوجد قرون للذكور، ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 80 سم، و عند الإناث 70 سم، الذيل رفيع وطويل.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 8 - 10 أشهر، وموسم التناسل في الخريف والشتاء، تلقح الإناث بوزن 25 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 14 شهراً، ونسبة التوائم 0 %، والفترة بين ولادتين 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 3 كغ، والمواليد الإناث 2.5 كغ، وتفطم الذكور بوزن 17 كغ، والإناث بوزن 15 كغ، معدل النمو اليومي حتى الفطام مابين 90 - 110غ للذكور، ومابين 70 - 80 غ للإناث، متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 34 كغ، وللإناث البالغة 26 كغ.

تسوق الحيوانات بوزن 25 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى التسويق 60 - 90 غ، وعمر التسويق 190 يوماً، يبلغ متوسط إنتاج النعجة من الحليب 70 كغ في موسم إدرار طوله 120 يوماً، ويقدر إنتاج الحليب اليومي مابين 520 - 740 غ.

غنم البيظان طويل

المنشأ و الانتشار:

منشؤه منطقة شرق موريتانيا، وانتشر في الغرب والجنوب، ويسمى محلياً غنم الآدم، مساهمته النسبية 70 % في النظام السرحي، و30 % في نظم أخرى، وحجم الحيازة في النظام السرحي 100 رأس، و50 رأساً في النظم الأخرى، ويتركب القطيع النامي من 11 % ذكور و17 % إناث، أما الحيوانات المنتجة فهي 16 % ذكور و84 % إناث، ونسبة أيام الرعي 70 %، والتغذية على المخلفات 20 %، والتغذية على المركزات 10 %، وفترة الرعي 210 أيام وفترة التغذية على المحاصيل 80 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 70 يوماً، وبلغت أعداده 6.8 مليون رأس عام 2004، وهو قابل للتحسين الوراثي، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعند ظاهرة الأمومة، وهو في تزايد.

غنم البيظان

الصفات الشكلية:

رأسه كبير، وتوجد قرون للذكور، ومقطع الرأس مستقيم، والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 90 سم، وعند الإناث 80 سم، الذيل رفيع وطويل وأردافه دهنية.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 45 كغ، وللإناث 33 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 شهور، موسم التناسل في الخريف والشتاء، تلقح الإناث لأول مرة بوزن 30 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 13 شهراً، ونسبة التوائم 20 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً، متوسط وزن المواليد الذكور 3.2 كغ، والمواليد الإناث 3 كغ، تفطم الذكور بوزن 20 كغ، والإناث بوزن 17 كغ، تسوق الحيوانات بوزن 25 كغ وبعمر 190 يوماً، يبلغ متوسط إنتاج النعجة من الحليب 70 كغ في موسم إدرار طوله 120يوماً، ويقدر إنتاجها من الحليب مابين 0.5 - 0.52 كغ يومياً.

عروق الأغنام
في
الجمهورية اليمنيـــة

الغنم اليمني الأبيض (التهامية)

المنشأ والانتشار:

منشؤه اليمن، ومناطق انتشاره الرئيسة تهامة، حجة، تعز، لحج، أبين، ويسمى محلياً بلدي، محلي، رادماني، مأربي، تهامي، مساهمته النسبية 94 % في النظام السرحي، و3 % في شبه المكثف، و3 % في النظم الأخرى، ويتراوح حجم الحيازة في النظام السرحي مابين 20 - 30 رأساً، و100 - 200 رأسٍ في النظام شبه المكثف، و5 - 7 رؤوس في النظم الأخرى.

الغنم اليمني الأبيض (التهامي)

يتركب القطيع النامي من 50 % ذكور، و50 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 15 % ذكور، و85 % إناث، ونسبة التغذية على الرعي 85 %، والتغذية على المخلفات 10 %، والتغذية على المركزات 5 %، وفترة الرعي 306 أيام، وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 36 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 18 يوماً، وبلغت أعداده 6 مليون رأسٍ، في عام 2008، ويمتاز هذا الحيوان بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وتم خلطه مع عروق أخرى، وهو في تزايد مستمر.

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، ورأسه صغير وعديم القرون ومقطع الرأس مستقيم والآذان قصيرة وأثرية، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور مابين 57 - 67 سم، وعند الإناث مابين 54 - 67 سم، يصنف من أغنام الشعر والذيل الغليظ (الإلية).

الغنم اليمني الأبيض (التهامي)

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 37.5 كغ وللإناث 30.5 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 8 أشهر، وموسم التناسل على مدار العام، ويتراوح وزن النعاج عند التلقيح مابين 12 - 15 كغ، ومعدل الولادات 79 %، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 24 شهراً، ونسبة التوائم 25 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

ويتراوح وزن المواليد الذكور والإناث مابين 2 - 2.4 كغ، والذكور المفطومة 8 - 9 كغ، والإناث المفطومة 7 - 8 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 75 غ، وللإناث 67 غ. ويتراوح وزن الحيوانات عند التسويق مابين 10 - 16كغ وبعمر 90 - 180يوماً، ومعدل النمو من الميلاد حتى التسويق 55 غ، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 19 - 38 كغ، ونسبة تصافي الذبائح بالمتوسط 55 %. وكمية الحليب المنتجة قليلة، ويبلغ إنتاج النعجة بالمتوسط 18 كغ في موسم إدرار طوله 60 يوماً، ويقدر إنتاج الحليب اليومي مابين 150 - 200 غ، متوسط وزن الجزة (للشعر) للذكور والإناث 361 غ، طول الخصلة 10 سم، وقطر الليفة 27 - 54 ميكرون.

الغنم التعزي الأحمر (الجندي)

المنشأ و الانتشار:

منشؤه في تعز باليمن، وانتشر في حجة، ثم في أب، ولحج، ويسمى محلياً تعزي أحمر، مساهمته النسبية 95 % في النظام السرحي و 5 % في النظم الأخرى، ويتراوح حجم الحيازة في النظام السرحي مابين 20 - 30 رأساً و 10 - 15 رأساً في النظم الأخرى، ويتركب القطيع النامي من 49 % ذكور و51 % إناث، أما الحيوانات المنتجة فتتكون من 15 % ذكور و85 % إناث، ونسبة التغذية على المراعي 75 % و على المخلفات 20 % وعلى المركزات 5 %، وفترة الرعي 306 أيام، وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 46 يوماً، وعلى المركزات 8 أيام، وبلغت أعداده 600 ألف رأس في عام 2008، ويمتاز بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة ويقاوم الأمراض، وهو في تزايد مستمر.

الغنم التعزي الأحمر (الجندي)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أحمر، ورأسه صغير، وعديم القرون، ومقطع الرأس محدب والآذان قصيرة، ويصنف من أغنام الشعر، والذيل غليظ (الآلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 35.5 كغ، وللإناث 25.5 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 12شهراً، وموسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن مابين 12 - 15 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 13 - 24 شهراً، ونسبة التوائم 10 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12شهراً.

متوسط وزن المواليد الذكور 2 كغ، والمواليد الإناث 1.7كغ ويتراوح وزن الذكور المفطومة مابين 8 - 9 كغ، والإناث المفطومة مابين 6 - 7 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 65 غ وللإناث 55 غ.

تسوق الحيوانات بوزن مابين 16 - 25 كغ وبعمر 90 - 300 يوم، ومعدل النمو من الميلاد حتى التسويق 40 غ، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 19 - 25 كغ، ومتوسط نسبة التصافي للذبائح 56 %. وتنتج النعاج كميات قليلة من الحليب، حيث يبلغ إنتاجها 22 كغ في موسم إدرار طوله 60 يوماً، ويتراوح إنتاج الحليب اليومي مابين 150 - 200 غ.

الغنم التعزي الأحمر (الجندي)

الغنم الذماري

المنشأ و الانتشار:

منشؤه في محافظة ذمار باليمن، وانتشر في تعز وحجة، وتركز انتشاره في ذمار، والبيضاء، ويسمى محلياً ذماري، مساهمته النسبية 4.7 % في النظام السرحي، وحجم الحيازة في النظام السرحي مابين 5 - 10 رؤوس، ويتركب القطيع النامي من 45 % ذكور و55 % إناث، أما الحيوانات المنتجة فتتكون من 20 % ذكور و80 % إناث، ونسبة التغذية على المرعى 80 % والتغذية على المخلفات 15 % والتغذية على المركزات 5 %، وفترة الرعي 300 يوم وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 40 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 20 يوماً، وبلغت أعداده 414 ألف رأسٍ عام 2008، ويمتاز بتأقلمه خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وهو في تزايد مستمر.

كبش غنم ذماري

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، ورأسه متوسط، وعديم القرون ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية طويلة، والصوف ناعم والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 45 كغ وللإناث 35 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 12شهراً، وموسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن مابين 12 - 15 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 12 - 15شهراً، ونسبة التوائم 13 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

يتراوح وزن المواليد الذكور والإناث مابين 3 - 3.5 كغ، يتراوح متوسط وزن الذكور المفطومة مابين 10 - 14 كغ، والإناث المفطومة مابين 9 - 12 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور والإناث مابين 100 - 110 غ.
تسوق الحيوانات بوزن مابين 12 - 35 كغ وبعمر مابين 120 - 360 يوماً، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 23 - 43 كغ، وبنسبة تصافي 50 %. يقدر متوسط إنتاج النعجة من الحليب 71.5 كغ في موسم إدرار طوله 120 - 150 يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي من الحليب مابين 457 - 596 غ، ويتكون الحليب من 16.2 - 20.6 % مواد صلبة كلية وتتراوح نسبة الدهن مابين 4 - 8.1 %.

نعاج غنم ذمارية

الغنم الأحوري

المنشأ و الانتشار:

منشؤه في محافظة لحج باليمن، وانتشر في مناطق لحج، ويسمى محلياً الأحوري، مساهمته النسبية 1.4 % في النظام السرحي، وحجم الحيازة في هذا النظام 3 - 5 رؤوس، ويتركب القطيع النامي من 50 % ذكور و50 % إناث، أما القطيع المنتج فيتركب من 25 % ذكور و75 % إناث، ونسبة التغذية على الرعي 85 %، وعلى المخلفات 14 %، وعلى المركزات 1 %، وفترة الرعي 300 يوم، وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 40 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 20 يوماً، وبلغت أعداده 90 ألف رأس، وهي حيوانات تستجيب للتحسين الوراثي وتتأقلم خارج موطنها الأصلي، ولديها ظاهرة الأمومة وتقاوم الأمراض، وهي في تزايد مستمر.

الغنم الأحوري

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، ورأسه متوسط، ولا توجد قرون، والآذان منتصبة، والصوف نصف ناعم، والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو مابين 36 - 40 كغ، وللإناث 30 - 35 كغ، ويبلغ عمر الذكور والإناث عند البلوغ الجنسي مابين 12 - 14 شهراً، موسم التناسل على مدار العام، الوزن عند التلقيح 12 - 16 كغ، ومعدل الولادات 77 %، والعمر عند الولادة الأولى 12 - 18 شهراً، ونسبة التوائم 12 %، والفترة مابين ولادتين 8 - 12 شهراً .

متوسط وزن المواليد الذكور عند الولادة 2 كغ، والإناث 1.5كغ، تفطم الذكور بوزن 9 - 11كغ، والإناث بوزن 8 - 10كغ، ومعدل النمو اليومي عند الميلاد حتى الفطام للذكور 103غ، وللإناث 100غ، يتراوح وزن التسويق مابين 15 - 20 كغ وبعمر 90 - 300 يوم، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 13 - 40 كغ، ومتوسط نسبة التصافي 52 %، ونادراً ماتحلب النعاج في مواسم الجفاف حيث تترك لرضاعة المواليد.

قدر إنتاج النعجة بعد فطام المولود بـ 250 غ في المواسم الجيدة، وتستمر الحلابة لمدة أربعة أشهر.

الغنم المأربي (النجدي)

المنشأ و الانتشار:

منشؤه في محافظة مأرب باليمن، وانتشر في عمران وصنعاء، ومناطق انتشاره الرئيسة مأرب، الجوف، وصنعاء، ويسمى محلياً المأربي، مساهمته النسبية 1.4 % من إجمالي الأغنام ويربى في النظام السرحي، وحجم الحيازة في هذا النظام 3 - 5 رؤوس، ويتركب القطيع النامي من 50 % ذكور و50 % إناث، أما القطيع المنتج فيتركب من 25 % ذكور و75 % إناث، ونسبة التغذية على المراعي 80 %، وعلى المخلفات 15 %، وعلى المركزات 5 %، وتبلغ فترة الرعي 300 يوم، وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 50 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 10 أيام، وبلغت أعداده 120ألف رأس عام 2008. ويستجيب للتحسين ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة ومقاوم للأمراض والمحسن منه أقل مقاومة، وهو في تزايد مستمر.

الغنم المأربي (النجدي)

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض وأسود، ولون الوجه أبيض وأسود، ورأسه كبير وعديم القرون ومقطع الرأس محدب والآذان طويلة ومتدلية، والصوف نصف ناعم والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور التامة النمو 55 - 60 كغ، وللإناث 50 - 55 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ مابين 12 - 18 أشهر، موسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن مابين 15 - 25 كغ، ومعدل الولادات 77 % والعمر عند الولادة الأولى 18 - 24 شهراً، ونسبة التوائم 5 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12شهراً .

متوسط وزن المواليد الذكور 3 كغ، والمواليد الإناث 2.5 كغ، يتراوح وزن الذكور المفطومة مابين 8 - 13كغ، والإناث المفطومة 7 - 12 كغ، معدل النمو من الميلاد وحتى الفطام للذكور 98 غ، والإناث 95 غ

تسوق الحيوانات بوزن مابين 25 - 55 كغ وبعمر مابين 90 - 400 يوم، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 13 - 40 كغ، متوسط ونسبة التصافي 52 %.

الغنم البوني (الأسود والأبيض)

المنشأ و الانتشار:

منشؤه في محافظة ذمار باليمن، وانتشر بشكل رئيس في تعز وأب، ويسمى محلياً العنسي الأسود، أو الأغنام اليمنية، مساهمته النسبية 1.4 % في النظام السرحي، وحجم الحيازة في النظام السرحي مابين 3 - 5 رؤوس، ويتركب القطيع النامي من 50 %ذكور و50 % إناث، أما الحيوانات المنتجة فتتكون من 25 % ذكور، و 75 % إناث، ونسبة التغذية على المراعي 85 %، والتغذية على المخلفات 14 % والتغذية على المركزات 1 %، وفترة الرعي 300 يوم وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 50 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 10 أيام، وبلغت أعداده 300 ألف رأس عام 2008، وهو يستجيب للتحسين الوراثي، وعنده ظاهرة الأمومة ويقاوم الأمراض، وهو في تزايد.

غنم بوني أسود

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض أو أسود أو رمادي داكن، ورأسه كبير ولا توجد قرون، ومقطع الرأس محدب والآذان قصيرة، والصوف خشن، والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور والإناث التامة النمو مابين 30 - 40 كغ، وموسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن 19 كغ،

والعمر عند الولادة الأولى مابين 12 - 15 شهراً، ونسبة التوائم 5 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً. يبلغ وزن الذكور عند الميلاد 2 - 2.2 كغ والإناث 2 كغ. ويقدر إنتاج النعجة من الحليب 36 كغ، بموسم إدرار طوله 96 يوماً، وتنتج النعجة يومياً 250 - 400 غ، وينتج الحيوان بالإضافة لذلك صوف خشن.

غنم بوني أبيض

الغنم الجوفي
(الجهمي)

المنشأ و الانتشار:

منشؤه في محافظة ذمار وصنعاء باليمن، وانتشر في مناطق عمران وصنعاء، وتركز انتشاره في منطقتين رئيستين هما ذمار وصنعاء، ويسمى محلياً البلدي، مساهمته النسبية 1.4 % في النظام السرحي، وبحجم حيازة 3 - 5 رؤوس، ويتركب القطيع النامي من 50 % ذكور و50 % إناث، أما القطيع المنتج فيتركب من 25 % ذكور و75 % إناث، ونسبة التغذية على المراعي 85 %، وعلى المخلفات 14 %، وعلى المركزات 1 %، وفترة الرعي 300 يوم، وفترة التغذية على مخلفات المحاصيل 50 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 10 أيام، وبلغت أعداده 100 ألف رأس عام 2008، وهو يستجيب للتحسين الوراثي ويتأقلم خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض، وهو في تزايد.

ذكر غنم الجوفي (الجهمي)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، ورأسه متوسط والمقطع مستقيم وعديم القرون والآذان منتصبة، والصوف خشن والذيل غليظ (الإلية).

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 35 - 45 كغ والإناث 30 - 35 كغ، ويتراوح عمر الذكور البالغة جنسياً مابين 12 - 18 شهراً، وموسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن 15 - 25 كغ، ومعدل الولادات 77 % والعمر عند الولادة الأولى مابين 18 - 20 شهراً، ونسبة التوائم 2 - 5 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً، ومتوسط وزن المواليد الذكور 3 كغ، والمواليد الإناث 2.5 كغ، وزن الذكور المفطومة 12 - 13 كغ والإناث المفطومة 11 - 12 كغ. معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 102 غ وللإناث 99 غ، تسوق الحيوانات بوزن مابين 25 - 45 كغ وبعمر 90 - 400 يوم، وتتراوح أوزان الذبائح مابين 13 - 40 كغ، ونسبة التصافي 52 %.

يبلغ إنتاج النعجة من الحليب 33 كغ بموسم إدرار طوله 60 يوماً، ويقدر إنتاج الحليب اليومي مابين 160 - 250 غ، وتنتج الحيوانات الصوف الخشن.

غنم سقطرى

المنشأ والانتشار:

منشؤه اليمن في جزيرة سقطرى ومن خلط عروق متعددة، وانتشر في جزيرة سقطرى، ويسمى محلياً السقطري. مساهمته النسبية 95 % في النظام السرحي، و5 % في النظم الأخرى، وحجم الحيازة في النظام السرحي مابين 35 - 40 رأساً و 10 - 15 رأساً في النظم الأخرى، ويتركب القطيع النامي من 40 % ذكور و60 % إناث، أما الحيوانات المنتجة 25 % ذكور و75 % إناث، ويتغذى على المراعي بنسبة 90 %، والتغذية على المخلفات الزراعية 8 %، ونسبة التغذية على المركزات 2 %، وفترة الرعي 324 يوماً، وفترة التغذية على المخلفات 28 يوماً، وفترة التغذية على المركزات 14 يوماً، وبلغت أعداده 8000 رأس في عام 2008، ويتأقلم بشكل جيد خارج موطنه الأصلي، وعنده ظاهرة الأمومة، ويقاوم الأمراض وهو في تزايد.

ذكر غنم سقطرى

أنثى غنم سقطرى

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أسود، رأسه متوسط وتوجد قرون للذكور ومقطع الرأس مستقيم والآذان قصيرة، ويصنف من أغنام الصوف الخشن، والذيل الرفيع متوسط الطول.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر البلوغ الجنسي عند الذكور والإناث مابين 6 - 8 أشهر، وموسم التناسل موسمين في السنة الموسم الرئيس مابين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، والموسم الثاني مابين آذار/مارس ونيسان/أبريل، تلقح الإناث بوزن 19.5كغ، معدل الولادات 62 %، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى مابين 13 - 19 شهراً، ونسبة التوائم شبه معدومة، والفترة بين ولادتين 12 شهراً.

يبلغ وزن الذكور عند الولادة مابين 2 - 2.2 كغ والإناث 2 كغ، وتفطم الذكور بوزن 6 كغ، والإناث بوزن 5 كغ، تنتج النعاج الحليب بكميات قليلة، ومتوسط إنتاج النعجة من الحليب 50 كغ، ووزن جزة الصوف الخام 0.4 كغ وطول الخصلة 3 - 10 سم، وقطر الليفة 30 - 33 ميكرون.

عروق وسلالات الخيول والحمير
في الدول العربية

عروق وسلالات
الخيول والحمير
في
المملكـــة الأردنيـــة الهاشمية

الخيل العربي

المنشأ والانتشار:

نشأت سلالة الخيول العربية الأردنية في شبه الجزيرة العربية، ومنها انتشرت إلى عدة مناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، ويقدر حجم الحيازة مابين 5 - 30 رأساً، تتغذى الحيوانات على الرعي لمدة 100 يوم وعلى المركزات لمدة 265 يوماً.

الخيل العربي

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أدهم، أو أحمر، أو أشقر، أو أزرق، حجم الرأس والجسم متوسط، مقطع الجسم محدب، والآذان قصيرة ومنتصبة.

الخصائص التناسلية:

يتراوح عمر البلوغ الجنسي للإناث مابين 18 - 20 شهراً، وتلقح الإناث بعمر 4 - 5 سنوات، أما الذكور فتستخدم للتلقيح بعمر مابين 3.5 - 5 سنوات. موسم التناسل في بداية فصل الربيع. تأتي أول دورة شبق بعد الولادة مباشرة 9 - 11 يوماً، وتستمر دورة الشبق مابين 5 - 7 أيام. وتتراوح نسبة الحمل مابين 40 - 65 %، ومدة الحمل مابين 330 - 350 يوماً، ولاتتوافر معلومات عن الأوزان.

حمير الشريفي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في بلاد الشام الموطن الأصلي، وانتشرت في جميع مناطق المملكة الأردنية، يبلغ حجم الحيازة مابين 1 - 5 رؤوس، تعتمد في تغذيتها على الرعي بنسبة 100 % وهي في تزايد مستمر.

حمير الشريفي

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم بني، حجم الرأس كبير، مقطع الجسم مستقيم وحجمه متوسط، الآذان طويلة ومنتصبة. ارتفاع الجسم عند الحارك للذكور 150 سم، وللإناث 140 سم، وطول الجسم المستقيم للذكور 200 سم، وللإناث 190 سم.

الخصائص التناسلية:

يربى بهدف الاستفادة من قوة عمله. ولا توجد معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

عروق وسلالات الخيول
في
الجمهورية التونسـية

الخيل العربي
(البربري)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في المغرب العربي، وانتشرت في جميع مناطق تونس وبخاصة ولايات القيروان، الكاف، تطاوين، ومدنين وسيدي بوزيد. ويسمى محلياً بارب أو بربري.

تعيش الحيوانات تحت نظام الرعاية شبه المكثف بنسبة 20 % وتحت نظام الرعاية المكثف بنسبة 80 %. وتعتمد الحيوانات في نظام التغذية على الرعي ومخلفات المحاصيل والمركزات طوال العام. بلغ تعدادها 45 ألف رأس عام 1999، وهي في تناقص.

الخيل العربي (البربري)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، أو أحمر، القوائم مرتفعة نسبياً، الرأس متوسط الحجم، الآذان قصيرة ومنتصبة وحجم الجسم متوسط، الارتفاع عند الحارك للذكور والإناث 150 سم وطول الجسم المائل 195 سم، وطول الجسم المستقيم 190 سم.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي للذكور مابين 18 - 24 شهراً، وللإناث مابين 10 - 18 شهراً، يستخدم الحصان للتلقيح بعمر 3 سنوات، أما الإناث فتلقح بعمر سنتين، موسم التناسل 15 شباط/فبراير حتى 15 حزيران/يونيو. الوزن عند التلقيح مابين 320 - 350 كغ، معدل الولادات 26 %. العمر عند الولادة الأولى 35 شهراً، الفترة بين ولادتين 12 شهراً. يتراوح وزن المواليد الذكور والإناث مابين 55 - 75 كغ، بينما يتراوح وزن الذكور والإناث المفطومة مابين 150 - 170 كغ، ويتراوح وزن الجسم للذكور البالغة مابين 470 - 490 كغ والإناث البالغة مابين 440 - 460 كغ، وتستخدم هذه الحيوانات في الرياضة والركوب والعمل.

الخيل العربي (البربري)

الخيل العربي الأصيل

المنشأ والانتشار:

نشـأت هذه السلالة في الجزيرة العربية، وتنتشر في كامل مناطق الجمهورية التونسية، وتعيش هذه الحيوانات بنسبة 20 % تحت نظام الرعاية السرحي، وبنسبة 20 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف، وبنسبة 60 % تحت نظام الرعاية المكثف. وتعتمد الحيوانات في تغذيتها على الرعي ومخلفات المحاصيل والمركزات. بلغ تعداد هذه الحيوانات 300 رأس عام 1999، وهي في تزايد.

الخيل العربي الأصيل

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه إما أبيض أو أحمر أو بني فاتح أو أسود، حجم الجسم متوسط، الآذان قصيرة ومنتصبة، الارتفاع عند الحارك للذكور والإناث مابين 140 - 152 سم، وطول الجسم المائل مابين 160 - 180 سم.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي للذكور مابين 18 - 24 شهراً، وتستخدم في التلقيح بعمر4 سنوات، بينما العمر عند البلوغ الجنسي للإناث مابين 10 - 18 شهراً وتلقح بعمر 3 سنوات. موسم التناسل 15 شباط/فبراير حتى 15 حزيران/يونيو. تلقح الإناث بوزن 280 كغ، معدل الولادات 65 % العمر عند الولادة الأولى 35 شهراً، الفترة بين ولادتين 12شهراً. يتراوح وزن المواليد الإناث والذكور مابين 50 - 70 كغ، وتفطم الأمهار الذكور والإناث بوزن مابين 140 - 160 كغ، يتراوح وزن الجسم للذكور والإناث البالغة مابين 350 - 400 كغ، تستخدم في الرياضة والركوب.

الخيل العربي الأصيل

الخيل الانكليزي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في بريطانيا، وأدخلت وانتشرت في شمال ووسط تونس، وتسمى محلياً بالنقليزي، تعيش الحيوانات تحت نظام الرعاية السرحي بنسبة 20 %، وتحت نظام الرعاية شبه المكثف 20 %، وتحت نظام الرعاية المكثف 60 %. تعتمد الحيوانات في تغذيتها على الرعي ومخلفات المحاصيل والمركزات، بلغ تعدادها 700 رأس عام 1999.

الخيل الإنكليزي

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أحمر أو أسود أو رمادي، الرأس متوسط ومقطعه محدب، الآذان قصيرة ومنتصبة. حجم الجسم كبير، الارتفاع عند الغارب للإناث والذكور مابين 145 - 180 سم، طول الجسم للإناث والذكور مابين 145 - 180 سم.

الخصائص التناسلية:

عمر الذكور عند البلوغ الجنسي مابين 18 - 24 شهراً، وتستخدم في التلقيح بعمر 4 سنوات، بينما يتراوح عمر الإناث عند البلوغ الجنسي مابين 10 - 18 شهراً، وتلقح الإناث بعمر 3 سنوات وبوزن مابين 270 - 300 كغ، موسم التناسل يبدأ في 15 شباط/فبراير ويمتد حتى 15 حزيران/يونيو، معدل الولادات 47 %، العمر عند الولادة الأولى 45 شهراً، الفترة بين ولادتين 12 شهراً، يتراوح وزن المواليد الذكور مابين 65 - 75 كغ، والمواليد الإناث مابين 60 - 80 كغ، تزن الذكور والإناث المفطومة مابين 160 - 180 كغ. ويبلغ وزن الجسم للذكور والإناث البالغة مابين 400 - 500 كغ وتستخدم في الرياضة والركوب.

الخيل القزم مقعد

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في شمال إفريقيا، وانتشرت في الشمال الغربي وبخاصة في جبهة التلال العليا من تونس، وبخاصة في منطقتي خمير ومقعد. تعيش الخيول بنسبة 80 % تحت نظام الرعاية السرحي، وبنسبة 20 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف، تتغذى الخيول بنسبة 50 % على الرعي، ونسبة 50 % على مخلفات المحاصيل ، بلغ تعدادها 200 رأس عام 1999.

الخيل القزم مقعد

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أصفر أو بني أو أحمر أو رمادي. الرأس متوسط الحجم ومقطعه محدب، الآذان قصيرة ومنتصبة، حجم الجسم صغير، الارتفاع عند الحارك للذكور والإناث مابين 128 - 138 سم، طول الجسم المائل مابين 150 - 160 سم.

الخصائص التناسلية:

يتراوح عمر الذكور عند البلوغ الجنسي مابين 18 - 24 شهراً، وتستخدم في التلقيح بعمر 3 سنوات، بينما يتراوح عمر الإناث عند البلوغ الجنسي مابين 10 - 18 شهراً، وتلقح الإناث بوزن وسطي 180 كغ. معدل الولادات 45 %العمر عند الولادة الأولى 45 شهراً، الفترة بين ولادتين 12 شهراً، ويتراوح وزن المواليد الذكور والإناث مابين 30 - 40 كغ.
تفطم الإناث والذكور بوزن 75 - 85 كغ، ويتراوح وزن الذكور البالغة مابين 245 - 255 كغ، والإناث البالغة 195 - 205 كغ، تستخدم هذه السلالة في الرياضة والركوب.

عروق وسلالات الخيول
في
الجمهوريـــة الجزائريـــة
الديمقراطية الشـــعبية

الخيل العربي
(البارب)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزائر الموطن الأصلي، وانتشرت في كافة مناطق الجزائر، ودول أخرى مثل المغرب، تونس، ليبيا، ومالي وتوجد في الجزائر سلالات أخرى من الخيول منها الحصان العربي الأصيل والإنكليزي اللذان يستعملان في السباق.

الخيل العربي (البارب)

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم رمادي بني أو بني مسود، حجم الرأس كبير، مقطع الجسم محدب، الآذان قصيرة ومنتصبة، حجم الجسم متوسط، طول الجسم المستقيم مابين 147 - 157 سم. ولهذه السلالة 5 فقرات قطنية عوضاً عن 6 في باقي الخيول.

الخصائص التناسلية:

لا تتوفر معلومات عن الخصائص التناسلية.

عروق وسلالات
الخيول والحمير
في
المملكة العربية السعودية

الخيل العربي
(الكحيلة)

المنشأ والانتشار:

نشأت الخيول العربية في الجزيرة العربية، وهي الموطن الأصلي لهذه الخيول، وانتشرت من الجزيرة العربية إلى البلاد المجاورة مثل سورية، و بلاد ما بين النهرين، و مصر، و آسيا الصغرى، نتيجة للتجارة المستمرة بين شعوب هذه البلاد، والتي كانت الخيول إحدى أدواتها الرئيسية الفعالة. ويعتقد بأن الفينيقيين الذين اشتهروا برحلاتهم البحرية هم الأوائل في إيصال الخيول العربية إلى العالم الغربي. كما أن هناك بعض المصادر التي تشير إلى أن انتقال الخيول العربية إلى شعوب شمال إفريقيا تم قبل حوالي أربعة آلاف سنة بواسطة قبائل بني هلال، التي يعتبر موطنها الأصلي الجزيرة العربية. وساهمت الفتوحات الإسلامية في تدفق موجات كبيرة من الخيول العربية إلى العراق و سورية وإيران و آسيا الصغرى و شمال إفريقيا و كذلك إسبانيا و فرنسا. و قد تداخلت دماء الخيول العربية مع كثير من خيول السباق في العالم نتيجة لصفاتها المتميزة و قدراتها الكبيرة التي لا تجاريها فيها الخيول الأخرى.

الخيل العربي (الكحيلة)

الصفات الشكلية:

يعتبر رأس الحصان العربي من أهم أجزاء جسمه باعتباره الأساس في التعبير عن المظهر الجمالي، ويتصف الرأس

بالأنف المستقيم أو المقعر بشكل خفيف، المنخران متسعان ومستديران ويتصفان بالرقة والنعومة ،الفكان قويان (يشكل ملتقى الفك السفلي مع العنق قوساً مستديراً نسبياً) يمكّن الحنجرة من استيعاب أكبر كمية من الهواء أثناء الجري السريع.
الشفتان رقيقتان، الأذنان صغيرتان ودقيقتان ومرنتان، الجبهة عريضة، العينان مستديرتان وواسعتان وبراقتان، الرقبة طويلة ومقوسة، الغارب مستدير، الظهر قصير وعريض، القوائم مستقيمة والعظام والعضلات قوية، المفاصل مرنة.

الخيل العربي (الكحيلة)

الخصائص التناسلية:

تظهر دورة الشبق عند إناث الخيل بعمر نحو 18 شهراً إلا أن التلقيح الأول لا يتم عادة إلا بعمر 3 - 4 سنوات.
موسم التناسل مابين شهري نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وتتراوح فترة الشبق مابين 5 - 7 أيام، تقدر نسبة الحمل في الأفراس الملقحة نحو 60 % ونسبة الولادات 55 % وتتراوح مدة الحمل مابين 320 - 370 يوماً، متوسط عمر البلوغ الجنسي للذكور 1.5 سنة، ولكن الذكور تستخدم للتلقيح بعمر مابين 3.5 - 5 سنوات.

الحمير الحجازي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الحجاز في المملكة العربية السعودية (الموطن الأصلي)، وانتشرت في المنطقتين الغربية والجنوبية، حجم الحيازة مابين 5 - 10 رؤوس، تعتمد الحيوانات في تغذيتها على الرعي ومخلفات المحاصيل، وهي في تزايد مستمر.

الحمير الحجازي

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه رمادي غامق أو أسود، حجم الرأس والجسم متوسط ومقطع الجسم مستقيم، الآذان طويلة ومنتصبة، الارتفاع عند الحارك للذكور 136 سم، وللإناث 134 سم، طول الجسم المستقيم للذكور 190 سم، وللإناث 185 سم. وتمتاز الحيوانات الرمادية اللون بمنطقة بيضاء تحت البطن.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي للذكور 20 شهراً، والفترة بين الولادتين 14 شهراً، تربى حيوانات هذه السلالة للركوب والعمل.

الحمير الحساوي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية الموطن الأصلي، وانتشرت في مناطق الإحساء، وهي في تزايد مستمر.

الحمير الحساوي

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، حجم الرأس متوسط، مقطع الجسم مستقيم، الآذان طويلة ومنتصبة، حجم الجسم متوسط، ارتفاع الجسم عند الحارك للذكور 139 سم، وللإناث 136 سم، طول الجسم المستقيم للذكور 200 سم وللإناث 193 سم، وتمتاز حيوانات هذه السلالة بطول القوائم والذيل والآذان.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي للذكور 60 شهراً، الفترة بين ولادتين 14 شهراً، ويربى بهدف الركوب والعمل، ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

عروق وسلالات
الخيول والحمير
في
جمهورية السودان

الخيل العربي
(الدُنقلاوية)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في السودان (مدينة نقلا)، وهي من أقدم الخيول بالسودان، ويعتقد أنها وصلت عن طريق مصر مع غزو الهكسوس عام 1780 قبل الميلاد، وتنتشر هذه السلالة في شمال ووسط السودان وشمال دارفور.

الخيل العربي (الدُنقلاوية)

الصفات الشكلية:

الجسم كبير ومقطعه محدب، كذلك الرأس كبير ومنحن والأنف روماني، ألوان الجسم متعددة فمنها البني، أو الأحمر، أو الأشقر، أو الأشهب أو الأسـود. ولكن اللون البني هو الغالب، ويكون لون الذيل عند الخيول البنيـة أسود. الارتفاع عند الحارك للذكور 185 سم، وعند الإناث 175 سم، محيط الصدر عند الذكور 220 سم، وعند الإناث 205 سم.

الخصائص التناسلية:

يتراوح وزن الجسم عند الذكور البالغة مابين 380 - 450 كغ، وعند الإناث 350 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي مابين 28 - 72 شهراً، موسم التناسل في فصلي الخريف والشتاء، ومعدل الولادات مرة كل سنتين. ومتوسط وزن المواليد الذكور 28 كغ والمواليد الإناث 24 كغ. وتعتبر من الخيول التي تتأقلم بشكل جيد مع الظروف الجافة في السودان وتستخدم للركوب.

الخيل العربي
(الغرباوية)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في السودان وانتشرت في مناطق عديدة وبخاصة ولاية كردفان ودارفور.

الخيل العربي (الغرباوية)

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم غالبا بني فاتح وهناك اللون الأشقر، أو الرمادي، أو الأحمر، ارتفاع جسم الذكور عند الحارك 140 سم.

الخصائص التناسلية:

تتم رعاية هذه الخيول بهدف الركوب، ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

الحمير الريفاوي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في السودان، وانتشرت في شمال وشرق وغرب السودان.

الحمير الريفاوي

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أبيض، أو أسود أو رمادي، ارتفاع جسم الذكر عند الغارب مابين 100 - 120 سم وعند الإناث مابين 69 - 81 سم.

الخصائص التناسلية:

يستخدم بشكل أساسي للركوب والعمل، ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

الحمير المكاوي
(الدراوي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في السودان، وانتشرت في ولاية دارفور وكردفان وجنوب الإقليم الأوسط والشرق وبعض مناطق الجنوب.

الحمير المكاوي (الدراوي)

الصفات الشكلية:

صغير الجسم، قصير الأرجل نسبياً، عنقه قصير وغليظ، الآذان متوسطة الطول لاتتحرك إلا نادراً، بطيء الحركة، عموده الفقري طويل، جسمه مكور مكتنز باللحم عندما يتوافر له الغذاء المناسب، لون الجسم والوجه أبيض ورمادي، أو بني وأسود، الارتفاع عند الغارب بين 90 - 100 سم.

الخصائص التناسلية:

يستخدم بشكل أساسي لنقل الأحمال، ويرافق رعاة الأغنام لمقدرته على تحمل العطش في المناطق الصحراوية، أعداده تتناقص بشكل كبير جداً بسبب الخلط مع سلالة الريفاوي ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

عروق وسلالات الخيول
في
الجمهورية العربيـــة الســـورية

الخيل العربي الأصيل

يوجد في الجمهورية العربية السورية مايسمى الرسن، أو النسب، وهو عائد إلى صفات جسمية خاصة بالخيل العربي، أو قد يعود أحياناً إلى القبيلة التي انتشرت منها الخيل، فهناك عدة أرسان نذكر منها (عبيه، كحيلة، صقلاوية، معنقية، شويحة، حمدانية، هدباء، حمدانية بن غداب، كحيلة ممروحية وجريبة.. الخ).

المنشأ والانتشار:

تعتبر الجزيرة العربية المنشأ والموطن الأصلي للخيول العربية، ومنها انتشرت إلى عدة مناطق في سورية ومنها انتشرت الخيول العربية الأصيلة إلى معظم دول العالم خلال مراحل التاريخ المختلفة. وتتغذى الخيول بنسبة 70 % على الأعلاف الخضراء وبنسبة 30 % على المركزات طوال السنة. يقدر عدد الخيول العربية الأصيلة في سورية 3000 رأس حتى عام 2007، وهذا العدد في تزايد مستمر.

الخيل العربي الأصيل

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، وكذلك حجم الرأس، الآذان قصيرة ومنتصبة، ألوان الجسم والوجه عديدة منها الأدهم والأحمر، الأشقر، والأزرق ومقطع الجسم محدب.

الارتفاع عند الحارك للذكور 150 سم، وللإناث 145 سم. طول الجسم 200 - 230 سم، تتصف الخيول العربية بالجمال والرشاقة، والقدرة على التحمل وذلك بسبب نشأتها في البوادي العربية الجافة، وعلاماتها الفارقة النجمة والتحجيل ومناظل الشعر والصبحة.

الخيل العربي الأصيل

الخصائص التناسلية:

يتراوح وزن الجسم للذكور البالغة مابين 200 - 250 كغ، وللإناث البالغة 300 - 350 كغ، يقدر متوسط العمر عند البلوغ الجنسي 18 شهراً للذكور والإناث في الخيول العربية السورية، وعمر البلوغ الجسمي 36 شهراً، يبدأ موسم التناسل في شهر آذار/مارس وينتهي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ويتراوح وزن الإناث عند التلقيح مابين 250 - 350 كغ، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً. نسبة التوائم نادرة وغير مرغوبة لدى المربين نظراً للمخاطر التي تترافق معها. ومتوسط وزن المواليد الذكور والإناث 40 كغ، متوسط وزن المهر الذكر عند الفطام 70 كغ وللأنثى 75 كغ. يقدر معدل النمو اليومي حتى الفطام للذكور 130غ وللإناث 150غ.

عروق وسلالات
الخيـول والحمير
في
جمهورية العـــراق

الخيل العربي

توجد في العراق أرسان من الخيول العربية أهمها الكحيلة، الشكرة، الوهمة، والغبرة.

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه الخيول في الجزيرة العربية ومنها انتشرت إلى كل المناطق العراقية. يتراوح حجم الحيازة لكل مرب مابين 1 - 50 رأساً. تتم تغذية الخيول على المراعي بنسبة 20 % ولفترة 90 يوماً، وعلى المخلفات المحاصيل بنسبة 40 % ولفترة 60 يوماً، ومواد علفية مركزة بنسبة 40 % ولفترة 200 يوماً. يقدر العدد نحو 15689 رأساً لعام 2008 وهو في تناقص بسبب الظروف التي حدثت في العراق.

الخيل العربي

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، لون الجسم أحمر، أو أشقر، أو أحمر، أو أشهب، أو أبيض، أو رمادي، أو أسود. الرأس متوسط الحجم ومقطع الجسم مستقيم. الآذان قصيرة ومنتصبة، الارتفاع عند الحارك للذكور 160 سم، وللإناث 158 سم، طول الجسم المستقيم عند الذكور 230 سم، والإناث 220 سم.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي 18 شهراً، يقع موسم التناسل في فصلي الشتاء والربيع، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً. تمتاز الخيول العربية بمقاومتها للأمراض كالأنفلونزا، والرغام وخناق الخيول. وتم تهجينها مع بعض السلالات الأخرى الموجودة في العراق.

الحمير الشهري

المنشأ والانتشار:

المنشأ والموطن الأصلي هو الجزيرة العربية، وانتشر منها إلى عموم مناطق العراق ويسمى محلياً بالشهري، يعتمد نظام التغذية على المراعي بنسبة 80 % على مخلفات المحاصيل ونسبة 20 % وعدد هذه الحيوانات في تناقص مستمر.

الحمير الشهري

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أبيض إلى رمادي فاتح، حجم الرأس متوسط ومقطعه مستقيم، والآذان منتصبة، حجم الجسم متوسط. الارتفاع عند الحارك للذكور 100 سم، وعند الإناث 90 سم، طول الجسم المستقيم للذكر 130 سم، وللأنثى 120 سم.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي 24 شهراً، يبدأ موسم التناسل في فصلي الشتاء والربيع، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً، الفترة بين ولادتين 18شهراً، ولاتتوفر بيانات عن الأوزان.

عروق وسلالات
الخيـول والحمير
في
دولـــــــة فلسطين

الخيل العربي

المنشأ والانتشار:

نشأت في الجزيرة العربية وهي الموطن الأصلي لها. وانتشرت إلى عدة مناطق في فلسطين وبشكل أساسي في محافظة الخليل.

تقدر الأهمية النسبية ضمن النوع 50 %، حجم الحيازة رأس واحد. تعتمد الحيوانات في تغذيتها على المحاصيل بنسبة 30 % وعلى المركزات العلفية بنسبة 70 % ويقدر عددها الحالي بنحو 60 ألف رأس.

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، حجم الرأس صغير، الجبهة عريضة، الرقبة طويلة، الذيل غالباً مرتفع. فتحة الأنف واسعة، الآذان قصيرة ومنتصبة، الارتفاع عند الحارك 160 سم، طول الجسم المستقيم 200 سم، طول الجسم المائل 180سم، وتتصف هذه السلالة بتأقلمها الجيد مع بيئات مختلفة وهي مقاومة للأمراض مثل الكلب وأنفلونزا الخيل.

الخصائص التناسلية:

تبلغ الإناث جنسياً بعمر 18 شهراً، ولكنها لا تلقح إلا بعد وصولها للبلوغ الجسمي بعمر يتراوح مابين 3 - 3.5 سنة، موسم التناسل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تلقح الإناث بوزن 400 كغ. معدل الولادات مرة واحدة بالسنة، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً، الفترة بين ولادتين 12 شهراً، نسبة التوائم نادرة. وتستخدم في الرياضة والركوب ولا تتوافر بيانات عن الأوزان.

الخيل العربي المحلي المهجن

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في محافظة الخليل في فلسطين وانتشرت فيها، تقدر الأهمية النسبية ضمن النوع 80 %، حجم الحيازة رأسان، تعتمد في تغذيتها على مخلفات المحاصيل بنسبة 35 % وعلى المركزات بنسبة 40 % وعلى طول فترة العام. يقدر عددها حالياً 1000 رأس.

الخيل العربي المحلي المهجن

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه متعدد، حجم الرأس كبير ومتوسط، فتحة الأنف متوسطة، الآذان قصيرة ومنتصبة، حجم الجسم كبير، الارتفاع عند الحارك للذكور 170 سم وللإناث 160 سم، طول الجسم المستقيم 200 سم، طول الجسم المائل 210 سم، وهذه السلالة متأقلمة مع البيئة بشكل جيد ومقاومة للأمراض مثل الكلب وأنفلونزا الخيل.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي 24 شهراً، موسم التناسل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تلقح الإناث بوزن وسطي 400 كغ. معدل الولادات مرة واحدة في السنة، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً، نسبة التوائم نادرة، الفترة بين الولادتين 12شهراً. ويربى للرياضة والركوب والعمل، ولا تتوافر معلومات عن الأوزان

الخيل البلدي العربي

المنشأ والانتشار:

نشأت وانتشرت في محافظة أريحا في فلسطين، يعتمد نظام التغذية على مخلفات المحاصيل بنسبة 40 % ولفترة 144 يوماً وعلى المركزات بنسبة 60 % لفترة 216 يوماً يقدر عددها حالياً 120 رأساً.

الخيل البلدي العربي

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أحمر، أو أبيض، أو أسود. حجم الرأس متوسط، فتحة الأنف متوسطة، الآذان قصيرة ومنتصبة، حجم الجسم متوسط، الارتفاع عند الحارك للذكور 170 سم، وعند الإناث 155 سم طول الجسم المستقيم مابين 190 - 200 سم، وطول الجسم المائل 165 سم.

الخصائص التناسلية:

يتراوح وزن الجسم في الخيول البالغة مابين 350 - 400 كغ، ووزن المواليد مابين 40 - 45 كغ، والوزن عند الفطام مابين 100 - 120 كغ. تربى هذه الخيول للرياضة والركوب والعمل وتمتاز بمقاومتها للأمراض مثل المغص، الكزاز، ولا تتوافر بيانات عن الصفات التناسلية.

الحمير البلدية

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة وانتشرت في محافظة سلفيت، تقدر الأهمية النسبية ضمن النوع 75 % وحجم الحيازة 1.3 رأس، يعتمد نظام التغذية على مخلفات المحاصيل والرعي بنسبة 90 % وعلى المركزات بنسـبة 10 %، يقدر عددها حالياً 13000 رأساً.

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أبيض أو ازرق أو أخضر. حجم الرأس متوسط، فتحة الأنف ضيقة، الآذان طويلة ومنتصبة، حجم الجسم متوسط، ارتفاع الجسم عند الحارك للذكور 100 سم، وعند الإناث 80 سم، طول الجسم المستقيم مابين 110 - 120 سم.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي 14 شهراً، موسم التناسل في الصيف، الفترة بين ولادتين 14 شهراً. وتمتاز هذه السلالة بتأقلمها الجيد مع بيئات مختلفة وهي مقاومة لمرض الكلب.

عروق وسلالات
الخيول
في
دولـــة قطـــر

الخيل العربي

توجد في دولة قطر عدة أرسان للخيول العربية الأصيلة هي: دهمان، هدبان، حمداني، شويمان، صقلاوية، كحيلان، وعبيان وتوجد أيضا خيول مستوردة من دول عربية وأجنبية.

المنشأ والانتشار:

تعتبر الجزيرة العربية المنشأ والموطن الأصلي للخيول العربية، ومنها انتشرت إلى عدة مناطق في دولة قطر. تعيش الخيول في دولة قطر في عدة مرابط ومزارع مختلفة وتتغذى على مواد علفية مالئة (دريس مثلا) ومركزة (شعير، شوفان.. الخ) ويتم تشكيل خلطات علفية بحسب العمر والمرحلة الإنتاجية. وتتم رعاية الخيول العربية في قطر بهدف السباق والركوب. وقُدر العدد بنحو 4152 رأساً عام 2009 وهو في تزايد مستمر.

الخيل العربي

الصفات الشكلية:

الرأس صغير مرفوع للأعلى يتوضع على رقبة طويلة متناسقة والوجه عريض الجبهة مقعر كالصحن وعيون كبيرة براقة ومنخاران واسعان، والجسم قصير الظهر والخاصرة وكفل مستدير وأكتاف منحدرة تدريجياً والأضلاع

مستديرة، الأفخاذ عريضة وطويلة، الوركان عريضان والذيل مرفوع، ألوان الجسم مختلفة الأبيض، الأحمر، الأسود، الرمادي.. الخ. وحجم الجسم متوسط ويتراوح ارتفاع الجسم عند الحارك مابين 145 - 155 سم، علاماتها الفارقة على الوجه النجمة، دوائر الشعر، والسيالة الرتمة والعلامات اللحمية بالمخطم والشفة العليا والسفلى والذقن.

الخصائص التناسلية:

يتراوح متوسط وزن الجسم للحيوانات البالغة مابين 400 - 500 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي مابين 12 - 15 شهراً، ويمتد موسم التناسل من منتصف شهر شباط/فبراير وحتى منتصف شهر تموز/يوليو، تلقح الإناث بوزن 400 كغ، العمر عند الولادة الأولى 4 سنوات. معدل الولادات 50 % يتراوح وزن المواليد مابين 30 - 50 كغ.

الخيل العربي

الخيل المستورد
(الهجين العربي الأصيل مع الثوربريد)

المنشأ والانتشار:

تعتبر من السلالات التي نشأت في بريطانيا بمزاوجة ثلاثة من الخيول العربية الأصيلة (جودلفين ودارلي اربيان ودارلي تورك) مع الخيول الانكليزية، فنشأت أجيال من هذه الفئة جمعت في صفاتها بين قوة الخيول الانكليزية وسرعة الخيول العربية خصوصا في سباقات السرعة. وتنتشر هذه الخيول في جميع مرابط الخيل المتخصصة في سباقات السرعة، وقفز الحواجز والدريساج. وتغذى هذه الخيول حسب احتياجاتها المختلفة وذلك على الأعلاف المالئة (مثل الدريس) والمركزة (الشعير والشوفان)، قُدر عددها نحو 673 رأساً عام 2009 وهي في تزايد مستمر.

الخيول المستوردة

الصفات الشكلية:

حجم الخيول متوسط إلى كبير، الجسم طويل، الصدر عميق وبزوايا ضيقة معتدلة، الأكتاف والقيود منحدرة، الأرباع الخلفية قوية، علامات الوجه الفارقة مثل النجمة ودوائر الشعر والسيالة والرتمة والعلامات اللحمية بالمخطم والشفة العليا والسفلى والذقن. وعلامات بياض التحجيل في إكليل الحافر والكعب والقيد والرمانة والممتدة إلى أعلى القوائم، الرأس صغير وجيد التناسب والتقاسيم، الأذان قصيرة ومنتصبة، يتراوح الارتفاع عند الحارك مابين 150 - 170سم، الجسم متعدد الألوان منها الأزرق، الأحمر، الأشقر والأدهم.

الخصائص التناسلية:

يتراوح وزن الجسم عند الذكور والإناث البالغة مابين 450 - 650 كغ، متوسط العمر عند البلوغ الجنسي 18 شهراً. يبدأ موسم التناسل من منتصف شهر شـباط/فبراير وحتى منتصف شهر تموز/يوليو، معدل الولادات 50 %، العمر عند الولادة الأولى 4 سنوات ويتراوح وزن المواليد الذكور والإناث مابين 30 - 50 كغ.

الخيول المستوردة

عروق وسلالات الخيول
في
جمهورية موريتانيـا الإسلامية

الخيل العربي
(الشريفي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في شرق وجنوب البلاد، وانتشرت إلى مناطق الشرق والجنوب والوسط، قُدر عددها الحالي 159 ألف رأس، حجم الحيازة بالمتوسط 5 رؤوس.

الخيل العربي (الشريفي)

الصفات الشكلية:

حجم الرأس متوسط ومقطع الجسم مستقيم والآذان قصيرة ومنتصبة، لون الجسم بني غالباً ، الذيل طويل.

الخصائص التناسلية:

لا تتوفر معلومات عن الخصائص التناسلية.

عروق وسلالات
الخيـول والحمير
في
الجمهورية اليمنيـــة

الخيل العربي
(أم العرقوب)

المنشأ والانتشار:

نشأت خيول أم العرقوب في اليمن وهو الموطن الأصلي، حيث تنتشر في مناطق الجوف ومأرب والحديدة وصنعاء. حجم الحيازة مابين 20 - 110 رأس تعتمد الخيول في تغذيتها على مخلفات المحاصيل بنسبة 50 % وعلى المركزات العلفية بنسبة 50 %. قُدر عدد الخيول مابين 200 - 300 رأس لعام 2008 وهي في تناقص مستمر.

الخيل العربي (أم عرقوب)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أحمر، أو بني، أو أبيض، حجم الرأس متوسط ومقطع الجسم مستقيم، الآذان قصيرة ومنتصبة، وتمتاز الخيول برفع الذيل أثناء الحركة.

الخصائص التناسلية:

يعتبر هذا الرسن من الأرسان الأصيلة في اليمن، وهو غير محسن وراثياً، وتربى هذه الخيول للرياضة والركوب، ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

الخيل العربي (أم عرقوب)

الخيل العربي
(الشويماء)

المنشأ والانتشار:

نشأت خيول الشويماء في اليمن الموطن الأصلي، حيث انتشرت في مناطق الجوف ومأرب والحديدة وصنعاء، حجم الحيازة مابين 20 - 100 رأس، تعتمد هذه الخيول على مخلفات المحاصيل بنسبة 50 % والمركزات بنسبة 50 %، قُدر عددها مابين 300 - 400 رأس عام 2008 وهي في تناقص مستمر.

الخيل العربي (الشويماء)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، أو رمادي، أو أحمر. حجم الرأس متوسط، مقطع الجسم مستقيم، الآذان قصيرة ومنتصبة، تمتاز الخيول برفع الذيل أثناء الحركة.

الخصائص التناسلية:

يعتبر هذا الرسن من الأرسان الأصيلة في اليمن، وهو غير محسن وراثياً، وتربى هذه الخيول للرياضة والركوب، ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

الخيل العربي
(الصقلاوية)

المنشأ والانتشار:

نشأت الخيول الصقلاوية الأصيلة في اليمن حيث تنتشر في مناطق الجوف ومأرب والحديدة وصنعاء. ويتراوح حجم الحيازة مابين 20 - 100رأس وتعتمد هذه الخيول في تغذيتها إلى مخلفات المحاصيل بنسبة 50 % وعلى المركزات العلفية بنسبة 50 %، قُدر العدد بنحو 800 - 900 ألف رأس لعام 2008.

الخيل العربي (الصقلاوية)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أحمر أو أبيض أو رمادي، حجم الرأس متوسط، مقطع الجسم مستقيم، الآذان قصيرة ومنتصبة، وتتميز الخيول بطول الجسم.

الخصائص التناسلية:

يعتبر هذا الرسن من الأرسان الأصيلة في اليمن وهو غير محسن وراثياً، ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

الخيل العربي
(العبية)

المنشأ والانتشار:

نشأت خيول العبية في اليمن وهو الموطن الأصلي لها، حيث تنتشر في مناطق الجوف ومأرب والحديدة وصنعاء، يتراوح حجم الحيازة مابين 20 - 100 رأس. تتغذى الحيوانات على مخلفات المحاصيل بنسبة 50 % وعلى المركزات العلفية بنسبة 50 %، قُدر عددها مابين 200 - 600 رأس عام 2008 وهي في تناقص مستمر في الجمهورية اليمنية.

الخيل العربي (العبية)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض أو رمادي أو أحمر، حجم الرأس متوسط، مقطع الجسم مستقيم، الآذان قصيرة ومنتصبة، تمتاز برفع الذيل أثناء الحركة.

الخصائص التناسلية:

يعتمد هذا الرسن من الأرسان الأصيلة في اليمن تربى بهدف الرياضة والركوب وهو غير محسن وراثياً ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

الخيل العربي
(الكحيلة)

من أهم أرسان الخيول العربية الأصيلة في اليمن هي كحيلة، شويماء ، صقلاوية، عبية، وأم عرقوب.

المنشأ والانتشار:

يعد اليمن الموطن الأصلي لرسن الكحيلة، حيث تنتشر في مناطق الجوف ومأرب والحديدة وصنعاء، وتتراوح حجم الحيازة مابين 10 - 70 رأس، تعتمد هذه الخيول في تغذيتها على مخلفات المحاصيل بنسبة 60 % والمركزات بنسبة 40 %. قُدر العدد لهذا الرسن 400 رأس عام 2008.

الخيل العربي (الكحيلة)

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أبيض أو رمادي أو أحمر، تتميز الخيول بكحل على العيون، حجم الرأس متوسط وصغير، مقطع الجسم مستقيم، الآذان قصيرة ومنتصبة.

الخصائص التناسلية:

يعتبر هذا الرسن من الأرسان الأصيلة في اليمن، وهو غير محسن وراثياً تربى للرياضة والركوب، ولا تتوافر معلومات أخرى عن الخصائص التناسلية.

حمير الصبياني

المنشأ والانتشار:

المنشأ والموطن الأصلي هو اليمن، ومناطق الانتشار الرئيسية عمران، صنعاء، المحويت، القطيع النامي 50 % ذكور وإناث، والقطيع المنتج 50 % ذكور وإناث، يعتمد نظام التغذية بنسبة 80 % على المراعي ونسبة 20 % على مخلفات المحاصيل، وحجم الحيازة 1 - 2 رأس، وعدد هذه الحيوانات 2 - 3 آلاف رأس وهو في تناقص مستمر.

حمير الصبياني

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أبيض إلى رمادي فاتح أو أسود، حجم الرأس كبير ومقطعه مستقيم، والآذان منتصبة وطويلة، حجم الجسم متوسط. الارتفاع عند الحارك للذكور 150 سم، وعند الإناث 120 سم طول الجسم المستقيم للذكر 140سم، وللأنثى 130 سم.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي 24 شهراً، يبدأ موسم التناسل في فصلي الشتاء والربيع، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً، الفترة بين ولادتين 18 شهراً، ولاتتوفر بيانات عن الأوزان.

حمير القرماني

المنشأ والانتشار:

المنشأ والموطن الأصلي هو اليمن، ومناطق الانتشار الرئيسية كل مناطق الجمهورية، القطيع النامي 50 % ذكور وإناث، والقطيع المنتج 50 % ذكور وإناث، يعتمد نظام التغذية بنسبة 80 % على المراعي ونسبة 20 % على مخلفات المحاصيل، وحجم الحيازة 1 - 2 رأس، وعدد هذه الحيوانات 200 - 300 ألف وهو في تناقص مستمر.



الحمير القرماني

الصفات الشكلية:

لون الوجه والجسم أبيض إلى رمادي فاتح أو أسود، حجم الرأس كبير ومقطعه مستقيم، والآذان منتصبة وطويلة، حجم الجسم متوسط. الارتفاع عند الحارك للذكور 100 سم، وعند الإناث 90 سم طول الجسم المستقيم للذكر 130سم، وللأنثى 120 سم.

الخصائص التناسلية:

العمر عند البلوغ الجنسي 24 شهراً، يبدأ موسم التناسل في فصلي الشتاء والربيع، العمر عند الولادة الأولى 48 شهراً، الفترة بين ولادتين 18 شهراً، ولاتتوفر بيانات عن الأوزان.

عروق وســـلالات
الدجـــاج والأرانب
في بعض الدول العربيـة

سـلالات الدجاج والأرانب
في
بعض الدول العربيـة
سلالات مدخلة

الدجاج البياض

المنشأ والانتشار:

المنشأ والموطن الأصلي لهذه السلالة أوروبا، وانتشرت في معظم دول العالم والدول العربية (سورية، لبنان، سلطنة عمان، فلسطين، المغرب، تونس... الخ). اسم العرق/السلالة لوهمان، هاي لاني، ايز براون، شيفر، بابكوك، هايسكس، الأسماء المحلية/السلالات التجارية المتخصصة بإنتاج البيض.

نظام الإنتاج في مزارع حديثة ويتركب القطيع بالكامل من منتج وأمات، نظام التغذية 100 % على الأعلاف المركزة.

بلغ تعداد أمات البياض في سورية 18131 دجاجة عام 2007، في سورية وهي في تزايد مستمر.

دجاج بياض ناتجة عن أمات مستوردة

الصفات الشكلية:

حجم الجسم صغير، لون الجسم للذكور والإناث إما أبيض أو بني، الرقبة غير عارية من الريش والأرجل عارية من الريش، شحمة الأذن بيضاء، العرف مفرد وأحمر اللون، والذيل مرفوع.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور والإناث البالغة مابين 1.5 - 1.8 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 5 - 6 أشهر، موسم التناسل على مدار العام، الوزن عند التلقيح 1.5 كغ، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً، متوسط وزن البيضة 60 غ. يتراوح أعداد البيض في السنة مابين 250 - 280 بيضة، لون قشرة البيضة أبيض أو بني، وزن الصوص للذكر وللأنثى 45 غ، وزن التسويق 2 - 3 كغ، عمر التسويق للأنثى 550 يوماً، معدل النمو اليومي حتى التسويق 4 - 5.5 غ، وزن الذبيحة 1.6 كغ، نسبة التصافي 72 %، ونسبة التشافي 65 %.

تتأقلم السلالة في بيئات مختلفة، مقاومة لأمراض الدواجن عند إعطاء اللقاحات البيطرية اللازمة.

دجاج اللحم

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في أوربا (الموطن الأصلي)، أدخلت إلى كافة محافظات القطر العربي السوري، وتنتشر في معظم دول العالم والدول العربية (سورية، لبنان، فلسطين، تونس، سلطنة عمان، مصر)، اسم السلالة لوهمان، روس، هابر، توب 500، ابرورايكرز، شيفر... الخ، وتسمى محليا السلالات التجارية المتخصصة بإنتاج لحم الفروج، نظام الإنتاج في مزارع حديثة. تركيب القطيع منتج وأمات فروج، نظام التغذية على المركزات 100 %، فترة الرعاية 50 يوماً للفروج و576 يوماً للأمات. بلغ تعداد الطيور 80 مليوناً في سورية و(60) مليوناً في لبنان، وعدد أمات الفروج في سورية 2918 طيراً عام 2007، وهي في تزايد مستمر.

دجاج اللحم ناتجة من سلالات مستوردة

الصفات الشكلية:

حجم الجسم كبير، لون الجسم أبيض، الرقبة غير عارية من الريش، الأرجل عارية من الريش، شحمة الأذن بيضاء، العرف أحمر مفرد كبير عند الذكور وأصغر عند الإناث، الداليتان حمراء.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح العمر عند البلوغ الجنسي للأمات 5 - 6 أشهر، التناسل على مدار العام، الوزن عند التلقيح للأمات 1.7 كغ، طول فترة حضانة البيض للأمات 21 يوماً. يتراوح متوسط وزن البيض للأمات مابين 60 - 65 غ، عدد البيض في السنة للأمات 145 - 165 بيضة، لون قشرة البيضة أبيض، وزن الصوص 45 غ، وزن التسويق 2 كغ. يتراوح عمر التسويق 42 - 50 يوماً، معدل النمو اليومي حتى التسويق 45 غ، الوزن البالغ للذكور 1.8 كغ وللإناث 1.6 كغ. وزن الذبيحة 1.5 كغ، نسبة التصافي 72 %، ونسبة التشافي 65 %، مقاوم للأمراض الفيروسية والبكتيرية بعد إعطاء اللقاحات البيطرية.

الليجهورن

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في أمريكا، وأدخلت إلى كافة مناطق سلطنة عُمان، وتنتشر في أغلب الدول العربية والأجنبية، نظام الإنتاج في المزارع الحديثة بنسبة 100 %. يتركب القطيع من 100 % دجاج منتج. تتغذى الطيور على الأعلاف المركزة بنسبة 100 %، التعداد الحالي 600 ألف طير في عُمان، وهذه السلالة في تزايد مستمر.

الليجهورن

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، لون الجسم والرأس السائد البني، الرقبة غير عارية من الريش، بينما الأرجل تكون عارية من الريش، العرف مفرد وأحمر اللون وشحمة الأذن بيضاء.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي 5 أشهر، متوسط وزن البيضة 45 غ، عدد البيض في السنة 300 بيضة لكل دجاجة، لون قشرة البيضة بني.

تتأقلم السلالة بشكل جيد خارج الموطن الأصلي والاستجابة للتحسين الوراثي جيدة.

أرنب كاليفورنيا

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (الموطن الأصلي)، وانتشرت في المناطق الساحلية والشمالية من تونس وجميع مناطق الجماهيرية الليبيـة ومنتشرة أيضاً في لبنان وسـورية ومصر واليمن.. الخ، نظام الإنتاج 30 % مزارع قديمة بحجم 100 رأساً، نظام التغذية بالكامل على الأعلاف المركزة في تونس.

يتركب القطيع من 20 % ذكور و80 % إناث، العدد الحالي 7.4 ألف رأساً لعام 2008 في تونس و1200 رأساً في ليبيا، ويتراوح بين 200 - 500 رأساً في اليمن وهو في تزايد مستمر.

أرنب كاليفورنيا

الصفات الشكلية:

لون الجسم والرأس أبيض، لون الأعين حمراء، علامات فارقة الآذان والأنف بلون أسود، الرأس والجسم متوسط الحجم، الآذان متوسطة الطول ومنتصبة.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 3.5 كغ والإناث البالغة 4 كغ. يتراوح العمر عند البلوغ الجنسي مابين 4 - 5 أشهر، العمر عند الولادة الأولى مابين 6 - 9 أشهر، الفترة بين ولادتين 2 - 3 أشهر، عدد المواليد في البطن مابين 4 - 7 مولود، وزن المواليد الذكور 57 غ، والمواليد الإناث 54 غ، وزن تسويق الذكور 2.1 كغ والإناث 1.9 كغ، معدل النمو اليومي حتى التسويق 30 غ، عمر التسويق 80 يوماً، نسبة التصافي 57 %، نسبة التشافي 54 %.

تتأقلم السلالة بشكل جيد خارج الموطن الأصلي، ويستجيب للتحسين الوراثي.

عروق الأرانب
في
الجمهورية التونسية

الأرنب الهجين في تونس

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا الموطن الأصلي، وأدخلت إلى شمال تونس، وبخاصة الوطن القبلي والساحل، والسلالة هي هجين بين النيوزيلندي وجيان بلان ديبوسكا، نظام الإنتاج مزارع قديمة بنسبة 30 %وبحجم قطيع 100 رأس، وبنسبة 50 % منزلي وبحجم قطيع 25 رأساً، وبنسبة 20 % مزارع حديثة وبحجم قطيع 250 رأساً.

يتركب القطيع المنتج من 20 % ذكور، و80 % إناث، نظام التغذية بشكل رئيسي على الأعلاف المركزة، العدد الحالي 20 ألفا لعام 2008، وهو في تزايد مستمر.

الصفات الشكلية:

لون الجسم والرأس أبيض، لون الأعين وردي، حجم الجسم والرأس متوسط، الآذان متوسطة ومنتصبة.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 4.5 كغ والإناث البالغة (4) كغ. يتراوح العمر عند البلوغ الجنسي مابين 4 - 5 أشهر، العمر عند الولادة الأولى مابين 6 - 7 أشهر، الفترة بين ولادتين 2 - 3 أشهر، عدد المواليد في البطن مابين 6 - 9 مولود، متوسط وزن المواليد الذكور أوالإناث 56 غ، عمر التسويق 77 يوماً، نسبة التصافي 60 %، نسبة التشافي 57 %. الفروة ناعمة.

تتأقلم السلالة خارج الموطن الأصلي، وتستجيب للتحسين الوراثي.

عروق الدجاج والأرانب
في
الجمهوريـــــة الجزائرية
الديموقراطية الشعبية

الدجاج العربي (المزركش)

المنشأ والانتشار:

منشأ هذه السلالة غير معروف، أدخلت إلى شمال إفريقيا، وتنتشر في كل مناطق الجزائر، وهي في تزايد مستمر، نظام الإنتاج منزلي فردي، وتتغذى بنسبة 80 % على مخلفات المنازل، وبنسبة 20 % على أعلاف مركزة.

ديوك ودجاج من سلالة العربي (المزركش) في الجزائر

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، لون الجسم عند الذكور والإناث متعدد الألوان، لون الرأس عند الذكور أحمر، الرقبة أما عارية من الريش أو غير عارية، الأرجل عارية من الريش، العرف عند الذكور والإناث مفرد.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 2.2 كغ، والإناث البالغة 1.8 كغ. العمر عند البلوغ الجنسي 4 أشهر، موسم التناسل في فصل الخريف، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً، متوسط وزن الصيصان الذكور 38 غ، والصيصان الإناث 37 غ، وزن التسويق للذكور 1.8 كغ والإناث 1.6كغ، وتسوق الذكور والإناث بعمر 100 يوم، معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكور 14.6غ، وللإناث 13 غ، متوسط نسبة التصافي 70 %، متوسط وزن البيضة 50 غ، عدد البيض بالسنة 100 بيضة، ولون قشرة البيض أبيض.

تتأقلم السلالة في بيئات مختلفة، وهي غير محسنة وقابلة للتحسين الوراثي، مقاومة لأمراض الكوكسيديا، والسالمونيلا.

الأرانب المحلية

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في الجزائر الموطن الأصلي، وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، نظام الإنتاج مزارع قديمة ومنزلي فردي، ومزارع حديثة بنسبة 55 %. يتركب القطيع من 40 % ذكور، و60 % إناث.

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض وبني ورمادي، لون الأعين أسود أو أحمر، حجم الجسم والرأس متوسط، الآذان منتصبة، مقطع الجسم محدب.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 2 كغ، والإناث البالغة 2.5 كغ. يتراوح العمر عند البلوغ الجنسي مابين 1.6 - 1.8 شهر، موسم التناسل طيلة أيام السنة، الوزن عند التلقيح 2.5 كغ، العمر عند الولادة الأولى 5 أشهر، عدد المواليد في البطن 7 - 8 مولود. تتراوح الفترة بين الولادتين 45 - 60 يوماً، متوسط وزن المواليد الذكور 51 غ، والإناث 48.5 غ، وزن التسويق للذكور والإناث 1.5 كغ، معدل النمو اليومي حتى التسويق 20 غ. يتراوح عمر التسويق مابين 77 - 91 يوماً، وزن الذبيحة مابين 1.2 - 1.3 كغ، نسبة التصافي 55 %، الفرو ناعم، وزن الفرو الخام 200 غ، نسبة الفرو النظيف 80 %.

تأقلم السلالة جيد خارج موطنها الأصلي، وتستجيب للتحسين الوراثي، مقاومة للأمراض (الجرب، التهاب الضرع، آلام الأرجل)، هُجنت مع سلالات أخرى.

عروق الدجاج والأرانب
في
المملكــة العربية السعودية

الدجاج البلدي الحساوي
(محلية)

المنشأ والانتشار:

نشأت وانتشرت السلالة في منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية، تتغذى على مخلفات المنازل والأعلاف المركزة وأعلاف أخرى، والسلالة في تزايد مستمر.

الديك البلدي الحساوي

الدجاجة البلدية الحساوية

الصفات الشكلية:

حجم الجسم صغير، لون الجسم والرأس أصفر وأسود، والرقبة غير عارية من الريش، الذيل مرفوع للأعلى، الأرجل قصيرة نسبيا وعارية من الريش، العرف مفرد أحمر اللون.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 800 غ، والإناث البالغة 700 غ، العمر عند البلوغ الجنسي 7 أشهر، موسم التناسل في شهر الربيع، متوسط وزن الأنثى عند التلقيح 700 غ، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً، متوسط وزن الصوص الذكر 30 غ والأنثى 28 غ.

تسوق الذكور بوزن 800 غ والإناث بوزن 700 غ، عمر التسويق للذكور والإناث 90 يوماً، معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكور 0.5 غ، وللإناث 0.25 - 0.50 غ، البيضة صغيرة الحجم، متوسط وزن البيضة مابين 15 - 20 غ، عدد البيض في السنة 180بيضة لكل دجاجة، لون قشرة البيضة أبيض لبني.

تستجيب السلالة للتحسين الوراثي، وهي مقاومة لمرض النيوكاسل.

الأرنب البلدي المحلي
(حساوي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة وانتشرت في المملكة العربية السعودية، نظام التغذية على مخلفات المنازل والأعلاف المركزة والأعلاف الخضراء.



الأرنب البلدي (حساوي)

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض أو رمادي، لون العيون أحمر أو أسود، الآذان قصيرة ومنتصبة، الجسم محدب، ارتفاع الجسم عند الذكر 18 سم، وعند الأنثى 16سم، طول الجسم المستقيم للذكور 31 سم، وللإناث 30 سم.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 2.5 كغ وللإناث البالغة 2 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 4 أشهر، العمر عند الولادة الأولى مابين 6 - 7 أشهر، عدد المواليد في البطن مابين 5 - 9 مولود، وزن التسويق للذكور 3.5 كغ، وللإناث 3 كغ، عمر التسويق 60 يوماً، الفروة ناعمة.

عروق الدجاج
في
جمهورية السـودان

الدجاج الرقباني المحلي
(الزعوري)

المنشأ والانتشار:
نشأت هذه السلالة وانتشرت في جنوب السودان، نظام الإنتاج منزلي، ونظام التغذية على مخلفات المنازل.

دجاج الرقباني (الزعروري)

الصفات الشكلية:
حجم الجسم متوسط، الجسم والرأس متعدد الألوان، الرقبة والأرجل عارية من الريش، العرف جوزي أحمر اللون.

الصفات الإنتاجية:
متوسط وزن البيضة 39 غ، أعداد البيض في السنة 106 بيضة لكل دجاجة، لون قشرة البيض أبيض. السلالة غير محسنة.

الدجاج المحلي البتولي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في جبال النوبة في السودان، نظام الإنتاج منزلي فردي، نظام التغذية على مخلفات المنازل بنسبة 100 %.

ديك البتولي

دجاجة بتولي

الصفات الشكلية:

حجم الجسم صغير، الجسم والرأس متعدد الألوان، الرقبة غير عارية من الريش، الأرجل عارية من الريش لكل من الذكور والإناث، العرف جوزي أحمر اللون، وشحمة الأذن بيضاء.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن البيضة 37 غ، عدد البيض في السنة 80 بيضة لكل دجاجة، لون قشرة البيضة أبيض، التناسل على مدار العام.

الدجاج البلدي المحلي

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة وانتشرت في محافظات ومناطق السودان، نظام الإنتاج منزلي، نظام التغذية على مخلفات المنازل.

الديك البلدي

دجاجة بلدي

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، الجسم والرأس متعدد الألوان، الرقبة غير عارية من الريش، الأرجل عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي 6 أشهر، وزن الإناث عند التلقيح 900 غ، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً، متوسط وزن البيضة 38 غ، عدد البيض في السنة 78 بيضة، لون قشرة البيضة أبيض.

تتأقلم السلالة في البيئات المختلفة، وتستجيب للتحسين الوراثي.

عروق الدجاج والأرانب
في
الجمهورية العربية السـورية

الإوز الأهلي
(الإوز ذو الحدبة)

المنشأ والانتشار:

المنشأ والموطن الأصلي الصين، نظام الإنتاج منزلي فردي. يتغذى الإوز على مخلفات المنازل لمدة 45 يوماً، وعلى الأعلاف المركزة بنسبة 10 % ولمدة أسبوعين، وعلى الأعلاف الخضراء بنسبة 90 % ولمدة 16 أسبوعاً. بلغ تعدادها في سورية 48954 طيراً في عام 2007 وهي في تزايد.

الإوز الأهلي (الإوز ذو الحدبة)

الصفات الشكلية:

حجم الجسم كبير، لون جسم الذكور أبيض، ولون جسم الإناث أبيض ورمادي فاتح وغامق، الرقبة غير عارية من الريش، والأرجل عارية من الريش ولون المنقار برتقالي.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور البالغة مابين 3 - 4كغ، والإناث البالغة مابين 2.5 - 3.5 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي للذكور والإناث مابين 9 - 10 أشهر، موسم التناسل طويل 240 يوماً، طول فترة حضانة البيض 27 يوماً، متوسط وزن البيضة 120غ، عدد البيض في السنة مابين 50 - 60 بيضة، لون قشرة البيضة كريمي فاتح، وزن الصوص لكل من الجنسين مابين 88 - 90 غ، عمر التسويق مابين 56 - 63 يوماً، وزن الذبيحة بالمتوسط 3 كغ، نسبة التصافي 70 % ونسبة التشافي 45 %.
يتأقلم الإوز خارج موطنه الأصلي، وهو مقاوم لمرض السالمونيلا، وغير محسن وراثياً.

البط البلدي
(بط بكين)

المنشأ والانتشار:

المنشأ والموطن الأصلي الصين، وينتشر في معظم الدول العربية، وقد يسمى محلياً (بط حفيري) ويصنف بأنه بط لحم، نظام التغذية على مخلفات المنازل 70 يوماً، وبعض الأعلاف الأخرى الخضراء لمدة 60 يوماً في حالة التسمين، نظام الإنتاج منزلي فردي بنسبة 100 %. ليس لتربية البط أهمية اقتصادية في معظم الدول العربية بسبب قلة المسطحات المائية فيها من جهة ولعدم إقبال المواطن العربي على استهلاك لحومها، لذلك تستخدم غالبا للزينة.

البط البلدي (بط بكين)

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط ولونه إما أبيض، أو ملون (أبيض، أسود، رمادي) أو لون بني فاتح أو غامق منقط بالأسود. الرقبة غير عارية من الريش، الأرجل عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 3.5 كغ، والإناث البالغة 3 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي للذكور والإناث مابين 5 - 7 أشهر، موسم التناسل في شهر كانون الثاني، طول فترة حضانة البيض 28 يوماً، ومتوسط وزن البيضة 70 غ، وزن الصوص الذكر 43 غ، والصوص الأنثى 40 غ، وزن التسويق 3.2 كغ للذكور، و3 كغ للإناث. متوسط وزن الذبيحة 2.6 كغ.

الدجاج البلدي
(القروي)

المنشأ والانتشار:

يعتقد ان هذه السلالة نشأت في الهند أو القوقاز أو تركيا، وهناك ثلاث نماذج تحت السلالة تسمى الهندي أو الشركسي أو الرزي. تنتشر هذه السلالة في كافة المحافظات السورية، نظام التغذية على المخلفات المنزلية، وبعض الأعلاف المركزة، نظام الإنتاج منزلي فردي بنسبة 100 %. ويتركب القطيع من 50 % منتج، و40 % نامي، و10 % أمات. بلغ تعداد هذه السلالة 8 ملايين طير في سورية عام 2007، وهي في تزايد مستمر.

ديك البلدي (القروي)

دجاجة بلدي (القروي)

الصفات الشكلية:

حجم الجسم صغير، لون الجسم والرأس بني أو أسود أو أبيض أو رزّي، الرقبة غير عارية من الريش، أما الأرجل فهي عارية من الريش، العرف مفرد أحمر اللون، وشحمة الأذن حمراء، الذيل مرفوع.

الصفات الشكلية غير ثابتة.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور والإناث البالغة 1.5 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي نحو 6 أشهر، موسم التناسل خلال شهري آذار/مارس ونيسان/ابريل. تلقح الإناث بوزن 1.2 كغ، طول فترة الحضانة للبيض 21 يوماً. يتراوح متوسط وزن البيضة مابين 25 - 40 غ، وعدد البيض في السنة مابين 80 - 120 بيضة لكل دجاجة، لون قشرة البيضة بني فاتح، متوسط وزن الصوص الذكر أو الأنثى 30 غ، وزن التسويق للذكور والإناث 3 - 3.3 كغ، أما عمر التسويق للذكور 365 يوماً وللأمات 1000 يوماً. معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكور 20 غ، وللإناث 15 غ، نسبة التصافي 65 %. تتأقلم السلالة في بيئات مختلفة. تميل للرقاد على البيض. تستجيب للتحسين الوراثي.

الصفات الإنتاجية ليست ثابتة.

الرومي الأبيض

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في بريطانيا الموطن الأصلي، أدخلت إلى ريف دمشق ومحافظة درعا في سورية، وانتشر في مصر وفلسطين والمغرب وليبيا، نظام الإنتاج مزارع حديثة، نظام التغذية 100 % على المركزات، والسلالة في تزايد مستمر.



الرومي الأبيض

الصفات الشكلية:

حجم الجسم كبير، لون الجسم أبيض، الرقبة غير عارية من الريش، الأرجل عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 20 كغ والإناث البالغة 10 كغ. تستخدم الذكور للتلقيح بوزن 30 كغ. وتلقح الإناث بوزن 12كغ، طول فترة حضانة البيض 28 يوماً، وزن الصوص الذكر أو الأنثى 60 غ، وزن التسويق للذكر 20 كغ، وللأنثى 10كغ، عمر التسويق للذكر 150 يوماً، وللأنثى 120 يوماً، معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكر 170 غ وللأنثى 105غ، وزن الذبيحة للذكر 16 كغ، وللأنثى 8 كغ، نسبة التصافي 75 % ونسبة التشافي 60 %.تتراوح أعداد البيض في السنة مابين 60 - 90 بيضة، لون قشرة البيضة أبيض منقط بالبني.

الرومي البلدي
(محلية)

المنشأ والانتشار:

المنشأ والموطن الأصلي سورية. ينتشر في محافظات (حمص، حماه، إدلب، ريف دمشق، الحسكة)، نظام الإنتاج فردي منزلي. يتركب القطيع من 20 % منتج، و60 % نامي، و20 % أمات، نظام التغذية على مخلفات المنازل بنسبة 50 %، وعلى أعلاف أخرى بنسبة 50 %. بلغ تعداد طيور هذه السلالة حوالي 2 مليون لعام 2007، وهي في تزايد مستمر.

الرومي البلدي

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، لون الجسم أسود أو بني أو بيج، الرقبة غير عارية من الريش، والأرجل عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي 6 أشهر، الوزن عند التلقيح 7 كغ، طول فترة حضانة البيض 28 يوماً، وزن الصوص بالمتوسط 50 غ، والوزن عند التسويق للذكور 8 كغ، وللإناث 5 كغ، عمر التسويق 365 يوماً، يتراوح وزن الذبيحة مابين 4 - 6 كغ، وبنسبة تصافي 75 % ونسبة التشافي 60 %، عدد البيض في السنة 15 بيضة، لون قشرة البيضة أبيض. تتأقلم الطيور في بيئات مختلفة، السلالة غير محسنة وراثياً.

النعام (أسود الرقبة)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في جنوب إفريقيا الموطن الأصلي، وانتشر إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق وغرب إفريقيا واستراليا ونيوزيلندا، وأدخل إلى محافظة ريف دمشق، نظام الإنتاج مزارع حديثة 100 %. يتركب القطيع من 10 % نامي و 90 % أمات، نظام التغذية 80 % على الأعلاف المركزة و20 % على الأعلاف الخضراء، العدد الحالي 2500 رأساً لعام 2007 وهي في تزايد مستمر.

النعام أسود الرقبة

الصفات الشكلية:

حجم الجسم كبير، لون الجسم والرأس عند الذكور أسود أما عند الإناث رمادي مائل إلى البني، الرقبة والأرجل عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 120 كغ وللإناث البالغة 100 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي للذكور مابين 42 - 48 شهراً، وللإناث مابين 30 - 36 شهراً، موسم التناسل من شهر آذار/مارس حتى أيلول/سبتمبر من كل عام. الوزن عند التلقيح مابين 70 - 90 كغ، طول فترة حضانة البيض 42 يوماً، متوسط وزن البيضة مابين 1-1.5 كغ، عدد البيض في السنة مابين 40 - 60 بيضة، لون قشرة البيضة أبيض مائل للسمرة، وزن الصوص الذكر 0.9 كغ والأنثى 0.8 كغ. وزن التسويق للذكور والإناث 95 كغ. عمر التسويق 360 يوماً، معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكور 250 غ وللإناث 225 غ، وزن الذبيحة بالمتوسط 50 كغ، نسبة التصافي 50 % ونسبة التشافي 35 %.

الأرنب البلدي
(محلي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في سورية، وتنتشر في معظم المحافظات السورية، نظام الإنتاج 15 % مزارع قديمة بحجم قطيع مابين 100 - 200 رأس، ومزارع حديثة 5 % بحجم قطيع 1000 رأس و80 % نظام إنتاج منزلي بحجم قطيع مابين 10 - 15 رأساً. يتركب القطيع النامي من 50 % ذكور و50 % إناث. أما القطيع المنتج 5 % ذكور و25 % إناث. تتم التغذية بنسبة 15 % على الأعلاف المركزة، وبنسبة 85 % على الأعلاف الخضراء.

الأرنب البلدي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض أو رمادي أو قرميدي أو أسود وأبيض أو بني أو أسود، حجم الجسم كبير، لون الأعين أحمر، الآذان تشبه الملعقة قصيرة ومنتصبة، الأظافر بيضاء محمرة، حجم الرأس متوسط، ارتفاع الجسم الذكر عن الأرض 20 سم، وللأنثى 18 سم، طول الجسم المائل للذكور 27 سم، وللإناث 28 سم.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 1.5 كغ، وللإناث البالغة 2 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي مابين 5 - 7 أشهر، موسم التناسل في فصل الربيع. يتراوح الوزن عند التلقيح مابين 1.5 - 2 كغ، معدل الولادات 73 %، العمر عند الولادة الأولى مابين 8 - 9أشهر، معدل المواليد في البطن 7 - 11 مولوداً. تتراوح الفترة بين الولادتين 60 - 70 يوماً، وزن الميلاد للذكور أوللإناث 50 غ، وزن التسويق 1.5 كغ، وعمر التسويق 70 يوماً. يتراوح وزن الذبيحة مابين 500 - 700 غ، نسبة التصافي 57 % ونسبة التشافي 40 %.

تتأقلم السلالة في بيئات مختلفة، وتنتج الفرو الناعم، وتستجيب للتحسين الوراثي، ومقاومة لأمراض (الرشح، الجرب، الكوكسيديا)، وهذه السلالة خليطة من سلالات عديدة.

عروق الدجاج والأرانب
في
جمهورية العـــراق

الدجاج المحلي العراقي
(المنطقة الشمالية)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في المنطقة الشمالية من العراق، وأدخلت إلى المنطقة الوسطى من العراق، وانتشرت في مناطق السليمانية، دهوك، أربيل والموصل، نظام الإنتاج منزلي فردي. يتركب القطيع من نامي ومنتج، نظام التغذية مخلفات المنازل وأعلاف أخرى، وهذه السلالة في تناقص مستمر.

الصفات الشكلية:

حجم الجسم كبير.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن البيضة 55 غ، عدد البيض في السنة 80 بيضة لكل دجاجة، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً، لون قشرة البيض بني، نسبة التصافي 75 %.

تتأقلم الطيور بشكل جيد في بيئات مختلفة. تستجيب السلالة للتحسين الوراثي، مقاومة للأمراض الطفيلية وارتفاع درجات الحرارة وغير محسن وراثياً.

الدجاج المحلي العراقي
(المنطقة الوسطى)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة وانتشرت في المنطقة الوسطى من العراق وبخاصة محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية، نظام الإنتاج منزلي فردي، نظام التغذية مخلفات المنازل وأعلاف أخرى. يتركب القطيع من نامي ومنتج.

الصفات الشكلية:

حجم الجسم صغير.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن البيضة مابين 40 - 45 غ، عدد البيض في السنة 120 بيضة لكل دجاجة، لون قشرة البيض أبيض، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً، نسبة التصافي 75 %. تتأقلم الطيور في بيئات مختلفة، جيد الاستجابة للتحسين الوراثي وهو غير محسن وراثياً، مقاوم للأمراض الطفيلية وارتفاع درجات الحرارة.

الأرنب الكورا، البينيو

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في آسيا الصغرى، وانتشرت في جميع محافظات العراق، وأدخلت إلى تركيا وإيران، نظام الإنتاج مزارع قديمة 5 % بحجم قطيع مابين 100 - 200 رأس، و95 % نظام إنتاج منزلي فردي بحجم قطيع 20 - 30 رأساً. يتركب القطيع من 3 % ذكور و97 % إناث، نظام التغذية على مخلفات المنازل بنسبة 3 % ولمدة 245 يوماً، وعلى المحاصيل الحقلية بنسبة 15 % وعلى الأعلاف الخضراء بنسبة 60 % ولمدة 60 يوماً.

الأرنب الكورا، البينيو

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض أو رمادي، لون العيون حمراء، حجم الجسم والرأس صغير والآذان قصيرة، مقطع الجسم محدب، ارتفاع الجسم عند الذكور 25 سم، والإناث 20 سم، طول الجسم المستقيم للذكور والإناث 30 سم، طول الجسم المائل للذكور 35 سم، وللإناث 30 سم.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور البالغة 2 كغ، والإناث البالغة 1.8 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 2 شهر، موسم التناسل على مدار العام، الوزن عند التلقيح 1.5 كغ، معدل الولادات 40 - 50 %، العمر عند الولادة الأولى 6 أشهر، عدد المواليد في البطن مابين 6 - 8 مولود، الفترة بين ولادتين شهران، متوسط وزن الميلاد للذكور 40 غ، وللإناث 38 غ، وزن التسويق 2 كغ للذكور و1.5 كغ للإناث. يتراوح معدل النمو اليومي حتى التسويق مابين 20 - 27 غ، عمر التسويق 90 - 120 يوماً، نسبة التصافي 80 %، ونسبة التشافي 54 %، الفرو خشن، وزن الفروة الخام 250 غ، نسبة الفرو النظيف 75 %.

يتأقلم خارج موطنه الأصلي وهو غير محسن، ويستجيب للتحسين الوراثي.

عروق الدجاج
في
سلطنة عُمـــان

الدجاج الظفاري
(محلية)

المنشأ والانتشار:

نشأت وانتشرت هذه السلالة في محافظة ظفار في سلطنة عُمان، نظام الإنتاج منزلي فردي بنسبة 20 %، وضمن مزارع تقليدية بنسبة 80 %. ويتركب القطيع من 40 % منتج و20 % نامي و20 % أمات، و20 % جدات. تتغذى الطيور على مخلفات المنازل بنسبة 40 %، وعلى الأعلاف المركزة بنسبة 60 %، التعداد الكلي 10 آلاف طير، والسلالة في تزايد مستمر.

الدجاج المحلي في ظفار

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، لون الجسم والرأس للذكور وللإناث أسود أو بني فاتح أو أبيض، الرقبة غير عارية من الريش والأرجل عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند البلوغ الجنسي 5 أشهر، موسم التناسل خلال شهري أيار/ مايو وتموز/يوليو. تلقح الإناث بوزن مابين 0.8 - 1 كغ، طول فترة الحضانة 21 يوماً. يتراوح وزن الصيصان الذكور والإناث مابين 26 - 37 غ، وزن التسويق للذكور 1.5كغ وللإناث 1.2 كغ، عمر التسويق 154 يوماً، معدل النمو اليومي حتى التسويق 13 غ، وزن الذبيحة 1.1 كغ وبنسبة تصافي 70 % وبنسبة تشافي 67 %، متوسط وزن البيضة مابين 40 - 45 غ، عدد البيض في السنة 120 - 170 بيضة لكل دجاجة، لون قشرة البيضة بني فاتح.

عروق الدجاج
في
الجماهيرية
العربيـة
الليبيـة
الشـعبية
الاشـتراكية
العظمى

الدجاج المحلي (العربي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وانتشرت في طرابلس، غريان، الزاوية، جرمان، الجبل الأخضر، ومناطق أخرى من ليبيا، نظام الإنتاج منزلي فردي وفي مزارع تقليدية. يتركب القطيع من 50 % منتج و50 % نامي، نظام التغذية 80 % على مخلفات المنازل و20 % على أعلاف مركزة، بالإضافة إلى أعلاف أخرى مثل البرسيم، وخضراوات أخرى.

الصفات الشكلية:

حجم الجسم صغير، لون الجسم والرأس فضي أو بني غامق أو أسود أو بني فاتح أو أحمر غامق، أو أبيض، الرقبة غير عارية من الريش، والأرجل عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية: ثنائي الغرض (لحم وبيض):

متوسط وزن الذكور البالغة 1.7 كغ، والإناث البالغة 1.4 كغ، متوسط العمر عند البلوغ الجنسي 5 أشهر، موسم التناسل في فصل الربيع. يتراوح الوزن عند التلقيح مابين 1.4-1.6 كغ، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً. يتراوح متوسط وزن البيضة مابين 49 - 50 غ، عدد البيض في السنة 120 بيضة، لون قشرة البيضة بني فاتح، متوسط وزن الصوص الذكر 35 غ والصوص الأنثى 30 غ.

تسوق الإناث والذكور بوزن مابين 0.70 - 0.75 كغ وبعمر 56 يوماً، وزن الذبيحة مابين 0.65 - 0.70 كغ بنسبة تصافي 86 % وبنسبة تشافي 71 %.

تقاوم السلالة مرض مارك، النيوكاسل، الكوكسيديا، مايكوبلازما، وجدري الطيور وهي غير محسنة وتستجيب للتحسين الوراثي.

عروق الدجاج والأرانب
في
الجمهورية اليمنيـــة

الدجاج البلدي الجبلي
(محلي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في المناطق الجبلية من اليمن، وانتشرت في مناطق عديدة أهمها: صنعاء، ذمار، عمران، آب، وتعز. نظام الإنتاج منزلي فردي. يتركب القطيع من 50 % منتج و40 % نامي، و9 % أمات، و1 % جدات، نظام التغذية 60 % مخلفات المنازل، و40 % حبوب. ويقدر إعداد الطيور 3.6 مليون طير عام 2008، وهذه السلالة في تزايد مستمر.

الدجاج البلدي الجبلي

الصفات الشكلية:

حجم الجسم صغير، لون الجسم والرأس متعدد الألوان، الرقبة غير عارية من الريش، والأرجل عارية من الريش، العرف جوزي، شحمة الأذن حمراء أو بيضاء.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور البالغة مابين 0.8 - 1 كغ، والإناث البالغة مابين 0.6 - 0.7 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 7 أشهر، الوزن عند التلقيح مابين 0.6 - 0.7 كغ. طول فترة الحضانة للبيض 21 يوماً، وزن الصوص الذكر مابين 35 - 40 غ، والصوص الأنثى مابين 30 - 35 غ، وزن التسويق للذكور مابين 0.6 - 0.7 كغ وللإناث مابين 0.5 - 0.6 كغ، عمر التسويق للذكور والإناث مابين 180 - 210 أيام، معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكور 5 غ، وللإناث 4 غ، نسبة التصافي 75 %. تتأقلم الطيور بشكل جيد في بيئات مختلفة، والسلالة غير محسنة وراثياً.

الدجاج البلدي الساحلي
(محلي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في المناطق الساحلية لبلاد اليمن، وانتشرت في مناطق الحديدة وتعز ولحج وأبين. نظام الإنتاج منزلي فردي. يتركب القطيع من 50 % منتج، و40 % نامي، و9 % أمات، و1 % جدات. نظام التغذية 60 % مخلفات المنازل، و10 % أعلاف مركزة، و30 % أعلاف أخرى. بلغ تعداد السلالة 5.85 مليوناً عام 2008، وهي في تزايد مستمر.

الدجاج البلدي الساحلي في اليمن

الصفات الشكلية:

حجم الجسم متوسط، الجسم والرأس متعدد الألوان، الرقبة غير عارية من الريش، الأرجل عارية من الريش، شحمة الأذن بيضاء، العرف مفرد وأحمر، الذيل مرفوع.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور البالغة مابين 0.9 - 1 كغ والإناث البالغة 0.8 - 0.9 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي مابين 6 - 7 أشهر، موسم التناسل طوال العام. تلقح الإناث بوزن مابين 0.7 - 0.9 كغ، طول فترة حضانة البيض 21 يوماً، متوسط وزن البيضة 35 - 45 غ، عدد البيض في السنة 50 بيضة، لون قشرة البيض أبيض. وزن الصوص الذكر مابين 40 - 45غ والصوص الأنثى 35 - 40 غ، وزن التسويق للذكور مابين 0.7 - 0.9 كغ وللإناث مابين 0.7 - 0.8 كغ، عمر التسويق للذكور مابين 180 - 370 يوماً، وللإناث 180 - 210 يوماً.

معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكور 5 غ، وللإناث 4 غ. يتراوح وزن الذبيحة مابين 0.7 - 0.9 كغ، نسبة التصافي 75 %.

تتأقلم السلالة خارج الموطن الأصلي ومقاومة لمرض النيوكاسل، السلالة غير محسنة وراثياً.

دجاج الجرع
(محلي)

المنشأ والانتشار:

نشأت هذه السلالة في المناطق الجبلية والساحلية من اليمن، وانتشرت في مناطق الحديدة وأب، نظام الإنتاج منزلي فردي. يتركب القطيع من 50 % منتج و40 % نامي، و9% أمات، و1 % جدات. نظام التغذية 60 % مخلفات منازل، و10 % أعلاف مركزة، و30 % أعلاف أخرى. بلغ تعدادها الحالي 40 ألف طير، وهي في تناقص مستمر.

دجاج الجرع

الصفات الشكلية:

حجم الجسم كبير، لون الجسم والرأس رمادي غامق منقط بالأبيض، الرقبة غير عارية من الريش، أما الأرجل فهي عارية من الريش.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور البالغة مابين 0.4 - 1 كغ، والإناث مابين 0.8 - 0.9 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي مابين 7 - 9 أشهر، موسم التناسل في الربيع، الوزن عند التلقيح 0.9 - 1.2 كغ، طول فترة حضانة البيض 27 يوماً. يتراوح متوسط وزن البيضة مابين 20 - 30 غ، أعداد البيض في السنة 50 بيضة، لون قشرة البيضة بني. يتراوح وزن الصوص الذكر مابين 20 - 35 غ، والأنثى 20 - 30 غ، وزن التسويق للذكور 0.7 - 0.9 كغ، وللإناث 0.6 - 0.9 كغ، عمر تسويق للذكور 180 - 310 يوماً، وللإناث 180 - 210 يوماً.

معدل النمو اليومي حتى التسويق للذكور 5 غ، وللإناث 4 غ. يتراوح وزن الذبيحة مابين 0.7 - 0.9 كغ، ونسبة التصافي 75 %. تتأقلم الطيور في بيئات مختلفة ومقاومة لمرض النيوكاسل وهي غير محسنة وراثياً.

الأرنب البلدي
(محلي)

المنشأ والانتشار:

نشأ هذا العرق في اليمن (الموطن الأصلي)، وانتشرت إلى معظم المدن اليمنية، نظام الإنتاج 60 % مزارع قديمة و39 % منزلي و1% مزارع حديثة، حجم القطيع مابين 50 - 200 رأس في نظم الإنتاج المختلفة.

يتركب القطيع النامي من 50 % ذكور، و50 % إناث، والمنتج 20 % ذكور و80 % إناث، نظام التغذية 30 % مخلفات المنازل لفترة 90 - 100 يوم، و10 % أعلاف مركزة لفترة 30 - 40 يوماً، و60 % أعلاف خضراء لفترة 150 - 160 يوماً. ويتراوح التعداد الحالي 5 - 10 آلاف، وهي في تزايد مستمر.

الأرنب البلدي

الصفات الشكلية:

حجم الجسم والرأس متوسط، لون الجسم والرأس متعدد الألوان، لون الأعين أحمر أو عسلي، الآذان طويلة نسبياً ومنتصبة، مقطع الجسم مستقيم، الفروة ناعمة.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الجسم للذكور البالغة 1.2 كغ وللإناث البالغة 1.1 كغ، العمر عند البلوغ الجنسي 4.5 - 6 أشهر، عدد المواليد في البطن 4 - 6 مولوداً، الفترة بين الولادتين شهران. يتراوح وزن المواليد الذكور والإناث مابين 25 - 35 غ، وزن التسويق عند الذكور والإناث 0.8 - 1 كغ، معدل النمو اليومي حتى التسويق مابين 10 - 20 غ، عمر التسويق مابين 180 - 240 يوماً، وزن الذبيحة مابين 0.6 - 0.7 كغ، نسبة التصافي 45 %.

تتأقلم السلالة خارج موطنها الأصلي وهي غير محسنة وراثياً.

عروق وســـلالات الماعز
في الدول العربيـــة

عروق ماعز المنتشرة في أكثر من دولة عربية

الماعز الشامي

يعد الماعز الشامي من أشهر سلالات الماعز العربية، ويعرف في كثير من المراجع بالماعز الدمشقي Damascus Goat. وهي سلالة نقية تمثل أحد فروع الماعز النوبي، الذي يشمل الماعز الشامي والزرايبي الجمناباري وغيرها، ويمتاز بالتأقلم خارج الموطن الأصلي والاستجابة للتحسين الوراثي، وفيه ظاهرة الأمومة جيدة، وهو جيد المقاومة نسبيا للأمراض.

اهتم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بهذه السلالة لتميزها الإنتاجي، فأنشأ محطة خاصة للحفاظ عليها في موطنها الأصلي والعمل على تحسينها الوراثي في سبيل نشر الحيوانات المحسنة منها إلى أكبر قدر من الدول العربية سواء على شكل حيوانات حية (ذكور وإناث)، أوعلى شكل قشات سائل منوي مجمد من الذكور النخبة.

ذكر الماعز الشامي

المنشأ والانتشار:

نشأ في غوطة دمشق في الجمهورية العربية السورية حيث يتوفر العلف والماء والظل، وينتشر أيضاً في لبنان وفلسطين والعراق وقبرص، وأدخل إلى ليبيا والكويت ومصر والبحرين والسعودية وقطر، وغيرها من الدول العربية وغير العربية. قدرت أعداده في سورية عام 2008 بنحو 43.8 ألف رأس، وتتم رعايته في نظم الرعاية شبه المكثفة أو المكثفة.تبلغ نسبة الذكور النامية 10 %، والإناث النامية 30 %، والذكور تامة النمو 5 % والإناث تامة النمو 55 % في القطيع النموذجي.

الصفات الشكلية:

لون الجسم دبسي غالباً أو أسود أو أبيض مختلط مع الدبسي وله علامات فارقة كالدماليات (العنابات)●، والعيون الواسعة البيضاء أو العسلية، والبؤبؤ الكحلي. الرأس متوسط الحجم والمقطع محدب (قصبة الأنف محدبة) بوضوح وتتواجد القرون في الإناث والذكور بشكل نادر، والآذان متدلية وطويلة.

يبلغ ارتفاع الجسم (الغارب) في الذكور 81 - 88 سم، وفي الإناث 69 - 79 سم، وطول الجسم المستقيم 84 - 95 سم و78 - 90 سم للذكور والإناث على التوالي. الذيل قصير، و الشعر نصف ناعم ، وطول الخصلة نحو 5 - 10 سم حسب الموقع في الجسم.

أنثى الماعز الشامي

الصفات الإنتاجية :

يتبع لمجموعة الماعز كبير الحجم، وتصنف هذه السلالة بأنها متخصصة بإنتاج الحليب، ويتراوح إنتاجها من الحليب بين 300 - 800 كغ في موسم إدرار طوله 175 - 300 يوم، ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي 3 كغ بنسبة جوامد كلية صلبة 13 %، و دهن 4.1 %، و بروتين 3.1 %، ولاكتوز 4.3 %.

يتراوح وزن الذكور تامة النمو بين 70 - 80 كغ، والإناث تامة النمو بين 60 - 70 كغ. تبلغ الذكور جنسيا بعمر 4 - 6 أشهر، والإناث بعمر 3 - 5 اشهر، ويمتد موسم التناسل من شهر آب/أغسطس حتى تشرين الأول/أكتوبر، ويبلغ متوسط وزن الإناث عند أول تلقيح 40 كغ، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 12 - 24 شهراً، ويبلغ معدل المواليد 160 - 176 %، ونسبة الولادات التو أمية 60 - 70 % والفترة بين ولادتين 10.5 - 12 شهراً.

يبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور الفردية 4.1 كغ، وللمواليد الإناث الفردية 3.5 كغ، ومتوسط وزن الفطام 15.2كغ للذكور و 14.3 كغ للإناث، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام 170 غ للذكور و 157غ للإناث.

ويبلغ وزن التسويق 40 - 50 كغ عند عمر 200 - 300 يوم، ويتراوح معدل النمو اليومي حتى التسويق بين 100و150 غ للذكور والإناث والذكور، ويبلغ وزن الذبيحة 40 - 50 كغ بنسبة تصافي 50 % ونسبة تشافي 35 %.

- الدواليات (العنابات): هي زوائد لحمية في أسفل العنق (الرقبة) ولها أسماء مختلفة العنابات، الشرابات، الحلق، الأقراط، لقط، تراكي، الزلمتان تبعاً للدولة.

الماعز البربري

المنشأ والانتشار:

نشأ الماعز البربري في سلطنة عمان وقطر، وانتشر في السعودية والإمـارات، كما أدخل إلى دولة الكويت ومملكة البحرين.

أنثى ماعز بربري في دولة الكويت



مولود فتي من الماعز البربري في مملكة البحرين

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود أو بني مبقع بالكريمي، والرأس صغير، والوجه إما أسود اللون أو كريمي أو مبقع باللونين، والقوائم قصيرة، والذيل قصير، والآذان قصيرة ومنتصبة والقرون معدومة عند الذكور والإناث.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو بين 38 - 40 كغ، والإناث بين 32 - 35 كغ، والعمر عند أول تلقيح بين 12 - 15 شهراً، ويبلغ معدل الولادات 140 مولوداً لكل 100 عنزة.

يبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 2.5 كغ، وللإناث 2 كغ، ومتوسط وزن الذكور المفطومة 13كغ، والإناث المفطومة 11 كغ بعمر وسطي 3 أشهر، وتسوق الحيوانات للذبح بوزن 15 كغ.

ينتج الحيوان اللحم والحليب، ويتراوح إنتاج العنزة من الحليب بين 108 - 140كغ في موسم متوسط طوله 150 يوماً، وتبلغ نسبة الدهن 3.6 %، والبروتين 3.8 %.

عروق الماعز
في
المملكة الأردنية الهاشمية

الماعز البلدي الأردني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه جبلي، ويسمى محلياً بالماعز الجبلي أو البلدي، وينتشر في المناطق الجبلية الداخلية الجافة، والهضاب والسهوب من الهلال الخصيب وشمال شرق شبه الجزيرة العربية.

يعيش على المراعي في نظام الإنتاج شبه الواسع وعلى الزراعات الرعوية الريفية المستقرة في نظام الإنتاج شبه المكثف.ويبلغ متوسط حجم القطيع النقي 44 رأساً، والقطيع الخليط مع الأغنام 66 رأساً، عندما تكون نسبة الماعز 45 %، و173رأساً لقطعان الخليط مع الأغنام، عندما تكون نسبة الماعز 3 %. يمتاز بمقاومته للحرارة والبرودة والظروف المناخية القاسية، ويتكيف مع المرتفعات والهضاب البازلتية، وهو مقاوم للأمراض والطفيليات، وهو معتدل الوداعة وسريع الحركة.

ذكر الماعز البلدي الأردني

الصفات الشكلية:

اللون أسود غالباً أوالأسود المبقع بالأبيض أو مخطط الوجه وأسفل البطن، والقوائم باللون الأحمر الطحيني أحياناً، والأبيض أو الأحمر نادراً، لون الآذان أسود أو منقش بالأبيض، وهي طويلة وعريضة ومتدلية غالباً وقصيرة أحياناً وأثرية نادراً، الرأس صغير الحجم وقصبة الأنف مستقيمة في الإناث ومحدبة قليلاً في الذكور، الجبهة وقمة الرأس محدبة، والمخطم مستدق. الجسم مندمج، والشعر خشن وطويل. ارتفاع الذكور تامة النمو 60 - 75 سم، والإناث 48 - 55 سم.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الذكور التامة النمو 49.4 كغ، والإناث 34.3 كغ، وعمر البلوغ الجنسي 6 - 7 أشهر، والعمر عند أول تلقيح 14 - 17 شهراً غالباً، وأحياناً 7 - 8 أشهر، والعمر عند الولادة الأولى 19 - 22 شهراً غالباً، وأحياناً 12 - 13 شهراً. تصل نسبة التوائم إلى 23 - 43 % وتتراوح الفترة بين ولادتين 6 - 11 شهراً.

يبلغ متوسط وزن المواليد الذكور والإناث 3.5 كغ، متوسط وزن الذكور المفطومة 12.2 كغ، والإناث المفطومة 10.8 كغ، ويبلغ متوسط معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام 116غ للذكور و98 غ للإناث، ومتوسط وزن الحيوانات عند التسويق 27 كغ بعمر 8 - 12 شهراً. تنتج حيوانات هذه السلالة اللحم، الحليب، الشعر والجلود. ويتراوح إنتاج الحليب بين 78 - 179 كغ في موسم طوله 186 - 220 يوماً، ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الحليب 0.5 - 0.9 كغ.ويبلغ متوسط وزن الشعر المقصوص 850 غ للرأس، ويتراوح طول الخصلة بين 15 - 22 سم، وقطر الشعرة 40 - 55 ميكروناً.

ذكر الماعز البلدي الأردني

عروق الماعز
في
دولة الإمارات العربيـة المتحدة

الماعز الخالدي

المنشأ والانتشار:

منشؤه المملكة العربية السعودية، وينتشر في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، ويعيش بنظام إنتاجي شبه مكثف في المزارع المستقرة، ويتغذى على الأعلاف المركزة والخضراء، ويتركب القطيع من 12 % ذكور و88 % إناث، وقدرت أعداده بنحو 3.7 ألف رأس عام 2008، ويمتاز بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وهو محسن وراثياً وتم خلطه بالشامي، وظاهرة الأمومة عنده جيدة.

الماعز الخالدي

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه متباين بين البيج والبني الفاتح، والرأس متوسط الحجم، وقصبه الأنف مستقيمة، والآذان متدلية وطويلة، والقرون متواجدة في الذكور فقط، والجسم متوسط الحجم، يبلغ ارتفاعه عند الكتف 70 - 78 سم للذكور و57 - 66 سم للإناث، طول الجسم المستقيم عند الذكور 75 - 80 سم، وعند الإناث 60 - 83 سم، والذيل قصير، والشعر نصف ناعم.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح متوسط وزن الذكور التامة النمو مابين 60 - 100 كغ، والإناث 45 - 60 كغ. العمر عند البلوغ 3 - 5 أشهر للإناث، 4 - 6 أشهر للذكور، وتلقح الإناث بوزن بين 28 - 40 كغ، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 24 - 30 شهراً، والفترة بين ولادتين 8 أشهر، وتصل نسبة التوائم حتى 77 %.

يبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 4 كغ، وللإناث 3.5 كغ، ووزن الذكور المفطومة 13 كغ والإناث المفطومة 12 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 100غ، وللإناث 94 غ. تصل نسبة التصافي إلى 45 %، بالإضافة لإنتاج اللحم، فإن الإناث تنتج الحليب، ويتراوح إنتاج العنزة من الحليب بين 120 - 150كغ في موسم إدرار متوسط طوله 60 يوماً، ويتراوح إنتاج الحليب اليومي بين 2 - 2.5 كغ. ويبلغ متوسط وزن قصة الشعر (الفروة) الخام 2.5 كغ، والمغسول 2 كغ وطول الخصلة 15 - 20 سم.

الماعز الخالدي

الماعز العربي (محلي)

المنشأ والانتشار:

نشأ في الإمارات العربية المتحدة، وانتشر إلى مناطق عديدة منها العين، دبي، رأس الخيمة، والمنطقة الوسطى، ويربى في نظام الرعاية شبه المكثف، ويتغذى على المراعي بنسبة 10 % وعلى المواد العلفية المركزة بنسبة 50 %، وعلى المواد الخشنة بنسبة 40 %، ويتركب القطيع من 15 % ذكور، و 85 % إناث، بلغ تعداد الحيوانات 52 ألف رأس عام 2008، وهو في تزايد مستمر، ويمتاز بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، كما يمتاز بظاهرة الأمومة وهو حساس للأمراض.

الماعز العربي (محلي)

الصفات الشكلية:

لون الحيوانات أسود غالباً ولكن هناك حيوانات بلون بني وأحمر وأبيض أيضاً، والجسم متوسط الحجم، والرأس أيضاً متوسط الحجم ومقطع الأنف مستقيم، وتتواجد القرون في الجنسين وهي سيفية متجهة للخلف، والآذان قصيرة ومنتصبة. متوسط ارتفاع الجسم عند الذكور 75 سم وعند الإناث 50 سم، ويتراوح طول الجسم المستقيم للذكور بين 80 - 120 سم، وللإناث 65 - 80 سم، والذيل قصير وملفوف للأعلى.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح العمر عند البلوغ بين 6 - 8 أشهر، وتلقح الإناث لأول مرة بوزن 25 - 35 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 15 شهراً، والفترة بين ولادتين 8 أشهر، ويتراوح معدل الولادات بين 80 - 90 %، وتصل نسبة التوائم الى 4 %.

متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور والإناث 1.3 كغ، وتفطم الذكور بوزن 9 كغ، والإناث بوزن 8 كغ. العمر عند التسويق 120 يوماً، ويتراوح وزن التسويق بين 18 - 26 كغ، ويتراوح وزن الذبيحة بين 14 - 20 كغ، ونسبة تصافي الذبيحة 45 %ونسبة التشافي 41 %.

بالإضافة لإنتاج اللحم فان العنزات تنتج الحليب بكميات قليلة، ويقدر إنتاج الحليب اليومي بنحو 1 كغ، في موسم إدرار طوله 60 - 80 يوماً. يبلغ متوسط وزن قصة الشعر الخام 2.25 كغ، والمغسول 1.8 كغ، والشعر نصف ناعم.

الماعز المحلي (عوارض، رماح)

المنشأ والانتشار:

ذكر أن مشأه سورية، وهو يشابه الماعز العارضي الذي نشأ في نجد، وأدخل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وانتشر فيها، وفي دول الخليج وبلاد الشام، ويعيش تحت نظام الرعاية شبه المكثف، حيث يتغذى على المراعي والمركزات. بلغ تعداده 18.7 ألف رأس عام 2008 وهو في تزايد مستمر.

يمتاز بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي كما يمتاز بظاهرة الأمومة وهو يستجيب للتحسين الوراثي إلا أنه غير محسن حتى الآن، وهو حساس للأمراض التنفسية.

الماعز المحلي (عوارض، رماح)

الصفات الشكلية:

لون هذه الحيوانات أسود قاتم، الرأس متوسط الحجم ومقطع الأنف مستقيم، وتنمو العنابات (الداليات) تحت الرقبة، والآذان بيضاء أو رمادية اللون وهي طويلة ومتدلية، ويقتصر وجود القرون على الذكور. يتراوح ارتفاع الغارب عند الذكور بين 75 - 80 سم، وعند الإناث 60 - 72 سم، وطول الجسم المستقيم 75 - 82 سم عند الذكور، و60 - 70 سم عند الإناث. الذيل طويل، والشعر كثيف ونصف ناعم.

الصفات الإنتاجية:

الحيوانات كبيرة الحجم، ويتراوح وزن الجسم عند الذكور التامة النمو بين 70 - 110 كغ، والإناث 50 - 60 كغ. العمر عند البلوغ 4 - 6 أشهر، وتلقح الإناث بوزن 30 - 40 كغ، العمر عند الولادة الأولى 1.5 - 2 سنة، ويبلغ معدل الولادات 80 - 94 %، ونسبة التوائم 75 %. ومتوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 4 كغ، وللمواليد الإناث 3.5 كغ، ووزن الذكور المفطومة 13 كغ والإناث المفطومة 12 كغ بعمر 60 يوماً. تبلغ نسبة تصافي الذبيحة 50 %، ونسبة التشافي 40 %. ينتج هذا الماعز اللحم والحليب، ويقدر الإنتاج اليومي للعنزة من الحليب بنحو 2.5 كغ في موسم إدرار طوله 60 يوماً. كما ينتج الحيوان الشعر نصف الناعم حيث يبلغ وزن قصة الشعر الخام 2.8 كغ، والمغسولة 2 كغ.

عروق الماعز
في
مملكـة البحرين

الماعز التهامي

المنشأ والانتشار:

منشؤه ساحل البحر الأحمر وسلطنة عمان، وانتشر إلى مملكة البحرين وهو يتأقلم بشكل جيد في البيئات المحلية.

الماعز التهامي في مملكة البحرين

الصفات الشكلية:

لون الجسم أحمر (دبسي) أو بني فاتح والقوائم والبطن ذات لون أحمر ومشوب ببقع بيضاء، والذيل قصير، والجسم مندمج، والقرون قصيرة متجهة للخلف عند الإناث، وكبيرة عند الذكور، والآذان قصيرة، ولهذه الحيوانات خصلة من الشعر أسفل الذقن.

الصفات الإنتاجية:

حجم الحيوانات صغير والشعر ناعم وقصير واللحم ممتاز النوعية.

الماعز الصومالي
(الفرور)

المنشأ والانتشار:

نشأ في كينيا والصومال، وادخل إلى مملكة البحرين وانتشر فيها وهو جيد التأقلم في بيئات مختلفة.

الماعز الصومالي في مملكة البحرين

الصفات الشكلية:

لون الحيوانات أبيض غالباً، ولكن يمكن أن تتواجد ألوان أخرى في القطيع. الرأس صغير، والأنف مستقيم، والآذان قصيرة ومنتصبة، والقرون خنجرية متوسطة الطول، وموجودة لدى الجنسين، والذيل قصير وملتف للأعلى، وتمتاز هذه الحيوانات بنمو خصلة شعر أسفل الذقن.

الصفات الإنتاجية:

العرق بشكل عام صغير الحجم، الجسم مكتنز باللحم وينتج لحماً بنوعية ممتازة، والشعر قصير وناعم.

الماعز العربي المحلي

المنشأ والانتشار:

نشأ في شبه الجزيرة العربية، وتتم رعايته غالباً تحت النظام التقليدي، كما تكثر رعايته في المزارع الصغيرة والمنازل في مملكة البحرين، ويمتاز بتحمله لدرجات الحرارة العالية وهو مقاوم للأمراض.

الماعز العربي المحلي

الصفات الشكلية:

لون الحيوانات أسود غالباً وقد تكون عسلية أو بيضاء أحياناً، الجسم مندمج والقرون موجودة في الذكور والإناث، ومقطعها نصف دائري ومعقوفة للخلف في الإناث، وقد تكون حلزونية في الذكور، أما الآذان فهي بيضاء أو رمادية اللون متدلية طويلة، والبعض منها قصير، وشعر الحيوانات طويل وخشن.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور والإناث 40 كغ بعمر سنة، ومتوسط معدل النمو اليومي 200 غ. بالإضافة لإنتاج اللحم فإن الحيوان ينتج الحليب بكميات جيدة، حيث تنتج الأنثى يومياً 3 كغ بشكل وسطي، في موسم إدرار طوله 120 - 150 يوماً.

ماعز كراتشي
(جمنباري)

المنشأ والانتشار:

نشأ في الهند وباكستان، ثم أدخل إلى مملكة البحرين وانتشر فيها.

ماعز كراتشي في مملكة البحرين

الصفات الشكلية:

الحيوانات متعددة الألوان إلا أن اللون الغالب هو الأبيض أو البني مع بقع في الرأس والرقبة، الآذان عريضة ومتدلية وطويلة جداً تصل إلى 27 سم، وللذكور والإناث قرون حلزونية متجهة إلى الأعلى والخلف.

الصفات الإنتاجية:

الحيوانات كبيرة الحجم نسبياً، ويبلغ متوسط وزن العنزة 38 كغ، والتيس 45 كغ. تسوق الحيوانات بعمر سنة وبوزن 30كغ لإنتاج اللحم. يبلغ متوسط إنتاج الحليب في الموسم 202 كغ في الموطن الأصلي بموسم إدرار متوسط طوله 191يوماً.

عروق الماعز
في
الجمهورية التونسـية

الماعز البلدي التونسي

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي في الجبال شبه الصحراوية الأطلسية، ويسمى محلياً بماعز البربر أو العربي أو ماعز الوسط، وينتشر في تونس والجزائر والمغرب، ويعيش تحت نظام الرعاية السرحي، وشبه المكثف في المزارع والريف المستقر، ويتراوح حجم القطيع بين 200 - 500 رأس للنظامين، وتبلغ الحيازة العائلية 2 - 10 رؤوس في النظام شبه المكثف الريفي و3 - 5 رؤوس في الماعز المنزلي المقيد، ويتركب القطيع حسب الجنس من 75 - 80 % إناث و20 - 25 % ذكور، وحسب العمر 80 - 85 % أكبر من سنة و15 - 20 % أصغر من سنة، وتنتشر في كافة أنحاء الجمهورية التونسية، ويبلغ عددهانحو 1.272 مليون رأس عام 2008، وهي تشكل نحو 85 % من إجمالي قطيع الماعز في تونس، ويمتاز هذا الماعز بالطباع المعتدلة، وهو متوسط المقاومة للجفاف والحرارة والأمراض والطفيليات، واستجابته للتهجين مع السلالات الأخرى جيدة، وكانت أفضل النتائج مع ماعز الألبين الفرنسي.

ذكر الماعز البلدي التونسي

أنثى الماعز البلدي التونسي

الصفات الشكلية:

اللون أسود غالباً والأبيض أو البني أو المبرقش أحياناً، والرأس متوسط الحجم وقصبة الأنف مستقيمة، والآذان متوسطة الطول إلى طويلة، والقرون متواجدة في الجنسين وهي طويلة وغليظة لولبية في الذكور، ومنحنية للخلف وإلى الجانب قليلاً بشكل منجلي في الإناث، العنابات متواجدة في معظم الحيوانات، الجسم مندمج ومتناسق، الشعر متوسط الطول.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور التامة النمو 31.5 كغ، والإناث 26.6 كغ، ويتراوح عمر البلوغ بين 5 - 6 أشهر في الظروف الجيدة، و12 شهراً في الظروف الجافة، ويبلغ متوسط الوزن عند التلقيح الأول 26.6 كغ. العمر عند الولادة الأولى 12 شهراً في الظروف الجيدة و17 شهراً في الظروف الجافة، وتتراوح نسبة التوائم بين 36 - 72 %، والفترة بين ولادتين 8 أشهر.
موسم التلقيح الأول خريفي بين شهر تموز/يوليو وكانون أول/ديسمبر، والموسم الثاني شتوي بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وتبقى الذكور مع الإناث على مدار العام، ويخصص ذكر لكل 20 - 50 عنزة.
يتراوح وزن الميلاد للمواليد الذكور بين 1.73 - 2.21 كغ، وللمواليد الإناث بين 1.6 - 2.06 كغ حسب نوع الولادة، ويتراوح

وزن الذكور المفطومة بين 9.1 - 11.4 كغ، والإناث المفطومة 7.5 - 9.8 كغ، ويبلغ متوسط المعدل اليومي للنمو من الميلاد حتى الفطام 90 غ للذكور، و75 غ للإناث.

يتراوح وزن الذبيحة بين 19.7 - 27.8 كغ وبنسبة تصافي 45.1 % بعمر 24 شهراً، وينتج الحيوان بالإضافة إلى اللحم الحليب والشعر والجلود، ويتراوح إنتاجه من الحليب بين 70 - 150 كغ، في موسم إدرار متوسط طوله 190 - 240 يوماً، ويتراوح متوسط الإنتاج اليومي من الحليب بين 1.1-1.7 كغ، ومتوسط وزن قصة الشعر 0.6 كغ للذكور و(.35 كغ للإناث.

الماعز البلدي التونسي الصحراوي (النوبي)

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي من الجبال الصحراوية، ويسمى محلياً بالصحراوي، وماعز الجنوب أو الماعز النوبي، وينتشر في المناطق الجنوبية الصحراوية من تونس، وبلغ عدده 149.629 ألف رأس عام 2008 مشكلاً نسبة 10 % من إجمالي الماعز التونسي.

الماعز النوبي

الصفات الشكلية:

متباين الألوان، ومظهره العام مرتفع، ولا توجد قرون في الجنسين، وتوجد العنابات في أكثر من 50 % من الحيوانات، وشعر الفروة قصير على الجسم وطويل على الأرباع.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو بين 50 - 60 كغ، والإناث بين 40 - 50 كغ، وتلقح الإناث لأول مرة بعمر 18 شهراً، وتبلغ الفترة بين ولادتين 8 أشهر.

يبلغ وزن الشعر الناتج من الذكور 0.6 كغ، ومن الإناث 0.3 كغ، ويبلغ متوسط إنتاج العنزة من الحليب نحو 250 كغ في الموسم.

الماعز المالطي التونسي

المنشأ والانتشار:

منشؤه من الماعز المالطي والذي نشأ أصلاً من الماعز الشامي ونقله الفينيقيون إلى جزيرة مالطا حيث انعزل واتخذ طابعه البيئي، ويسمى محلياً ماعز الشمال ، وينتشر في كافة المناطق الساحلية قرب المدن التونسية، ويعيش تحت نظام الرعاية شبه المكثف في المزارع العائلية، وبلغ عدده 67.33 ألف رأس عام 2008 ويشكل 4.5 % من إجمالي أعداد الماعز في تونس. ويمتاز بالوداعة والطبع الهاديء، ولكنه ضعيف المقاومة للجفاف والحرارة والأمراض والطفيليات.

الماعز المالطي التونسي

الصفات الشكلية:

اللون أحمر أو بني مصفر إلى بني غامق غالباً، والأسود والأبيض والرمادي المبقع أحياناً. الرأس طويل ونحيل، وقصبة الأنف مستقيمة أو محدبة قليلاً في الذكور، والآذان متوسطة الطول 14-17 سم والعرض 6 - 8 سم وتكون متدلية أو شبه أفقية، القرون طويلة ونحيفة بشكل المنجل أو ملتفة نادراً، العنابات متواجدة في الجنسين، والجسم طويل وضيق، والشعر قصير على الرقبة وطويل في الأرباع الخلفية، والضرع كبير الحجم وجيد التكوين. يبلغ الارتفاع عند الكتف 77 - 81 سم للذكور و59 - 63 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو بين 50 - 60 كغ، والإناث 40 - 50 كغ، وتلقح الإناث لأول مرة بعمر 18 شهراً، وتبلغ الفترة بين ولادتين 12 شهراً، ومتوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 2.2 - 2.9 كغ، وللمواليد الإناث 2.1 - 2.4 كغ.

يصنف من سلالات الحليب، ويقدر إنتاج العنزة من الحليب في الموسم بنحو 400 كغ.

عروق الماعز
في
الجمهوريـــة الجزائرية
الديمقراطية الشعبية

الماعز البلدي الجزائري

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي من الجبال الصحراوية، ويسمى محلياً الماعز العربية، وينتشر في المناطق الجافة شمال إفريقيا، ونظام إنتاجه واسع ومتنقل في المراعي، أو نظام شبه واسع وشبه متنقل، وشبه مكثف في النظام الزراعي الرعوي الريفي المستقر، ويتركب القطيع من ناحية العمر من 69.3 % بعمر أكبر من سنتين و30.7 % بعمر أقل من سنتين، وبلغت أعداده 2.66 مليون رأس عام 2008 ويشكل نحو 65.6 % من إجمالي أعداد الماعز في الجزائر.

الماعز البلدي الجزائري

الصفات الشكلية:

اللون أسود غالباً مع وجود اللون الطحيني أو الأحمر أسفل البطن والقوائم وعلى الوجه بشكل خطوط أحياناً واللون الأبيض أو البني أو خليط الأسود والبني (الأسمر) والأسود المبقع بالأبيض أحياناً، قصبة الأنف مستقيمة، والآذان متوسطة الطول وعريضة، والقرون في الجنسين متوسطة الطول والسماكة وملتفة حلزونياً باتجاه الخلف عند الذكور، والجسم متوسط الحجم، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الكتف 50 - 55 سم عند الإناث، و56 - 70 سم عند الذكور، والشعر خشن وطويل.

الصفات الإنتاجية:

العمر عند الولادة الأولى 15 - 17 شهراً، وحجم البطن 1 - 2 مولود، ويمتد موسم التلقيح الخريفي خلال شهري تشرين أول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، بينما يمتد موسم التلقيح الربيعي خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.

ينتج الحيوان الحليب واللحم والشعر والجلود، ويقدر إنتاج العنزة من الحليب بين 60 - 120كغ في موسم إدرار طوله 90 - 120 يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي من الحليب بين 1 - 1.3كغ.

الماعز البلدي الجزائري الصحراوي

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي شبه صحراوي وصحراوي في الجزائر، ويسمى محلياً ماعز الوسط أو المكاتبة، وينتشر في الأغواط والوسط الشمالي، وقدرت أعداده بنحو 250 ألف رأس عام 2008، ويشكل حوالي 6.2 % من إجمالي أعداد الماعز في الجزائر.

الماعز البلدي الجزائري الصحراوي

الصفات الشكلية:

اللون رمادي أو أبيض أو أسمر (أسود غامق)، والرأس متوسط الحجم، والآذان طويلة ومتدلية، والقرون غائبة غالباً وموجودة أحياناً في الذكور حيث تكون طويلة ومنحنية للخلف، واللحية قصيرة، والعنابات موجودة غالباً، والمظهر العام متوسط إلى كبير الحجم، والشعر قصير ناعم و طري.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الذكور التامة النمو 60 كغ، والإناث 40 كغ، والعمر عند أول ولادة 15 - 17 شهراً، وحجم البطن 1 - 2 مولوداً. يتراوح متوسط وزن المواليد الإناث والذكور بين 2 - 3 كغ. بالإضافة لإنتاج اللحم يعد من الحيوانات المنتجة للحليب بكميات جيدة، إذيتراوح إنتاج العنزة من الحليب بين 178 - 256 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 178 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي من الحليب 1 - 2 كغ.

الماعز البلدي الجزائري الواحاتي
(المزابيه، الجزائري الأحمر)

المنشأ والانتشار:

منشؤه من الجبال الواحاتية، يسمى محلياً المزابيه ، و توغورت، والجزائري الأحمر، ويعيش تحت النظام التقليدي السرحي المتنقل أو شبه المكثف والمز رعي المستقر، وقدرت أعداده بنحو 78 ألف رأس في عام 2008 ويشكل 1.9 %من أعداد الماعز في الجزائر.

الماعز البلدي الجزائري الواحاتي

الصفات الشكلية:

اللون أحمر شاحب غالباً والأسود والأبيض أحياناً مع وجود حلقة سوداء حول الرقبة في معظم الأفراد، والرأس صغير، والآذان طويلة متدلية، والقرون متوسطة الطول منحنية للخلف، والمظهر العام متوسط الحجم، و الشعر قصير.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الذكور التامة النمو 50 كغ، والإناث 35 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 15 - 17 شهراً، ويبلغ حجم البطن 2 - 3 مولوداً، ويمتد موسم التلقيح الخريفي خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، وموسم التلقيح الربيعي خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو. بالإضافة لإنتاج اللحم فان هذه السلالة تصنف من السلالات المنتجة للحليب، حيث يتراوح إنتاج العنزة بين 320 - 639 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 213 يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي للعنزة من الحليب بين 1.5 - 3 كغ.

الماعز الجبلي الجزائري

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي من جبال الأطلس، ويسمى محلياً بالماعز القبائلية أو ماعز الشمال، وينتشر في الجبال الساحلية، ويعيش تحت نظام الرعاية السرحي، وفي المزارع تحت نظام الرعاية شبه المكثف، وقدرت أعداده بنحو 1.064 مليون رأس عام 2008، مشكلاً نحو 3. 26 % من إجمالي عدد الماعز في الجزائر.

الماعز الجبلي الجزائري

الصفات الشكلية:

اللون أسود أو أشقر أو أبيض أو خلائطها، رأسه نحيف، والآذان طويلة، والقرون في الجنسين متوسطة الطول والسماكة وملتفة حلزونياً للخلف والأمام في الذكور ونحيفة ومتجهة للخلف غالباً في الإناث، والجسم متوسط الحجم والارتفاع عند الكتف 56 - 70سم للذكور و 50 - 55 سم للإناث، والشعر طويل نسبياً.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو بين 45 - 60 كغ، والإناث 30 - 45 كغ، ويبلغ العمر عند أول ولادة 13 - 15 شهراً، يبدأ موسم التلقيح الخريفي في شهر تشرين الأول/أكتوبر ويمتد حتى تشرين الثاني/نوفمبر، أما موسم التلقيح الربيعي فيبدأ في شهر نيسان/أبريل ويمتد حتى شهر أيار/مايو، ومتوسط وزن المواليد الإناث والذكور 1.4 - 2.5 كغ، وحجم البطن 1 - 2 مولوداً.

تنتج الحيوانات الحليب واللحم والشعر والجلد، ويتراوح إنتاج العنزة من الحليب بين 75 - 120 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 150يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي بين 0.5 - 0.8 كغ حليب.

عروق الماعز
في
المملكـة العربية السعودية

الماعز البلدي السعودي
(الحجازي)

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنه نشأ في المملكة العربية السعودية من جبال السروات، وينتشر في المناطق الجنوبية من المملكة ويدعى الحجازي، ويعيش بشكل سرحي وشبه مكثف ويتغذى على المراعي بنسبة 50 % وعلى بقايا المحاصيل بنسبة 50 %، ويتراوح حجم الحيازة بين 30 - 150 رأســـاً، وتتركب القطعان حسب العمر من 37.7 % بعمر أقل من ســـنة (23.4 % إناث و14.3 % ذكور) و 62.3 % أكبر من سنة (57 % إناث و 5.3 % ذكور)، وقدرت أعداده بنحو 1.245 مليون رأس عام 2008، وهو في تناقص، ويتأقلم هذا الماعز خارج موطنه الأصلي، ويقاوم الجفاف والأمراض.

الماعز البلدي السعودي (الحجازي)

الصفات الشكلية:

الجسم والوجه ملون إلا أن اللون السائد هو البني، والرأس متوسط الحجم، والقرون خنجرية متوسطة الطول تتواجد في الذكور والإناث، وآذانه منتصبة وقصيرة. يتراوح طول الجسم المستقيم للذكور بين 85 - 95 سم وللإناث بين 75 - 85 سم للإناث، أما طول الجسم المائل فيتراوح للذكور بين 80 - 95 سم وللإناث بين 75 - 85 سم، والذيل قصير، والشعر نصف ناعم.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الحيوان التام النمو بين 35 - 45 كغ للذكور و 25 - 35 كغ للإناث، ويبلغ متوسط العمر عند البلوغ 10أشهر، وعند الولادة الأولى 17.5 شهر، وتصل نسبة التوائم إلى 50 %، والفترة بين ولادتين 7.5 شهر، ويتراوح متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور بين 2 - 3 كغ وللمواليد الإناث بين 1 - 2كغ، ويبلغ متوسط وزن الفطام 10 كغ للذكور والإناث، وتفطم المواليد بعمر 3 - 4 أشهر، ويبلغ معدل النمو اليومي بين الميلاد والفطام 75 - 85 غ، يبلغ وزن القصة من الشعر بالمتوسط 0.5 كغ ويستخدم في صنع الخيام، بالإضافة إلى إنتاج اللحم فإن الحيوان ينتج الحليب، ويقدر إنتاج العنزة من الحليب بين 70 - 150 كغ في موسم طوله 4 - 7 أشهر، ويصنع السمن من حليبه.

الماعز البلدي السعودي (الحجازي)

الماعز التهامي السعودي

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه منطقة تهامة ويسمى محلياً بيشي، وينتشر في المنطقة الجنوبية من المملكة، وهو يعيش تحت نظام الرعاية السرحي، ونظام الرعاية شبه المكثف، ويتغذى بنسبة 40 % على المراعي و60 % على مخلفات المحاصيل، وهو في تزايد، ويمتاز هذا الحيوان بتأقلمه خارج الوطن، وهو قابل للتحسين الوراثي.

الماعز التهامي السعودي

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض، ورأسه متوسط الحجم، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، ومقطع الأنف مستقيم وآذانه منتصبة وقصيرة. يبلغ ارتفاع الجسم للذكور البالغة 65 - 74 سم وللإناث 60 - 68 سم، وطول الجسم المستقيم 70 - 75 سم للذكور و 65 - 70 سم للإناث، ويتراوح طول الجسم المائل بين 75 - 80 سم للذكور و65 - 75 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم للذكور التامة النمو بين 40 - 50 كغ، وللإناث 25 - 35 كغ، ويبلغ متوسط عمر الذكور والإناث عند البلوغ 7 أشهر وتلقح الأنثى بوزن 20 كغ، ويبلغ العمر عند الولادة الأولى نحو 12 شهراً، وتصل نسبة التوائم الى 80 %، وتبلغ الفترة بين ولادتين 7.5 شهر.

يتراوح وزن الميلاد للمواليد الذكور بين 1 - 2 كغ، وللإناث بين 0.7 - 1.5 كغ، ويبلغ متوسط وزن الذكور المفطومة 8 كغ، والإناث 7 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام 110 غ للذكور و95 غ للإناث.

تسوق الحيوانات بوزن 15 كغ وبعمر 180 يوماً، بالإضافة لإنتاج اللحم فان الماعز التهامي السعودي ينتج الحليب، ويبلغ إنتاجه من الحليب 49 - 95 كغ بموسم إدرار طوله 150 يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي بين 0.3 - 0.65 كغ من حليب.

الماعز الدرعي السعودي الصحراوي
(الحبصي السعودي)

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي، ويسمى محلياً بالحبصي، و الحبشي، والأريتيري، وينتشر في الدروع الجافة الشمالية للبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وقدرت أعداده بحوالي 22 ألف رأس عام 2008. ويمتاز هذا الماعز بمقاومته للجفاف والحرارة.

الماعز الدرعي السعودي الصحراوي

الصفات الشكلية:

مظهره العام صغير الحجم.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم القائم بين 24 - 26 كغ، ونسبة تصافي الذبيحة بين 47 - 52 %. بالإضافة إلى إنتاجه من اللحم فإن الحيوان ينتج الحليب، ويقدر إنتاج العنزة من الحليب بنحو 37 كغ في الموسم.

الماعز العارضي

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه منطقة نجد ويسمى محلياً بالعارضي أو العارضي الباكستاني أو البدوي أو البلدي، وينتشر في دول الخليج العربي واليمن،وهو في تزايد وأدخل إلى سهول تهامة والمرتفعات الجنوبية الغربية في الحجاز، ويعيش بشكل سرحي وعلى مخلفات المحاصيل في السعودية، وتحت نظام الرعاية شبه المكثف في قطر، ويبلغ حجم حيازته 50 - 70 رأساً في نظام الرعاية شبه المكثف و 70 - 100 رأس في نظام الرعاية المكثف، ويتركب القطيع النامي من حوالي 10 % ذكور و90 % إناث، أما قطيع الحيوانات المنتجة فيتركب من 5 % ذكور و95 % إناث، وتبلغ نسبة أيام الرعي 5 % و65 % أيام تغذية على المخلفات، و30 % تغذية على المركزات. يتأقلم خارج موطنه الأصلي، ويستجيب للتحسين الوراثي، وهومخلوط مع سلالات أخرى، وظاهرة الأمومة عنده ممتازة ويقاوم مرض السل، والكلب، والتسمم المعوي والدموي.

أنثى ماعز عارضي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود وملون، والوجه أبيض وأسود ورأسه كبير ومن علاماته الفارقة الآذان والعيون بيضاء، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، ومقطع الأنف مستقيم، وآذانه متدلية وطويلة. يبلغ ارتفاع جسم الذكور 70 - 95 سم والإناث 65 - 85 سم، وطول الجسم المستقيم 80 - 110سم للذكور و75 - 100سم للإناث، وطول الجسم المائل 80 - 95 سم و 75 - 85 سم للذكور والإناث على التوالي، والذيل قصير، والشعر ناعم قصير في مقدمة الجسم وطويل كثيف في مؤخرته.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ بين 6 - 8 أشهر، ويتراوح وزن الذكور التامة النمو 50 - 60 كغ، والإناث 40 - 55 كغ، وتلد الأنثى ثلاث مرات خلال عامين، وزن الإناث عند التلقيح 30 - 33 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 14-17 شهراً، وتصل نسبة التوائم إلى 50 - 85 % والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

يتراوح وزن الميلاد للذكور بين 2 - 3 كغ، وللإناث بين (1 - 2) كغ، ويتراوح وزن الفطام للذكور بين 17.8 - 18 كغ وللإناث بين 15 - 18 كغ بمعدل نمو يومي من الميلاد وللفطام يتراوح في الذكور والإناث بين 200 - 300 غ، وتسوق الحيوانات بوزن 30 - 40 كغ، وبعمر 150 - 180 يوماً.

تنتج الحيوانات اللحم والحليب، ويقدر إنتاج الإناث من الحليب بـ 300 - 400 كغ بموسم إدرار طوله 150 - 180يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي بنحو 2 كغ من الحليب، بنسبة دهن 7 %، وبروتين 6 %، ولاكتوز 4 - 5 %.

ذكر ماعز عارضي

الماعز النجدي السعودي

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن أصله جبلي، ويسمى في السعودية بالعارضي أو النجدي أو السوري، وينتشر في السعودية، ودول الخليج، واليمن، ويعيش متنقلاً أو تحت النظام شبه المكثف، ويتراوح حجم قطعانه السرحية الخليطة مع الأغنام بين 100 - 230 رأساً حيث تكون نسبة الماعز بين 1 - 5 %، وبين 65 - 165 رأساً في النظام شبه المكثف، حيث تكون نسبة الماعز في هذه القطعان 30 - 50 %، ويتأقلم الماعز النجدي خارج موطنه الأصلي، وفي المناخ الجاف وشبه الجاف في المرتفعات والمنخفضات ويقاوم الأمراض والطفيليات باعتدال وهو حيوان نشيط، وقوي وسريع الحركة.

أنثى ماعز نجدي سعودي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود، ولون الوجه أسود أو أبيض وأسود، ومخطمه أبيض، والرأس متوسط الحجم، ويمكن أن تتواجد القرون في الذكور والإناث، والآذان طويلة ومتدلية، وارتفاع الجسم عند الغارب 94 سم للذكور و83 سم للإناث، ويتراوح طول الجسم المستقيم بين 94 - 100 سم للذكور والإناث، والذيل قصير.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر البلوغ الجنسي للذكور والإناث بين 6 - 7 أشهر، ويصل وزن الذكر التام النمو بالمتوسط إلى 33.7 كغ،

والأنثى 29.3 كغ، والعمر عند التلقيح الأول 12 - 14 شهراً غالباً أو 7 - 8 أشهر نادراً، والعمر عند الولادة الأولى 17 - 19 شهراً غالباً، و12 - 14 شهراً نادراً، ونسبة الولادات التوأمية 12 - 14 %، والفترة بين ولادتين 6 - 11 شهراً.
يتراوح وزن ميلاد الذكور بين 1.7 - 4 كغ، وللإناث 1.6 - 3.8 كغ حسب نوع الولادة، وتفطم المواليد بعمر 60 يوماً، ويصل وزن المواليد الذكور عند الفطام إلى 11.5 كغ والإناث 10.5 كغ. ويبلغ معدل النمو اليومي من الميلاد وحتى الفطام 138 غ للذكور، و 126 غ للإناث.

ذكر ماعز نجدي سعودي

تنتج الحيوانات اللحم والحليب والشعر والجلد، ويتراوح إنتاج الإناث من الحليب بين 120 - 290 كغ في موسم طوله 111 - 136 يوماً. ويتراوح الإنتاج اليومي بين 750 - 1300 غ. تسوق الحيوانات بعمر 180 يوماً وبوزن 21 كغ، ويتراوح وزن الذبيحة بين 15 - 35 كغ، بنسبة تصافي 50 %. طول خصلة الشعر 15 - 22 سم، وقطر الليفة 40 - 55 ميكروناً، ويتصف الشعر بخشونته وهو طري الملمس مختلط قليلاً بالوبر الناعم.

عروق الماعز
في
جمهورية السـودان

الماعز البلدي السوداني
(النُوبي)

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه مرتفعات النوبة في السودان، ويسمى محلياً بالبلدي، أو النوبي، وينتشر في السودان في المناطق الشمالية والشرقية الصحراوية والمشاريع الزراعية والقرى والمدن وعلى امتداد نهر النيل وروافده، ويعيش تحت نظام الرعاية السرحي وشبه المكثف، وبلغ تعداده في السودان حوالي 11.9 مليون رأس عام 2008 ويشكل نحو 27.5 % من أعداد الماعز في السودان، وهو ماعز غير محسن وتم خلطه مع الشامي والسعانين.

ذكر الماعز النوبي السوداني

أنثى الماعز النوبي السوداني

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود نقي أو منقط بالأبيض أو البني أو البني المصفر ، أو خليط من الأبيض والأسود أحياناً، والرأس متوسط الحجم، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، ومقطع الأنف محدب أو مستقيم والآذان طويلة ومتدلية، والذيل قصير.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الجسم للذكور التامة النمو 22 كغ، والإناث 18 كغ، ويكون العمر عند البلوغ 6 أشهر، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، ويكون الوزن عند التلقيح 14 كغ، ويبلغ العمر عند الولادة الأولى 11 - 14 شهراً، والفترة بين ولادتين 8 أشهر، وتصل نسبة التوائم إلى 33.9 %.

متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 2.6 كغ، وللإناث 2.4 كغ، ويصل وزن الفطام عند الذكور الى 10 كغ، بينما يكون وزن الفطام الإناث 8 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 65غ، وللإناث 52 غ. ويبلغ متوسط وزن الذبيحة 22 كغ بنسبة تصافي 43.2 %.

ينتج الحيوان الحليب واللحم، ومتوسط إنتاج العنزة من الحليب 190 كغ، في موسم إدرار طوله 136 يوماً، ويقدر الإنتاجي اليومي بنحو 1.5كغ حليب بنسبة دهن 3.6 %، ونسبة بروتين 3.4 %، ونسبة لاكتوز 4.7 %.

الماعز البلدي السوداني الصحراوي
(النُوبي)

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه السودان، ويسمى محلياً بالصحراوي أو النوبي، وينتشر في شمال وغرب نهر النيل، ويعيش بشكل سرحي، وقدرت أعداده بنحو 1.8 مليون رأس عام 2008 ويشكل نحو 4 % من أعداد الماعز في السودان. يتأقلم خارج موطنه الأصلي ومع المناخ الجاف والطقس الحار والمراعي الفقيرة، وهو مقاوم للأمراض وطباعه معتدلة.

الماعز البلدي السوداني الصحراوي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض وبني أحياناً، ولون الوجه أسود مبقع بالأبيض، والرأس متوسط إلى كبير الحجم، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، والآذان طويلة ومتدلية سوداء اللون، والذيل متوسط الطول ومتجه للأعلى.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الذكور التامة النمو 40 كغ، والإناث 35 كغ، وقد يصل وزن بعض الحيوانات إلى 60 كغ، ويبلغ متوسط عمر البلوغ الجنسي 6 أشهر، وتلقح الأنثى لأول مرة بعمر 6 أشهر ويكون عمرها عند أول ولادة 11 شهراً، وتبلغ الفترة بين ولادتين 8 أشهر، ويبلغ متوسط وزن المواليد الذكور 2.4 كغ، والمواليد الإناث 2.2 كغ.

يتراوح إنتاج الحليب للعنزة بين 73.5 - 107.1 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 147يوماً، وبمعدل إنتاج يومي قدره 0.5 - 0.7 كغ حليب.

ماعز التلال السوداني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه السودان، واسمه المحلي ماعز التلال، وينتشر في تلال البحر الأحمر السودانية الجنوبية، ويعيش في قطعان خليطة 200 - 400 رأس في المراعي الجبلية والساحلية ومناطق الزراعات الهامشية، ويتراوح حجم حيازة العائلة بين 5 - 50 رأساً من الماعز، ويعتمد على الرعي لمسافات محدودة وعلى مخلفات المزرعة وبقايا المحاصيل، وقدرت أعداده بنحو 432 ألف رأس عام 2008 وهو يشكل حوالي 1 % من حجم قطيع الماعز في السودان.

ماعز التلال السوداني

الصفات الشكلية:

لون الجسم خمري (أسود محمر) مع خط داكن أو طحيني أو أسمر ضارب للحمرة أو أسود على امتداد الظهر وخط غامق على جانبي الوجه، وغالباً مايكون لون البطن والذيل وأسفل القوائم غامقاً، والرأس صغيراً، وقصبة الأنف مستقيمة، والآذان متوسطة الحجم متدلية والقرون متواجدة في الذكور والإناث ملتوية ومتناظرة، والرقبة طويلة ونحيلة، والشعر قصير على الجسم وطويل على الأرباع، وللذكر عرف طويل على الرقبة، والذيل مرتفع، وحجم الحيوان صغير.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح العمر عند البلوغ بين 9 - 12 شهراً للذكور والإناث، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن وسطي 15 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 14 - 17 شهراً، والفترة بين ولادتين 8 أشهر، ويبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 2.3 كغ، وللمواليد الإناث 1.5 كغ، ويصل وزن الذكور المفطومة الى 9 كغ، والإناث 8 كغ، ويبلغ معدل النمو اليومي للذكور 112غ، وللإناث 108غ، وتسوق الحيوانات بعمر 120 - 360 يوماً وبوزن 15 كغ. بالإضافة لإنتاج اللحم، تنتج الإناث الحليب، ويقدر متوسط إنتاج العنزة بنحو 49 كغ من الحليب في موسم طوله 150 يوماً.

ماعز التلال السوداني

الماعز الجبلي الدرعي السوداني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه السودان، ويسمى محلياً بالتقري أو الجبلي، وينتشر في جبل مرة وجبال النوبة، ويعيش على شكل قطعان سرحية مع الأغنام، ويتراوح عدد رؤوس القطيع بين 65 - 250 رأساً نصفها من الأغنام أما حيازة العائلة في النظام شبة المكثف بين 5 - 14 رأساً، وقدرت أعداده بنحو 431 ألف رأس عام 2008، وتبلغ مساهمته 1 % من قطيع الماعز في السودان، وهو في تناقص.

ذكر الماعز الجبلي الدرعي السوداني

الصفات الشكلية:

لون الجسم بني غامق أو بني مائل للرمادي غالباً، والرأس متوسط الحجم، وتتواجد القرون في الجنسين، وتكون منتصبة وتميل قليلاً إلى الخلف، وتتواجد اللحية في الجنسين، والشعر قصير مع خط أسود على الظهر أو خطين سوداويين على جانبي الوجه يمتدان من قاعدة القرون حتى الأنف، والآذان منتصبة أفقياً أو عمودياً.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم عند النضج للذكور بين 25 - 35 كغ، وللإناث بين 20 - 25 كغ، العمر عند البلوغ 5 - 9 أشهر، ويمتد

موسم التناسل على مدار العام، والعمر عند الولادة الأولى 11 - 13شهراً بنسبة توائم 61 % والفترة بين ولادتين 7 أشهر، ويتراوح متوسط وزن المواليد الذكور بين 1 - 1.5 كغ، والمواليد الإناث بين 0.7 - 1 كغ، وينتج هذا الحيوان اللحم بشكل رئيس، وإنتاجه من الحليب منخفض ويستخدم للاستهلاك المنزلي.

أنثى الماعز الجبلي الدرعي السوداني

ماعز الساحل السوداني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن أصله من الصحراء السودانية، ويسمى محلياً ماعز السافانا أو الماعز الصحراوي، وينتشر في المناطق الجافة وشبه الصحراوية غرب نهر النيل ويعيش تحت نظام الرعاية السرحي، وبلغت أعداده نحو 10.3 مليون رأس عام 2008 ويشكل مايقارب 24 % من الماعز السوداني، وهو في تزايد، ويمتاز بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي ويتحمل المناخ الحار والجاف ومقاومته معتدلة للأمراض والطفيليات، ويقاوم مرض الترايبونوزوما.

ماعز الساحل السوداني

الصفات الشكلية:

لون الجسم رمادي فاتح غالباً، أو ملطخ بالبني أو الأبيض أو الأسود، والوجه رمادي فاتح توجد عنابات بنسبة قليلة تصل إلى 15 % في الذكور والإناث. الرأس صغير وتتواجد القرون في 90 % من الجنسين، والمقطع مستقيم والآذان طويلة ومتدلية. يبلغ ارتفاع الجسم 69 - 83 سم للذكور، و65 سم للإناث، والذيل قصير. ويمتد الشعر الغزير من الأكتاف إلى الكفل والرقبة.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو بين 40 - 60 كغ، والإناث بين 30 - 40 كغ، ويبلغ العمر عند البلوغ 6 أشهر، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث لأول مرة بعمر 6 - 10أشهر، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 11 - 15شهراً، وتصل نسبة التوائم إلى 57 %، والفترة بين ولادتين 11 شهراً.

يبلغ متوسط وزن الميلاد للذكور 2.3 كغ، وللإناث 2 كغ، ويصل متوسط وزن الذكور المفطومة الى 10.1 كغ والإناث المفطومة الى 9 كغ بعمر 3 أشهر.

يبلغ معدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام 87 غ للذكور و78 غ للإناث، وتختلف أوزان الذبائح حسب طبيعة التسمين من 25 كغ إلى 35.8 كغ، وتتراوح نسبة التصافي بين 43 - 55 %، وهو حيوان منتج للحم وكميات قليلة من الحليب، ويتراوح إنتاج العنزة من الحليب بين 40 - 70 كغ في موسم إدرار طوله 90 - 120 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي من الحليب بنحو 0.5 كغ.

ماعز الساحل السوداني

الماعز السوداني الجنوبي

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه جبلي، ويسمى في السودان بالقزمي النيلي (Yei) Nilotic Dwarf . ومونقلا Mongolla. و توبوزا، وينتشر في جنوب السودان، ويعيش 90 % منه بشكل سرحي و10 % منه بشكل شبه مكثف في محيط المدن وفي المزارع، ويبلغ متوسط حجم حيازته 15 رأساً ويتركب القطيع النامي من 50 % ذكور ومثلها إناث، أما في الحيوانات البالغة فتبلغ نسبة الذكور المنتجة 5 % والإناث 95 %، وبلغ تعداده حوالي 15.5 مليون رأس عام 2008 ويساهم بنسبة 36 % من قطيع الماعز، وهو في تزايد. وهذا الماعز غير مقاوم للجفاف، ولكنه يتحمل درجات الحرارة المترافقة بالرطوبة العالية، ومقاوم لمرض الترييونوزوما، وهو معتدل الطباع.

الماعز السوداني الجنوبي (القزم)

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود الملطخ بالأبيض أحياناً، أو أبيض ورمادي نادراً، وهو خليط لسلالتي مونقلا وتوبوزا، وأسود لسلالة Yei، والجسم قصير عريض وعميق، والرأس كبير، وقصبة الأنف مستقيمة، والآذان متوسطة الطول، وتتواجد القرون في الذكور وتكون منحنية للخلف، وهي قليلة التواجد في الإناث، وللذكور لحية، والشعر قصير لامع وطويل، كثيف أسفل الرقبة ومقدمة الصدر.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح الوزن القائم للإناث الناضجة بين 11 - 17 كغ، والذكور الناضجة اقل من 25 كغ، والعمر عند البلوغ 5 أشهر ويمتد موسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن 15كغ، والعمر عند الولادة الأولى 10 - 11 شهراً، وتصل نسبة التوائم إلى 44 %، والفترة بين ولادتين 7 - 10 أشهر. وينتج الحيوان اللحم والجلود بشكل أساسي وهو منخفض إنتاج الحليب.

الماعز السوداني الجنوبي

الماعز البلدي السوداني الجبلي
(الزغاوا)

المنشأ والانتشار:

يتوقع أن منشأه السودان ومن أسمائه المحلية التقر والزغاوا، وينتشر في شمال شرق السودان وشمال غرب إقليم دارفور، يعيش تحت نظام الرعاية السرحي في قطعان يتراوح تعدادها بين 200 - 400 رأس مع الأغنام، وتتراوح نسبة الماعز في هذه القطعان بين 5 - 10 %، أو يعيش تحت النظام الإنتاج شبه المكثف. ويتراوح حجم الحيازة فيهابين 5 - 50 رأساً. وبلغ تعداده نحو 432ألف رأس عام 2008 . ويشكل نسبة 1 % من أعداد الماعز في السودان.

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود أو مصفر مع خط ظهري داكن أو أسمر ضارب إلى الحمرة مع خط غامق على جانبي الوجه وخط أسود على جانبي الظهر، وغالباً مايكون لون البطن والذيل وأسفل القوائم غامقاً، والرأس صغير، وتتواجد القرون في الذكور والإناث وتكون غليظة ملتوية لولبية باتجاه الجانب، ومقطع الرأس مستقيم، والآذان طويلة متدلية، والشعر طويل.

الصفات الإنتاجية:

حيوان كثير التوالد، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، وتلد العنزة لأول مرة بعمر 10 أشهر، ويقدر طول الفترة بين ولادتين بنحو 7 أشهر، وتلد الإناث التوائم أيضاً إلا أن كمية الحليب قليلة تكاد تكفي المواليد.

عروق الماعز
في
الجمهورية العربية السـورية

الماعز الجبلي السوري

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنه نشأ في غرب آسيا أو في آسيا الوسطى، وهناك تشابه مع الماعز الأناضولي في تركيا. يعرف في المراجع العلمية باسم الماعز الجبلي السوري أو الأسود الجبلي أو، يطلق عليه لفظ نموذج وليس سلالة. ويعرف بأسماء مختلفة ففي سورية والأردن يعرف بالجبلي أو البلدي، وفي فلسطين و مصر بالبلدي، وفي العراق بالعراقي، ويتواجد في ليبيا، وينتشر حتى المغرب، وتتواجد 99 % من الحيوانات تحت نظام الرعاية السرحي، وتتراوح حيازته في سورية بين 50 - 100 رأس. وتقدر أعداده في سورية بنحو 1.5 مليون رأس، وهو في تزايد. ويمتاز بالتأقلم خارج الموطن الأصلي والاستجابة للتحسين الوراثي، ويتميز بظاهرة الأمومة وانتقائيته في المرعى وشراسته، وهو مقاوم للأمراض التنفسية بنسبة 7 % والانترتوكسيميا بنسبة 90 %.

ذكر الماعز الجبلي السوري

المواصفات الشكلية:

لون الجسم أسود غالباً، ويمكن أن يكون أبيض أو أحمر أو بنياً أو بألوان متعددة، و لون الوجه أسود أو أبيض أو بني أو بألوان متعددة، وعلاماته الفارقة لحية تصحبها أحياناً زوائد لحمية، الرأس متوسط الحجم، وتتواجد القرون في الإناث والذكور، والآذان متدلية وطويلة، والذيل قصير. يبلغ ارتفاع الجسم عند الذكور 70 - 78 سم، وعند الإناث 65 - 74 سم، وطول الجسم المستقيم 42 سم للذكور و 39 سم للإناث، أما طول الجسم المائل فيبلغ 47 سم و45 سم للذكور والإناث على التوالي.

الصفات الإنتاجية :

تبلغ الذكور جنسياً عند وزن 32 كغ، والإناث 30 كغ، ويكون عمرها بين 4 - 5 أشهر، ويبلغ وزن التلقيح للإناث 35 كغ، ويتركز موسم التناسل في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ويمتد حتى تشرين الأول/أكتوبر، ويبلغ معدل الولادات 90 %.
ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 17 - 22 شهراً، ومتوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 3.5 كغ وللإناث 3.3 كغ، ووزن الفطام 14.5كغ للذكور، و13كغ للإناث. وتبلغ نسبة التوائم 20 - 40 % وتصل الفترة بين ولادتين 12شهراً. ينتج اللحم والحليب والشعر، ونسبة التصافي في الذبيحة 41 %، ونسبة التشافي 37 %.
يصل إنتاج الحليب الكلي الى 150 - 350 كغ في موسم يتراوح طوله بين 210 - 280 يوماً، ويتراوح إنتاج الحليب بين 1 - 1.2كغ، وتتراوح نسبة الدهن في الحليب بين 4 - 4.5 %، والبروتين 2.5 - 2.8 %، واللاكتوز بين 4 - 4.6 %.
يبلغ وزن الشعر الناتج من الرأس الواحد في السنة 1 كغ، ويتراوح طول الخصلة بين 8 - 10سم، والشعر خشن، أو نصف خشن، أو ناعم.

ذكر الماعز الجبلي السوري

الماعز البلدي السوري

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه جبلي ويسمى بالخاش أو البلدي أو البلدي الأسود وينتشر في المناطق الجافة من الهلال الخصيب، والجبال المحيطة بالسهول والهضاب الداخلية ويعيش في نظام الرعاية السرحي، وفي نظام الرعاية شبه المكثف. يتغذى على مخلفات المحاصيل وبقايا المنازل ويسرح بشكل قطعان كبيرة 300 - 500 رأس مختلطاً مع الأغنام بنسبة 5 % أو في قطعان متوسطة الحجم 120 رأساً بنسبة 20 - 50 %.

يمتاز الماعز البلدي بمقاومته الجيدة للأمراض، وبأنه متوسط المقاومة للجفاف والحرارة العالية.

ذكر الماعز البلدي السوري

المواصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه والآذان وأسفل البطن أسود مخطط بالأحمر أو الطحيني أو أسود مبقع بالأبيض أو أشهب أو رمادي أو بني. الرأس متوسط الحجم وقصبة الأنف مستقيمة، والآذان طويلة أو متوسطة متدلية أو قصيرة أو أثرية وتتواجد القرون في الجنسين والرقبة قصيرة والجسم مدمج والذيل قصير متجه للأعلى والأمام، والطباع معتدلة الوداعة. يبلغ ارتفاع الجسم 62 سم للذكور و61 سم للإناث وطول الجسم المستقيم 68 و61 سم للذكور والإناث على التوالي.

الصفات الإنتاجية :

يتراوح العمر عند البلوغ بين 4 - 6 أشهر، والوزن عند التلقيح الأول بين 22 - 32 كغ، والعمر عند الولادة الأولى بين 12 - 19 شهر، ونسبة التوائم تصل إلى 45 % والفترة بين ولادتين 12 شهراً.

يبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 3.13 كغ، وللإناث 2.18 كغ، ويصل وزن الفطام للذكور 21.4 كغ، وللإناث 18.92كغ بالمتوسط، ويبلغ معدل النمو اليومي 203 غ للذكور، و137.9غ للإناث، ومتوسط وزن الذكور التامة النمو50 كغ، والإناث 35 كغ، بينما يكون وزن التسويق 25 كغ بالمتوسط وبعمر 180يوماً.

الماعز البلدي منتج للحليب واللحم والشعر والجلد، ويقدر إنتاجه من الحليب بين 267 - 362 كغ في موسم يتراوح طوله بين 180 - 270 يوماً، ويقدر متوسط الإنتاج اليومي بنحو 2.5 كغ. الشعر خشن مسترسل وطري مختلط بالوبر الناعم بنحو 3 %، ويتراوح وزن الشعر بين 0.5 - 1.5 كغ وبالمتوسط 0.8 كغ، وطول الخصلة 15 - 24 سم وقطر الليفة 40 - 50 ميكروناً.

أنثى الماعز البلدي السوري

عروق الماعز
في
جمهورية العـــراق

الماعز البلدي العراقي

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنه نشأ في بلاد الرافدين، وينتشر في بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، ويتركب القطيع النامي من 50 % لكل من الذكور والإناث، ويتكون القطيع المنتج من 5 % ذكور و 95 % إناث. يتواجد 90 % من الحيوانات تحت نظام الرعاية السرحي و10 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف، وتقدر أعداده بنحو 1.2 مليون رأس وهو في تزايد، ويتأقلم خارج الموطن الأصلي، وصفة الأمومة جيدة، ويقاوم الطفيليات الخارجية وديدان الرئة،واستجابته للتحسين الوراثي ممتازة، ولم يتعرض لبرامج تحسين وراثي، وتم خلطه مع سلالات أخرى.

الماعز البلدي العراقي

الصفات الشكلية:

لون الجسم أسود أو رصاصي أوبني وتوجد علامات بيضاء على الجسم، لون الوجه أسود وحجمه صغير، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، ومقطع الأنف محدب، والآذان طويلة ومتدلية، ويبلغ متوسط ارتفاع الجسم عند الذكور 74.3 سم وعندالإناث 67.3 سم، وطول الجسم المستقيم 71.5 سم و65.1 سم للذكور والإناث على التوالي، والشعر خشن.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح عمر الذكور والإناث التامة النمو بين 9 - 11 شهراً، ووزن النعجة عند التلقيح بين 25 - 30 كغ، والعمر عند الولادة الأولى بين 13 - 16 شهراً، وتلد العنزات مرتين في العام، والفترة بين ولادتين 6 - 7 أشهر، ونسبة التوائم 80 %.

يبلغ متوسط وزن ميلاد الذكور 3.59 كغ، والإناث 2.8 كغ، ووزن الفطام للذكور 12.6 كغ، وللإناث 10.8 كغ، ويقدر معدل النمو اليومي من الميلاد إلى الفطام 200 غ للذكور و167غ للإناث. يبلغ متوسط وزن الذكور التامة النمو 49.7 كغ، والإناث 39 كغ، ويتم تسويق الحيوانات بعمر 6 - 7 أشهر بمتوسط وزن 20 كغ، وتقدر نسبة التصافي 42.4 %.

الشعر خشن وتزن القصة الخام 3.71 كغ والمغسولة 3.5 كغ، وطول الخصلة 13.2 سم، وهو حيوان ينتج الحليب واللحم، ويقدر إنتاجه من الحليب بنحو 270 كغ في موسم إدرار طوله 90 يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي 3 كغ من الحليب، وتتراوح نسبة المواد الصلبة الكلية بين 15 - 20 %، ونسبة الدهن بين 5 - 6 %، والبروتين بين 6 - 8 %، واللاكتوز بين 5 - 7 %.

الماعز البلدي العراقي

الماعز الجبلي العراقي

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي ويسمى المرعز والكردي والمارخوذ، وينتشر في المناطق الجبلية الشمالية من العراق المتاخمة لتركيا (زاخو في دهوك)، وأقصى الشمال الشرقي من سورية. يعيش تحت نظام الرعاية السرحي أو شبه المكثف ويتراوح حجم القطيع بين 50 - 150 رأساً من الماعز النقي، وهذه الحيوانات غير مقاومة لحرارة الصيف.

الماعز الجبلي العراقي(مرعز)

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض أوأحمر أو خليط من الأبيض والأحمر أحياناً والأسود نادراً. والرأس صغير نحيف ورقيق، والآذان متوسطة الطول متدلية، والقرون موجودة في كلا الجنسين، والجسم نحيف قوي البنية ، والشعر ناعم ولامع وطويل (أطول من 25 سم) يوصف بالحريري، وهو قطني الملمس لولبي الشكل. يبلغ متوسط الارتفاع عند الكتف 68 سم للذكور و60 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو بين 45 - 55 كغ، والإناث بين 25 - 35 كغ، ويبلغ متوسط وزن المواليد الذكور والإناث 2 - 3 كغ، وتذبح الحيوانات بعمر 5 - 6 أشهر. يبدأ موسم التلقيح في تموز/يوليو ويمتد حتى تشرين الأول/أكتوبر، وتلد الأنثى عادة مرة في العام أو ثلاث مرات في عامين، وتكون المواليد المولودة في غير موسمها صغيرة الحجم وزنها بالمتوسط 1.5 كغ.

تنتج الحيوانات الحليب واللحم والشعر، إذ يتراوح إنتاج الإناث من الحليب بين 90 - 135 كغ، في موسم إدرار طوله 120 - 180يوماً، ومتوسط الإنتاج اليومي من الحليب 0.5 كغ. وزن قصة الشعر0.5 - 2.5 كغ تبعاً للعمر، ويقص الشعر في شهر نيسان/أبريل من كل عام.

عروق الماعز
في
سلطنة عُمـــان

الماعز البلدي الصحراوي العماني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه من الجبل الأخضر، ويسمى محلياً بالجبلي، وينتشر في المنطقة الداخلية والباطنة والظاهرة، ويعيش 90 % منه تحت نظام الرعاية السرحي، ويعتمد في تغذيته على المراعي بشكل أساسي، و 10 % منه يعيش تحت نظام الرعاية شبه المكثف ويعتمد في تغذيته على مخلفات المحاصيل والمركزات.

يتأقلم بشكل جيد خارج الموطن الأصلي، ويستجيب للتحسين الوراثي وهو محسن، وتم خلط جزء منه مع سلالات الماعز الشامي والسلالات المحلية ويمتاز بظاهرة الأمومة، وهو مقاوم للأمراض لذلك فهو مطلوب وأسعاره مرتفعة.

أنثى ماعز صحراوي عماني

الصفات الشكلية:

لون الجسم أحمر أو بني محمر غالباً ومختلط ببقع بيضاء. رأسه صغير مائل للاستطالة، وتتواجد القرون في معظم الذكور، والإناث جماء، ومقطع الأنف مستقيم، وآذانه قصيرة ومتدلية، والذيل قصير.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور التامة النمو 43.1 كغ، والإناث 38.11 كغ، يتراوح العمر عند البلوغ بين 5 - 18 شهراً. يمتد موسم التناسل على مدار العام ويتركز خلال الفترة بين شهر أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر. ويبلغ متوسط وزن الإناث عند التلقيح 35.1 كغ، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 10 - 24 شهراً، وتصل نسبة التوائم إلى 20 - 22 %، وتتراوح الفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً. يبلغ متوسط وزن الميلاد للذكور 3.55 كغ وللإناث 3 كغ. ويصل وزن الذكور المفطومة

إلى 11.71 كغ والإناث المفطومة 10.04 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 136 غ، وللإناث 117 غ، وتسوق الحيوانات بعمر 6 - 9 أشهر وبمتوسط وزن 24.66 كغ.

ينتج هذا الماعز اللحم بشكل رئيس بالإضافة إلى إنتاجه من الحليب والشعر والجلود، ويتراوح إنتاجه من الحليب بين 30 - 90 كغ، في موسم إدرار يتراوح طوله بين 150 - 180 يوماً وبإنتاج يومي يتراوح بين 200 - 500 غ.

ذكر فتي من الماعز الصحراوي

مولود ماعز صحراوي

الماعز البلدي العماني
(الباطنة)

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه منطقة الباطنة في سلطنة عمان، ويسمى محلياً ماعز الباطنة أو الماعز الساحلي، وينتشر في الباطنة ومسقط والظاهرة والمناطق الداخلية ويعيش 90 % منه تحت نظام الرعاية السرحي و 10 % تحت نظام الرعاية شبه المكثف، ويتراوح حجم الحيازة بين 25 - 100 رأس ويعتمد نظام التغذية على المراعي بشكل رئيس ومخلفات المحاصيل والمركزات، ويتأقلم هذا الماعز خارج موطنه الأصلي، ويستجيب للتحسين الوراثي ومنه محسن وخليط مع سلالة الماعز الشامي والسلالات المحلية، وهو مقاوم للأمراض، ومرغوب لدى المربين وأسعاره مرتفعة.

ذكر ماعز بلدي عماني (الباطنة)

الصفات الشكلية:

لون الجسم بني مع بعض البياض، ولون الوجه بني وأبيض، وشعره متوسط الطول والرأس متوسط الحجم، ومقطعه مستقيم، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، والآذان متدلية وقصيرة، والذيل قصير وملتف للأعلى.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور التامة النمو 35.6 كغ، والإناث 30.63 كغ، ويتراوح العمر عند البلوغ بين 15 - 18 شهراً، ويمتد موسم

التناسل على مدار العام ويتركز من شهر أيلول/سبتمبر حتى تشرين الثاني/نوفمبر، ويبلغ متوسط وزن الإناث عند التلقيح 23.1 كغ، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 20 - 24 شهراً، وتصل نسبة التوائم إلى 38.2 % والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً.

يبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 3.44 كغ، وللإناث 2.9 كغ، ويصل وزن الذكور المفطومة بالمتوسط الى 11.89 كغ، والإناث المفطومة 10 كغ، ويبلغ معدل النمو اليومي للذكور بالمتوسط 140.8غ وللإناث 135غ، وتسوق الحيوانات للذبح بعمر 9 أشهر، وبمتوسط وزن 23.71 كغ.

ينتج الماعز البلدي العماني اللحم بشكل رئيس، بالإضافة إلى الحليب والشعر حيث يتراوح إنتاج العنزة من الحليب بين 30 - 75 كغ بموسم إدرار طوله 150 يوماً، وبمتوسط إنتاج يومي 0.2 - 0.5 كغ حليب.

إناث ماعز بلدي عماني (الباطنة)

الماعز الجبلي العماني
(ماعز الجبل الأخضر)

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه من جبال عمان ويسمى محلياً الماعز العماني، وينتشر في دول الخليج العربي وبخاصة دولة الامارات العربية المتحدة (يدعى ماعز الجبل الأخضر) ، واليمن، ويعيش 56 % منه تحت نظام الرعاية شبه المكثف و30 % تحت نظام الرعاية المكثف، وترعى النسبة المتبقية في النظام السرحي، ويختلف حجم الحيازة حسب نظام الإنتاج، ففي النظام شبه المكثف يتراوح حجم الحيازة بين 20 - 40 رأساً وفي المكثف بين 50 - 70 رأساً، ويتركب القطيع النامي من 25 % ذكور و 75 % وإناث، أما القطيع المنتج فيتكون من 10 % ذكور و 90 % إناث، ويتغذى هذا الماعز بشكل رئيس على مخلفات المحاصيل والمركزات، ويتأقلم خارج موطنه الأصلي ويستجيب للتحسين الوراثي، وهو في تزايد.

ذكر ماعز جبلي عماني

الصفات الشكلية:

اللون متنوع من الأصفر إلى البني الفاتح غالباً والأسود أحياناً والأبيض نادراً، ورأسه صغير، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، مقطع الأنف مستقيم، والآذان قصيرة ومتدلية، وارتفاع الجسم 65 - 69 سم للذكور و 60 - 65 سم

للإناث، وطول الجسم المستقيم 85 - 89 سم للذكور و70 - 80 سم للإناث، الذيل قصير والشعر خشن.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو مابين 45 - 50 كغ، والإناث بين 40 - 45 كغ، وتبلغ الذكور والإناث بعمر 5 أشهر. يمتد موسم التلقيح على مدار العام، ويبلغ متوسط وزن الإناث عند التلقيح 30 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 14 شهراً، ونسبة التوائم 5 % والفترة بين ولادتين 6 أشهر.

يتراوح وزن الميلاد للذكور بين 2 - 2.2 كغ، وللإناث 1.5 - 2 كغ، ووزن الفطام للذكور 16 - 18 كغ، وللإناث 15 - 16 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد وحتى الفطام 200 - 250 غ للذكور والإناث، وتسوق الحيوانات للذبح بعمر 120 - 150 يوماً وبوزن 30 - 35 كغ، حيث تبلغ نسبة التصافي 55 - 60 % والتشافي 50 - 55 %.

ينتج هذا الماعز الحليب واللحم، ويبلغ الإنتاج الكلي من الحليب 300 كغ بموسم إدرار يتراوح طوله بين 120 - 150يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي بنحو 2 - 3.5 كغ، وتصل نسبة الدهن في الحليب حتى 7 %، ونسبة البروتين بين 5 - 7 %، ونسبة اللاكتوز 4.5 %.

أنثى ماعز جبلي عماني

الماعز الظفاري العماني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه ظفار ويسمى محلياً الماعز الظفاري أو ماعزجنوب السلطنة، وينتشر في محافظة ظفار، وأدخل إلى المناطق الداخلية والباطنة، ويعيش 90 % من قطعانه تحت نظام الرعاية شبه السرحي و10 % تحت نظام الرعاية المكثف، ويمتاز بتأقلمه خارج الموطن الأصلي، واستجابته للتحسين الوراثي متوسطة. وظاهرة الأمومة لديه ممتازة، وهو مرغوب جداً لإنتاج الحليب في الجنوب، وكفاءته عالية لتحويل العلف إلى حليب.

أنثى الماعز الظفاري العماني

الصفات الشكلية:

لون الجسم أبيض أو مبقع ولون الوجه بني أو أسود أو أبيض. الرأس متوسط الحجم، والمقطع محدب، والآذان قصيرة، والقرون تتواجد في الذكور والإناث، وقرون الذكور كبيرة.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الذكور التامة النمو 32.12 كغ والإناث 30.29 كغ، ويتم البلوغ بعمر يتراوح بين 8 - 18 شهراً، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث عادةً بوزن 18 - 20 كغ. ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 13 - 24 شهراً،

وتتراوح نسبة التوائم بين 35 - 41 %، والفترة بين ولادتين 8 - 12 شهراً. ويبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 3.3 كغ، وللإناث 3.11 كغ، ووزن الذكور المفطومة 14.13 كغ والإناث المفطومة 12 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام 122 غ للذكور و99 غ للإناث.

بالإضافة لإنتاج اللحم، فإن الماعز الظفاري ينتج الحليب ويتراوح إنتاج العنزة من الحليب بين 75 - 126 كغ بموسم إدرار يتراوح طوله بين 150 - 180يوماً، ويقدر الإنتاج اليومي من الحليب بنحو 0.5 - 0.7 كغ.

ذكر الماعز الظفاري العماني

عروق الماعز
في
دولـــــة فلسطين

الماعز الجبلي الفلسطيني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه المناطق الجبلية ويسمى محلياً بالماعز الجبلي أو الماعز الأسود، وينتشر في شمال وغرب الأردن، وشمال فلسطين، وجنوب غرب سورية، وجنوب لبنان، ويعيش تحت نظام الرعاية السرحي في الجبال، وتحت نظام الرعاية المكثفة في الريف.

يصل حجم القطيع إلى 100 رأس في الريف، ويتم تجميعه من الحيازات العائلة التي تمتلك كل منها 2 - 10 رؤوس، وفي المدن يصل حجم القطيع إلى 40 رأساً.

الماعز الجبلي الفلسطيني

الصفات الشكلية:

اللون أسود غالباً أو الأبيض أو أسود ومرقط بالأبيض أحياناً، الرأس متوسط الحجم، وتتواجد القرون في الجنسين، وتكون غليظة ملتفة لولبياً باتجاه الجانب في الذكور، وقصيرة ملتفة إلى الخلف والأمام بشكل المنجل بانحراف نحو الجانب في الإناث، والجبهة وقمة الرأس محدبة، والآذان عريضة و متدلية. ويبلغ ارتفاع الجسم 60 - 75 سم و48 - 55 سم للذكور والإناث على التوالي، والذيل قصير. تبدو هذه الحيوانات مندمجة وقوية البنية، ولكنها تتعرض للالتهابات الرئوية بشكل متكرر.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح العمر عند البلوغ بين 12 - 15 شهراً، ويصل وزن الذكور التامة النمو الى 52 كغ، والإناث الى 36 كغ.
يبدأ موسم التناسل في شهر أيلول/سبتمبر، ويمتد إلى تشرين الثاني/نوفمبر، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 17 - 20 شهراً، ونسبة التوائم بين 10 - 15 % وتبلغ الفترة بين ولادتين 12 شهراً .
ينتج هذا الماعز اللحم والحليب والشعر والجلود، ويستخدم الحليب بشكل رئيس في المنزل ويباع الفائض منه، والشعر طويل ولامع ويقص ويستخدم لأغراض منزلية.

ماعز خليط في فلسطين

عروق الماعز
في
دولـــة الكويت

ماعز السانن

المنشأ والانتشار:

نشأ هذا العرق في سويسرا (وادي سانن)، ومنها انتشر الى دول عديدة في العالم، وأدخل إلى دولة الكويت، ويعيش تحت نظام الرعاية المكثف وشبه المكثف.

الماعز السانن بالكويت

الصفات الشكلية:

الحيوانات متوسطة الحجم، والرأس صغير وقصبة الأنف مستقيمة، ولون الحيوانات أبيض أو كريمي. الآذان صغيرة ومنتصبة، والذيل قصير ملتف للأعلى، والشعر قصير، وتتواجد القرون في الجنسين.

الصفات الإنتاجية:

يصنف هذا الماعزضمن العروق المتخصصة بإنتاج الحليب، وهو غير جيد لإنتاج اللحم. متوسط وزن الذكور التامة النمو 60 كغ، والإناث 55 كغ، وتنتج العنزة بالمتوسط نحو 975 كغ حليب في موسم إدرار يتراوح طوله بين 8 - 10أشهر، وبنسبة دسم 3.5 %، وقد يصل إنتاج بعض العنزات إلى 1900 كغ حليب في بلد المنشأ.

عروق الماعز
في
الجمهورية اللبنانيـــة

الماعز الجبلي اللبناني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه لبنان ويسمى محلياً بالماعز الجبلي أو الحرشي البلدي وينتشر في محافظة البقاع، ويعيش 95 % منه تحت نظام الرعاية السرحي في الجبال والباقي 5 % في المزارع أو حول المدن، ويتراوح حجم القطيع بين 100 - 250 رأساً، ويكون غالباً قطيع تجميعي من الحيازات العائلية الفردية 2 - 10 رؤوس لكل عائلة، بينما يتراوح حجم القطيع في المدن بين 50 - 100 رأس، ويتركب القطيع حسب الجنس من 17 % ذكور و83 % إناث، وقدرت أعداده بنحو 434 ألف رأس عام 2007. ويشكل الماعز الجبلي نحو 95 % من قطيع الماعز اللبناني.

أنثى الماعز الجبلي اللبناني

ذكر الماعز الجبلي اللبناني

الصفات الشكلية:

اللون أسود غالباً أو أسود ومنقط بالأبيض على الجبهة والقوائم أحياناً وبني أو رمادي نادراً. والرأس متوسط الحجم وتتواجد القرون في كلا الجنسين وتكون في الذكور طويلة وغليظة باتجاه جانبي عمودي على الرأس، وفي الإناث قصيرة متجهه للأعلى والخلف، ومقطع الأنف مستقيم والآذان متدلية. يبلغ ارتفاع الجسم 85 و68 سم للذكور وللإناث على التوالي، والذيل قصير متجه للأعلى، وطول الجسم المستقيم 70 سم للذكور و64 سم للإناث.

الصفات الإنتاجية :

يتراوح العمر عند البلوغ الجنسي بين 12 - 15 شهراً، ويصل وزن الذكر التام النمو 65 كغ، والأنثى الى 35 كغ، ويبدأ موسم التناسل في شهر تموز/يوليو ويمتد حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 17 - 20 شهراً، وتتراوح نسبة التوائم بين 10 - 15 %، وتبلغ الفترة بين ولادتين 12 شهراً.

ينتج الماعز الجبلي اللبناني اللحم والحليب والشعر والجلود، وتنتج العنزة نحو 160 كغ من الحليب في موسم طوله 160 - 180 يوماً، ويقدر متوسط الإنتاج اليومي بنحو 1 كغ.

عروق الماعز
في
الجماهيرية
العربيـــة
الليبيـــة
الشعبيـة
الاشـتراكية
العظمـــى

الماعز البلدي الليبي

المنشأ والانتشار:

منشؤه الجبال الصحراوية المصرية والليبية، وأسماؤه المحلية الماعز الليبي أو المحلي، وينتشر في شمال ووسط ليبيا، وأنظمته الإنتاجية تقليدية وتعتمد على رعي متنقل في الصحراء الجنوبية، ورعي متناوب بين المناطق الصحراوية الداخلية والسواحل، وشبه المتنقل في المناطق الشرقية، وشبه المكثف في الريف، ويتراوح حجم القطيع الرعوي بين 300 - 600 رأس خليط مع الأغنام، ونسبة الماعز أقل من 10 % ، ويتراوح حجم الحيازة بين 5 - 50 رأساً من الماعز، ويتركز الماعز في الجبل الأخضر بأعلى كثافة 2.9 رأس كم^2 والجبل الغربي وبأعداد قليله في الشريط الساحلي. يعدالماعز الليبي خليط مع الماعز المالطي والصقلي في الساحل، وخليط مع الماعز الصحراوي في الجنوب. يمتاز بالوداعة من حيث الطبع، كما أنه متوسط المقاومة للجفاف والحرارة والأمراض.

الماعز البلدي الليبي

الصفات الشكلية:

متعدد الألوان مع بروز نجمة بيضاء على الجبهة، والآذان مبرقشة بالأبيض والبني خاصةً على الساحل، ويزداد اختلاطه مع الماعز المالطي باللون الأبيض والرمادي الفاتح إلى الفضي الغامق، وخليط هذه الألوان غالباً والأصفر الفاتح نادراً. الجسم إسطواني الشكل وخشن البنية، والرأس متوسط الحجم، وقصبة الأنف مستقيمة في الإناث ومحدبة قليلاً في الذكور، والآذان متوسطة الطول متدلية غالباً ومنتصبة نادراً، والقرون في الجنسين غليظة وملتفة بالذكور ونحيفة قصيرة بالإناث، واللحية في الجنسين. يبلغ ارتفاع جسم الذكور 65 سم والإناث 61 سم، وطول الجسم المستقيم للذكور 70 سم والإناث 55 سم.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الإناث والذكور التامة النمو بين 40 - 50 كغ، وتلقح الإناث بوزن بين 30 - 35 كغ، ويتراوح العمر عند أول تلقيح بين 14 - 16 شهراً، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، ويبلغ العمر عند أول ولادة 20 شهراً، والفترة بين ولادتين 6 - 8 أشهر، وتصل نسبة التوائم إلى 25 %.

يتراوح وزن الميلاد للإناث والذكور بين 2 - 3 كغ، ووزن الفطام بين 10 - 15 كغ ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد وحتى الفطام 88 - 134 غ، وتخصص المواليد الذكور للذبح بعمر 4 - 12 شهراً، ويتراوح وزن الذبيحة بين 20 - 25 كغ، ونسبة التصافي بين 50 - 52 % بعمر 240 - 300 يوم، ووزن قصة الشعر بين 0.5 - 1 كغ، ويستخدم الشعر لنسج الخيام وأكياس نقل الحبوب. بالإضافة لذلك ينتج الحيوان الحليب والجلود، ومتوسط إنتاج العنزة 153 كغ من الحليب، في موسم إدرار طوله 180 يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي من الحليب بين 0.5 - 1 كغ.

الماعز البلدي الليبي الصحراوي
(التباوي)

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي من الجبال الصحراوية في مصر وليبيا ويسمى محلياً بالتباوي، وينتشر في المناطق الجنوبية من الجماهيرية، ويعيش في المناخ الصحراوي الجاف والحار في الصيف والبارد القارص الجاف في الشتاء، ويتواجد بشكل أساسي تحت نظام الرعاية السرحي مع البدو، وبشكل قليل تحت نظام الرعاية شبه المكثف.

الماعز البلدي الليبي الصحراوي (التباوي)

الصفات الشكلية:

متعدد الألوان تغلب عليه الألوان الفاتحة كالأبيض والرمادي والألوان الخليطة كالأبيض والأسود والبني الفاتح، والرأس صغير الحجم، وقصبة الأنف مستقيمة، والآذان متوسطة الحجم وشبه متدلية أو قصيرة منتصبة، والقرون متواجدة في الجنسين وهي طويلة لولبية باتجاه الخلف والجانب في الذكور، ومتوسطة الحجم وصغيرة في الإناث، والقوائم طويلة، وشعر الجسم قصير.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الذكور التامة النمو بين 35 - 54 كغ، ويبلغ متوسط وزن الإناث 30 كغ.

الماعز الدرعي الليبي الصحراوي
(الكردي الليبي)

المنشأ والانتشار:
منشؤه جبلي ويسمى محلياً بالماعز الكردي، وينتشر في تلال تيبستي أقصى الجنوب الليبي.

الصفات الشكلية:
المظهر العام صغير الحجم جداً.

الصفات الإنتاجية:
الخصوبة عالية جداً، ويتراوح حجم البطن للعنزة بين (2 - 3) مولوداً.

الماعز المحلي الليبي

المنشأ والانتشار:
منشؤه ليبيا، ويعيش تحت نظام الرعاية السرحي بنسبة 80 %، وتحت نظام الرعاية شبه المكثف بنسبة 20 %، ويتراوح حجم الحيازة بين 100 - 200 رأس في نظام الرعاية السرحي، ويتغذى بنسبة 50 % على المراعي و 20 % على مخلفات المحاصيل الحقلية، و30 % على المركزات.
بلغ تعداده بالجماهيرية 1.8 مليون رأس عام 2007. وهو في تزايد مستمر، يمتاز بظاهرة الأمومة وهو محسن وتم خلطه مع سلالة الماعز الشامي والمالطي.

الصفات الشكلية:
لون الجسم أسود أوبني أو مبقع، أما الوجه فهو أسود، والرأس متوسط الحجم ومقطعه مستقيم، وتتواجد القرون عند الذكور والإناث، والآذان متدلية وقصيرة، والشعر خشن.

الصفات الإنتاجية:
متوسط وزن الجسم للذكور والإناث التامة النمو 24 كغ، ويتراوح العمر عند البلوغ بين 5 - 7 أشهر، ويمتد موسم التناسل على مدار السنة، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 12 - 15 شهراً، وتصل نسبة التوائم إلى 40 %، ومعدل الولادات الى 130 %، وتبلغ الفترة بين ولادتين 7 - 8 أشهر، ومتوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور والإناث 2.4 كغ، ووزن الذكور المفطومة 10 كغ، والإناث المفطومة 9 كغ، وتتراوح نسبة تصافي الذبائح بين 46 - 52 %.
بالإضافة لإنتاج اللحم ينتج الحيوان الحليب، ويبلغ متوسط إنتاج العنزة من الحليب 65 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 150 يوماً، وتبلغ نسبة الدهن في الحليب 2.3 %، والبروتين 3.2 %. ويتراوح وزن الشعر بين 0.50 - 1.5كغ.

عروق الماعز
في
جمهورية موريتانيـا الإسلامية

الماعز البلدي الموريتاني الصحراوي

المنشأ والانتشار:

منشؤه شرق موريتانيا، ويسمى محلياً جوفر أو الماعز الإسباني وينتشر في شرق وجنوب موريتانيا، وأدخل إلى وسط البلاد، ويعيش 95 % منه في الحيازات العائلية وفي المزارع، و5 % منه تحت نظام الرعاية السرحي، ويتركب القطيع النامي غالباً من 8 % ذكور و32 % إناث، أما المنتج 10 % ذكور و 50 % إناث، وتتراوح الحيازة بين 2 - 50 رأساً، وقدرت أعداده بنحو 784 ألف رأس عام 2008، مشكلاً 14 % من إجمالي الماعز في موريتانيا، وهو في تزايد.

يمتاز هذا الحيوان بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي وهو مقاوم للجفاف والحرارة ومقاومته متوسطة للأمراض والطفيليات وبخاصة مرض التريبونوزوما.

الماعز البلدي الموريتاني الصحراوي

الصفات الشكلية:

لون الجسم رمادي أو أبيض مبقع بالأسود والأحمر غالباً، الرأس كبير الحجم، وقصبة الأنف مستقيمة، والآذان طويلة ومتدلية، والقرون متواجدة في الذكور وغير موجودة في الإناث كما أن للذكور لحية. يبلغ ارتفاع الجسم 40 - 50 سم عند الإناث و 60 - 70 سم عند الذكور، والذيل قصير، والشعر متوسط الطول وخشن وغزير، ويغطي الجسم حتى مستوى العرقوب.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الجسم للذكور والإناث التامة النمو 25 كغ، ويتم التلقيح في فصل الخريف والشتاء حيث الحرارة المعتدلة، ويبلغ متوسط وزن المواليد الذكور 2 كغ، والإناث 1.8 كغ، وتتكرر المواليد الثنائية والثلاثية، ووزن الذكور المفطومة 15 كغ والإناث المفطومة 12 كغ، ومعدل النمو اليومي للذكور 144غ، وللإناث 113 غ. تسوق الحيوانات بعمر 180 يوماً وبوزن 20 كغ، ولحم الجدايا الصغيرة مرغوب جداً من قبل المستهلكين، ولكن لحم الحيوانات الكبيرة غير مرغوب بسبب رائحته.

بالإضافة لإنتاج اللحم فإن هذه الحيوانات تنتج الحليب، ويبلغ متوسط إنتاج العنزة 70 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 110 أيام، ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي نحو 0.65 كغ.

ماعز الساحل الموريتاني

المنشأ والانتشار:

منشؤه موريتانيا، ويسمى محلياً بالعربي أو الساحلي أو المور، وينتشر في كافة أنحاء موريتانيا، ويعيش بنسبة منخفضة 18 % تحت نظام الرعاية السرحي والباقي 82 % تحت نظم الرعاية شبه المكثف وحول المدن والقرى والواحات، وتبلغ حيازته في نظام الرعاية السرحي 70 رأساً وفي الأنظمة الأخرى 20 رأساً، وبلغ تعداد 4.76 مليون رأس عام 2008، مشكلاً نحو 85 % من أعداد القطيع في موريتانيا، وهو في تزايد. ويمتاز بتأقلمه خارج موطنه الأصلي وهو متحمل للظروف القاسية والسير لمسافات طويلة للبحث عن الكلأ، ومقاومته متوسطة للأمراض والطفيليات إلا أنه مقاوم لمرض التريبونوزوما.

ماعز الساحل الموريتاني

الصفات الشكلية:

لون الجسم مختلط من ألوان الأسود والأبيض والرمادي غالباً، وبألوان مستقلة كالأبيض أو الرمادي أو الأحمر أو الأسود، والرأس كبيرالحجم ومقطع قصبة الأنف مستقيم، والآذان قصيرة، والقرون متوسطة الطول ولولبية سميكة ومسطحة وموجهه للخلف والأعلى ومتناظرة في الذكور، أما في الإناث قليلة التواجد وعند وجودها تكون رفيعة. الشعر قصير وناعم على الجزع، أما شعر الوركين طويل، ويتراوح ارتفاع الجسم بين 75 - 85 سم عند الذكور و 75 سم عند الإناث، والذيل قصير.

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الجسم عند الذكور التامة النمو 32 كغ والإناث 30 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 12 شهراً ونسبة التوائم 25 % والفترة بين ولادتين 12 شهراً.

يبلغ متوسط وزن الميلاد للمواليد الذكور 2 كغ، وللإناث 1.5 كغ، ويصل وزن الذكور المفطومة الى 18 كغ والإناث المفطومة الى 15 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد وحتى الفطام عند الذكور 178 غ، وعند الإناث 150 غ، وتسوق الحيوانات بوزن 25 كغ وبعمر 190 يوماً بالمتوسط، ونسبة التصافي تتراوح مابين 44 - 47 %.

الماعز القزمي الموريتاني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه شرق موريتانيا ومالي ويسمى أفويرا أو ديو غيري أو مارادي، وينتشر في جنوب وشرق موريتانيا، ويعيش تحت نظام الرعاية السرحي على المراعي أو مخلفات المحاصيل، وقدرت أعداده بحوالي 56 ألف رأس عام 2008 وهو يشكل 1 % من إجمالي الماعز في موريتانيا، وهو في تناقص.

الصفات الشكلية:

لونه رمادي غالباً وأشقر نادراً، ورأسه صغير الحجم، وجبهته محدبة، والمخطم قصير، والآذان طويلة ومتدلية، وارتفاع الجسم عند الذكور 70 سم وعند الإناث 60 سم، والذيل قصير جداً، والشعر يغطي كامل الجسم بطول 10سم ، وللذكور عرف يمتد من الرقبة حتى الذيل، وقوائمه قصيرة.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الذكور التامة النمو 40 كغ، والإناث 35 كغ، والعمر عند البلوغ 6 أشهر، ويمتد موسم التناسل في فصلي الخريف والشتاء، وتلقح الإناث بوزن 25 كغ، والعمر عند الولادة الأولى 12 شهراً وتصل نسبة التوائم إلى 80 % والفترة بين ولادتين 9 أشهر. متوسط وزن ميلاد الذكور والإناث 2 كغ، ومتوسط وزن الذكور المفطومة 16 كغ والإناث المفطومة (15) كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد وحتى الفطام 178 غ للذكور و144 غ للإناث. ينتج الحيوان اللحم والحليب، ويقدر متوسط إنتاجه السنوي من الحليب 90 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 120 يوماً، ويقدر متوسط إنتاجه اليومي من الحليب بنحو 670 غ. ويعد لحم هذا الماعز غير مقبول من قبل أغلب المستهلكين.

عروق الماعز
في
الجمهورية اليمنيـــة

الماعز البلدي اليمني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه اليمن، وينتشر في المناطق الجبلية ويسمى بالماعز البلدي اليمني ويسمى محلياً أيضاً الجبلي الأسود، واليمني الأسود، وعتق الأسود، وهو يعيش بشكل سرحي أو شبه مكثف، وتبلغ حجم الحيازة في النظام السرحي 10 - 20 رأساً وفي النظام شبه المكثف 4 - 40 رأساً، وقدرت أعداده بنحو 4.964 مليون رأس عام 2008، وهو يشكل نحو 56.7 %من عدد الماعز الإجمالي في اليمن.

ذكر الماعز البلدي اليمني

أنثى الماعز البلدي اليمني

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أسود والرأس متوسط الحجم ومقطع الأنف مستقيم، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، والآذان منتصبة وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم للذكور 60 سم، وللإناث 50 سم، وطول الجسم المستقيم 53 سم و68 سم للذكور وللإناث على التوالي.

الصفات الإنتاجية:

يقدر العمر عند البلوغ بين 9 - 12 شهراً للذكور والإناث، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، وتلقح الإناث بوزن وسطي 15 كغ، ويتراوح العمر عند الولادة الأولى بين 14 - 17 شهراً، وتبلغ الفترة بين ولادتين 8 أشهر، ويبلغ متوسط وزن ميلاد المواليد الذكور 2.3 كغ، والإناث 1.5 كغ، ويصل وزن الذكور المفطومة الى 9 كغ، والإناث الى 8 كغ، ويبلغ معدل النمو اليومي للذكور 112 غ، وللإناث 108غ، وتسوق الحيوانات بعمر 120 - 360 يوماً وبوزن 15 كغ. بالإضافة لإنتاج اللحم تنتج الإناث الحليب بكميات قليلة نسبياً، ويقدر متوسط إنتاج العنزة بنحو 49 كغ من الحليب في موسم طوله 150يوماً.

الماعز التهامي اليمني
(الشراقي، الموري، السردودي)

المنشأ والانتشار:

يعتقد أن منشأه اليمن، ويسمى محلياً السردودي أو الموري، وينتشر في تهامة بشكل أساسي وفي صنعاء وحجة، وأدخل إلى مملكة البحرين وقبرص. يعيش تحت نظام الرعاية السرحي وشبه المكثف، ويبلغ حجم حيازته في المراعي السرحية 10 - 20 رأساً وفي النظام شبه المكثف 4 - 40 رأساً، ويتركب القطيع النامي من 50 % لكل من الذكور والإناث، القطيع المنتج يتركب من 20 % ذكور، و80 % إناث، وتبلغ نسبة أيام الرعي 90 % والتغذية على المخلفات 10 %، وقدرت أعداده بنحو 523 ألف رأس عام 2008، وهو يشكل 6 % من إجمالي عدد الماعز في اليمن.

ذكر الماعز التهامي اليمني (سردودي)

أنثى الماعز التهامي اليمني (سردودي)

يمتاز هذا الماعز بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وهو حيوان قابل للتحسين الوراثي، وهو في تزايد مستمر.

وتواجد منه ثلاث عترات هي السردودي مبقعة بين اللون الأبيض والبني والعترة الثانية تسمى بالشراقي وتتميز باللون البني والأسود والعترة الثالثة تسمى بالموري وتتميز باللون الأبيض مع وجود بقع سوداء.

الصفات الشكلية:

لون الجسم والرأس بني مبقع بالأبيض رأسه متوسط الحجم، وتتواجد القرون في الذكور والإناث، مقطع قصبة الأنف مستقيم، وآذانه منتصبة وطويلة، ويبلغ ارتفاع جسم الذكور البالغة 50 سم، والإناث البالغة 60 سم، والشعر نصف ناعم.

مولود الماعز التهامي اليمني (سردودي)

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الذكور التامة النمو 16 كغ والإناث 12 كغ، ويتراوح عمر الذكور والإناث عند البلوغ بين 9 - 12 شهراً.

يمتد موسم التناسل طوال العام، وتلقح الإناث بوزن 15 كغ، ويبلغ العمر عند الولادة الأولى بين 14 - 17 شهراً، وتصل نسبة التوائم الى 20 %، والفترة بين ولادتين 8 أشهر.
يبلغ وزن الذكور عند الميلاد 2.3 كغ والإناث 2.2 كغ، ووزن الذكور المفطومة 9 كغ والإناث المفطومة 8 كغ، ومعدل النمو اليومي من الميلاد حتى الفطام للذكور 112 غ، وللإناث 97 غ. تسوق الحيوانات بوزن 15 كغ وبعمر 120 - 360 يوماً، بالإضافة لإنتاج اللحم، فان هذا الحيوان ينتج الحليب، ويبلغ إنتاج الحليب لكل عنزة بالمتوسط 194 كغ في موسم إدرار متوسط طوله 150 يوماً، ويتراوح الإنتاج اليومي من الحليب بين 0.65 - 1.3 كغ.

ذكر الماعز التهامي اليمني (الشراقي)

أنثى الماعز التهامي اليمني (الشراقي)

مولود الماعز التهامي اليمني (الشراقي)

الماعز التهامي اليمني (الموري)

الماعز الثمودي اليمني

المنشأ والانتشار:

يعتقد أنه نشأ في الصحراء اليمنية، يسمى محلياً الأبيض، وعتق الأبيض، وينتشر في شبه الجزيرة العربية وحضرموت، وتبلغ نسبة الحيوانات السرحية 80 % وشبة المكثفة 15 % والتي تربى بالمنازل نحو 5 %، ويبلغ حجم الحيازة 10 - 20 رأساً، ونسبة الذكور والإناث النامية 50 % لكل منهما، يتركب القطيع المنتج من 20 % ذكور، و 80 % إناث.

يتغذى هذا الحيوان بنسبة 90 % على المراعي، وبنحو 9 %على مخلفا ت المحاصيل، و1 %على المركزات من أيام العام، وقدرت أعداده بنحو 2.5 مليون رأس عام 2008، وهو يشكل 28.7 % من إجمالي عدد الماعز في اليمن، ويتأقلم بسهولة مع الموطن غير الأصلي، وقابل للتحسين الوراثي.

الماعز الثمودي اليمني

الصفات الشكلية:

لون الجسم والوجه أبيض والرأس صغير الحجم وتتواجد القرون في الذكور والإناث، ومقطع الرأس محدب والآذان متدلية وطويلة، ويبلغ ارتفاع الجسم 56.9 سم و47.1 سم للذكور والإناث على التوالي، وطول الجسم المستقيم للذكور 60.1 سم وللإناث 50.1 سم، والشعر نصف ناعم .

الصفات الإنتاجية:

يبلغ متوسط وزن الذكور 24 كغ، عند عمر 12 - 18 شهراً، ومتوسط وزن الإناث البالغة 23 كغ، عند عمر 12 - 16 شهراً،

ويستمر موسم التناسل طوال العام، ويبلغ معدل الولادة 90 %، ويتراوح عمر الولادة الأولى بين 18 - 23 شهراً، والفترة بين ولادتين 8 أشهر، وتصل نسبة التوائم إلى 30 %.

يبلغ متوسط وزن المواليد الذكور 2.47 كغ، والمواليد الإناث 2.03 كغ في المحطات، أما في نظام الرعاية التقليدي فان متوسط وزن المواليد الذكور والإناث لايزيد عن 1.7 كغ.

يبلغ وزن الذكور المفطومة 10.13 كغ، والإناث المفطومة 8.91 كغ في المحطات، بينما لايزيد وزن الذكور والإناث المفطومة في نظام الرعاية التقليدي عن 8.1 كغ، ويبلغ وزن الذبيحة 10 كغ، ونسبة التصافي 55 %.

ينتج هذا الماعز اللحم والحليب ويتراوح إنتاج الحليب للعنزة بين 32 - 35 كغ في موسم إدرار طوله بين 60 - 90 يوماً، ويقدر إنتاج الحليب اليومي بنحو 0.5 كغ.

قطيع من الماعز الثمودي اليمني

الماعز الجبلي الدرعي اليمني
(تعز الأسود والأحمر)

المنشأ والانتشار:

منشؤه جبلي من الدروع الجبلية اليمنية والسودانية، ويسمى محلياً تعز الأحمر، وينتشر في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، والجبال اليمنية الجنوبية الغربية، وشمال غرب الصومال، وشمال غرب إريتريا، ويعيش بنظام تقليدي، وشبة مكثف في النظام الرعوي الريفي المستقر،، ومكثف في محطة إب. يبلغ حجم الحيازة العائلية بين 33 - 52 رأساً من الأغنام والماعز ونسبة الماعز بين 20 - 38 %، ويتركب القطيع حسب الجنس من 36 % ذكور و64 % إناث وحسب العمر من 43 % أصغر من سنه و57 % أكبر من سنة، وقدرت أعداده بنحو697 ألف رأس عام 2008 ويشكل 8 % من أعداد الماعز في اليمن، وهو في تزايد.

الماعز الجبلي الدرعي اليمني (تعز الأسود والأحمر)

الصفات الشكلية:

اللون أسود أو أحمر إلى بني ، والجسم فاتح اللون بخط ظهري أسود يمتد من الوجه إلى قمة الذيل، وواجهة القوائم الأمامية السفلية سوداء غالباً، والوجه يشبه وجه الغزال، والقرون متواجدة في الجنسين تبرز قليلاً للأعلى والخلف وتكون متوازية في مراحل العمر الأولى وتبتعد إلى الجانب مع تقدم العمر ، والمظهر العام صغير الحجم، والشعر طويل متميز بخصلة متموجة بنماذج مختلفة بارزة على الظهر والجوانب.

الصفات الإنتاجية:

متوسط وزن الإناث من السلالة السوداء 23 كغ، والسلالة الحمراء 25.4 كغ، ويمتد موسم التناسل على مدار العام، ويتركز في فترة الخريف فيبدأ في شهر أيلول/سبتمبر، ويمتد حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وفي فترة الربيع فيبدأ في شهر آذار/مارس ويمتد حتى شهر أيار/مايو. وتبلغ نسبة الإناث الملقحة بعمر أقل من سنة 40 - 43 %، ويخصص على مدار العام ذكر لكل 25 - 30 عنزة.

ينتج هذا الماعز اللحم والحليب ولكن إنتاجه من الحليب يكفي المواليد حتى الفطام فقط، حيث تفطم المواليد بعمر 3 - 5 أشهر.

الماعز السقطري اليمني

المنشأ والانتشار:

منشؤه جزيرة سقطرة ويسمى محلياً الماعز السقطري، وينتشر فيها ويعيش تحت نظام الرعاية التقليدي السرحي 96 % ونظام الرعاية شبه المكثف 4 %، ويعتمد في تغذيته على المراعي بنحو 90 % من أيام السنة وعلى مخلفات المحاصيل بنحو 9 % وعلى المركزات بنحو 1 %. يبلغ حجم الحيازة 25 - 30 رأساً في نظام الرعاية السرحي وحجم الحيازة في نظام الرعاية شبه المكثف 3 - 5 رؤوس. يتركب القطيع النامي من 48 % من الذكور و 52 % من الإناث، ويتركب القطيع المنتج من 20 % ذكور و 80 % إناث، وبلغ تعداده 50 ألف رأس عام 2008، ويشكل 0.6 % من العدد الإجمالي للماعز في اليمن، ويمتاز بتأقلمه الجيد خارج موطنه الأصلي، وهو غير محسن.

ذكر الماعز السقطري اليمني

أنثى الماعز السقطري اليمني

الصفات الشكلية:

لون الجسم متباين خليط من الأبيض والأسود غالباً، والرمادي في المناطق الجبلية، والأشقر لكامل الجسم والأشقر المبقع بالأبيض أو الأسود في المناطق الساحلية، والرأس متوسط الحجم، وتتواجد القرون في الذكور والإناث وتكون صغيرة وغليظة أو طويلة ملتفة متجهه للأعلى والجانبين والخلف وطولها 40 - 50 سم، والآذان متدلية وطويلة 8 - 14 سم، والجسم مندمج متناسق الأعضاء وصغير الحجم وقوي البنية وخفيف الحركة، ويبلغ ارتفاع الجسم عند الكتف بين 49 - 60 سم وطول الجسم المستقيم 58 - 70 سم، والشعر ناعم وطويل خاصة في الأرباع الخلفية.

الصفات الإنتاجية:

يتراوح وزن الجسم عند النضج للذكور والإناث بين 18 - 29 كغ، العمر عند أول تلقيح بين 6 - 7 أشهر، ويتركز موسم التناسل في شهر أيار/مايو من كل عام، وتلقح الإناث بوزن وسطي 20 كغ، ويبلغ عمر العنزة عند الولادة الأولى 12 - 18 شهراً، وتكون معظم الولادات فردية، ونسبة التوائم قليلة جداً. متوسط وزن ميلاد المواليد الذكور والإناث (2) كغ، وتفطم الذكور والإناث بوزن 10 - 15 كغ، وبعمر 6 أشهر، ويتراوح معدل النمو اليومي بين 45 - 75 غ، ووزن الذبح للجدايا 12كغ، وتبلغ نسبة تصافي الذبيحة 42 %.

ينتج الحيوان اللحم بشكل رئيس، ويبلغ إنتاج العنزة من الحليب نحو 40 كغ في موسم طوله 80 يوماً، ويقدر إنتاج الحليب اليومي بنحو 0.5 كغ.

أهم المصطلحات

نظام الإنتاج:
الطريقة التي تتم فيها تغذية وإدارة ورعاية الحيوانات، والمعتمدة أساساً على نمط حياة السكان وأوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية وطبيعة المنطقة التي يعيشون فيها.

النظام الزراعي المكثف:
نظام إنتاج عصري يحتاج إلى رأسمال مرتفع تحت ظروف إدارية وغذائية ورعاية صحية صارمة باستخدام تقنيات حديثة في إنتاج الأعلاف والتغذية والتحكم في التناسل والحلابة والوقاية من الأمراض، ويقتصر هذا النظام على محطات البحوث والهيئات العلمية ومراكز التحسين والإكثار بالإضافة إلى محطات التسمين والوحدات الإنتاجية التجارية.

النظام الزراعي شبة المكثف:
نظام زراعي رعوي، والزراعة المستقرة أساسية، ويشرف على الحيوانات رعاة مأجورون أو أفراد العائلة، ويعد الإنتاج الحيواني ثانوياً، ويدعم الإقتصاد العائلي الزراعي، الرعي قصير المدى ومستمر طوال العام مدعوماً بمخلفات وبقايا المحاصيل الزراعية.

النظام الزراعي السرحي أو المفتوح:
نظام رعوي حيث ينتقل فيه المربون وحيواناتهم من موقع إلى آخر خلال السنة دون قاعدة محددة طلباً للكلأ والماء ، ويعد الإنتاج الحيواني النشاط الوحيد في هذا النظام، وتكون القطعان كبيرة والمعاملة جماعية.

نظام الرعاية:
العلم الذي يدرس تأثير العوامل البيئية وطرائق توزيع العلف واستبعاد المخلفات ومسب الحليب وجمع البيض في المؤشرات الإنتاجية للحيوانات الزراعية.

العرق:
مجتمع من الحيوانات المتشابهة في مظهرها الشكلي والإنتاجي، إذ يعد التركيب الوراثي هو أساس تمييز العروق.

السلالة:
عرق حيواني خضع لعمليات الانتخاب والتحسين مما أدى إلى تثبيت الصفات الإنتاجية والشكلية.

القطيع:
مجموعة الحيوانات ذكوراً وإناثاً من نوع حيواني واحد أو عدة أنواع والمحتفظ بها للإستثمار في موقع واحد وتعود ملكيتها لشخص أو مجموعة أفراد مرتبطة عائلياً وتؤول إدارتها ورعايتها للمالك نفسه أو لعدة أشخاص.

حجم القطيع:
عدد الحيوانات التي يملكها شخص واحد أو عدة مالكين ويكون القطيع كبيراً عندما يزيد عن 200 رأساً، ومتوسطاً عندما يكون بين 100-200 رأساً، وصغير عندما يكون بين 50-100 رأساً.

الحيازة العائلية:
عدد الحيوانات التي تملكها العائلة من نوع حيواني أو أكثر وهي لاتقل عن رأسين ولا تزيد عن 50 رأساً.

نسبة الحيوانات في القطيع:
النسبة المئوية للسلالات أو الذكور أو الإناث المتواجدة في القطيع.

نسبة السلالات:
النسبة المئوية لكل سلالة في القطيع.

نسبة الذكور:
النسبة المئوية للذكور في القطيع.
نسبة الإناث:
النسبة المئوية للإناث في القطيع.
الرسن أو النسب:
هو النسب الذي ينتمي إليه الحصان وهو عائد إما إلى القبيلة التي انتشر منها (الحمدانية، الحمدانية بني غراب) أو عائد إلى الصفات الجسمية الخاصة بالحصان (كحيلة، صقلاوية).
طول الجسم:
الطول من قاعدة الرقبة حتى العرقوب في الخلف.
طول الجسم المائل:
طول الخط الواصل مابين أسفل عظم لوح الكتف إلى الوركين بشكل مائل.
طول الجسم المستقيم:
طول الخط الفاصل مابين الغارب أو الحارك إلى أعلى نقطة في منطقة الكفل بشكل مستقيم.
إرتفاع الجسم (الغارب):
إرتفاع الحيوان من سطح الأرض وحتى قمة الكتف.
محيط الصدر:
محيط الجسم خلف القوائم الأمامية.
الداليات (العنابات):
زوائد لحمية في أسفل العنق (الرقبة) ولها أسماء مختلفة العنابات، الشرابات، الحلق، الأقراط، لقط، تراكي، الزلمتان تبعاً للدولة.
مقطع الرأس: ويقسم حسب درجة انحناء القصبة الأنفية وكالآتي:
المقطع المحدب:
قصبة الأنف كبيرة الإنحناء وتدعى الأنف الروماني في الذكور والإناث وتعبر عن جمال بعض السلالات (الماعز الشامي).
المقطع المستقيم:
قصبة الأنف مستقيمة في الذكور والإناث.
معدل الإخصاب:
عدد المواليد الناتجة(مواليد حية+ مواليد نافقة عند الميلاد) لمئة أنثى ملقحة.
حجم البطن:
عدد المواليد الحية والنافقة عند الميلاد للأنثى الوالدة في الموسم الواحد.
معدل الولادات:
النسبة المئوية للإناث الوالدة = عدد الإناث الوالدة (الأنثى التي أعطت مواليد حية أو نافقة) من مائة أنثى ملقحة.
عدد الولادات بالسنة:
تقدر بعدد الولادات في القطيع الأساسي خلال عام كامل مقسوماً على عدد الإناث الوالدة المتواجدة في القطيع.
الذكور تامة النمو:
الذكور الناضجة جسمياً وجنسياً والقادرة على التلقيح في الموسم الجاري.
الإناث تامة النمو:
الإناث الناضجة جسمياً وجنسياً والقادرة على التزاوج والحمل خلال موسم التلقيح الجاري.
موسم التناسل:
الفترة التي تتركز فيها قدرة الذكور على التلقيح وقبول الإناث للتلقيح والحمل خلال السنة.

نسبة الولادات التوأمية:
عدد الإناث التي تلد ولادات ثنائية وأكثر لمئة أنثى والدة.
الإنتاج الكلي من الحليب في الموسم/كغ:
الحليب الذي ترضعة المواليد والحليب المستهلك في الموسم.
الإنتاج اليومي من الحليب/كغ:
الحليب الكلي الناتج في الموسم مقسوماً على عدد أيام الإدرار (طول الموسم).
الجوامد الصلبة الكلية في الحليب:
مجموع النسب المئوية للبروتين والدهون وسكر اللاكتوز والأملاح في الحليب.
معدل النمو اليومي غرام/يوم:
الزيادة اليومية في النمو وتقدر بالغرام في اليوم.
وزن التسويق:
وزن الحيوانات مقدر بالكيلوغرام عند إرسالها إلى البيع بقصد الذبح.
عمر التسويق:
عمر الحيوانات مقدر بالكيلوغرام عند إرسالها إلى البيع بقصد الذبح.
وزن الذبيحة للمجترات:
الوزن المتبقي من الحيوان بعد الذبح واستنزاف الدم واستبعاد الرأس والجلد والأحشاء الداخلية والأظلاف أو الحوافر،(أما ذبيحة الدواجن فيحسب الجلد مع وزن الذبيحة).
نسبة التصافي:
النسبة المئوية لوزن الذبيحة إلى الوزن الحي وتحسب بالمعادلة (وزن الذبيحة/ وزن الحيوان الحي× 100).
نسبة التشافي:
النسبة المئوية للحم بالنسبة لوزن الذبيحة وتحسب بالمعادلة (وزن اللحم الصافي / وزن الذبيحة× 100).
طول فترة الحضانة:
الفترة المطلوبة لفقس البيض وتختلف من نوع من الدواجن إلى آخر.
أعداد البيض:
عدد البيض الناتج في العام.
المتوسط اليومي لإنتاج البيض ويحسب بطريقتين:
1 - عدد البيض المنتج في اليوم مقسوماً على عدد الطيور الذي أدخل في بداية مرحلة الإنتاج.
2 - عدد البيض المنتج في اليوم مقسوماً على عدد الطيور المتواجدة في نفس اليوم.

المراجـــع

1 . استمارات الاستبيان والصور المرسلة لكافة الحيوانات الزراعية من الدول العربية عام 2009 .

2 . الإحصائيات الزراعية في الجمهورية العربية السورية ، إصدار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عام 2008.

3 . عبد الرحيم، جمال الدين 2007. رعاية وانتاج الجاموس . كتاب جامعي، كلية الزراعة جامعة القاهرة- منشورات جامعة القاهرة.

4 .غادري ، أحمد غسان . 1982 . الدواجن . كتاب جامعي يدرس في قسم الإنتاج الحيواني ، كلية الزراعة ، منشورات جامعة حلب، سورية .

5 . موسى، صاموئيل وشحادة قصقوصة 1995. أساسيات الإنتاج الحيواني-قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة جامعة دمشق- منشورات جامعة دمشق.

6 . مرسي، محمد عبد العزيز 1991. أسس رعاية ماشية اللبن. كتاب جامعي، كلية الزراعة جامعة القاهرة، منشورات جامعة القاهرة.

7 . www.google.com/search

8 . موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- الجمهورية التونسية - أكساد. ث ح/ن 6/موسوعة ج 1/ 1981.

9 . موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- الجمهورية العربية السورية. أكساد/ن 9/موسوعة ج 2/ 1981.

10. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- دولة البحرين. أكساد/ن 17/موسوعة ج 4/ 1982.

11. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- دولة الكويت. أكساد/ث ح/ن 16/ 1982.

12.موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي - جمهورية السودان الديمقراطية. أكساد/ن 44/موسوعة ج 1983/5.

13.موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- الجمهورية العراقية. أكساد/ن 45/موسوعة ج 6/ 1983.

14.موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- الجمهورية الإسلامية الموريتانية. أكساد/ن 52/موسوعة ج 8 /1984.د

15.موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي-الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية. أكساد/ن 59/ موسوعة ج 9/ 1984.

16 . موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي-جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . أكساد/ن60/موسوعة ج1984/10.

17. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- المملكة الأردنية الهاشمية. أكساد/ن 61/موسوعة ج 11 /1984.

18. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- دولة قطر. أكساد/ن 62/موسوعة ج 12 /1985.

19.موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي - الجمهورية العربية اليمنية. أكساد/ ث ح/ن 1985/63.

20. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- الجمهورية اللبنانية. أكساد/ن 65/موسوعة ج 14 /1986.

21. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- دولة الأمارات العربية المتحدة. أكساد/ن 67/موسوعة ج 15 /1986.

22. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- سلطنة عمان.أكساد/ن 88/موسوعة ج 16 /1987.

23. موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي- المملكة العربية السعودية. أكساد/ن 93/موسوعة ج 17 /1988.

24.موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن العربي-جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. أكساد/ن 94/موسوعة ج 1988/18.

25. موارد الماعز في الدول العربية 1 - الجمهورية العربية السورية. أكساد/ث ح/ن 1990/100.

26 . موارد الماعز في الدول العربية 2 - جمهورية السودان.أكساد/ث ح/ن 1990/101.

27 . موارد الماعز في الدول العربية 3 - الجمهورية التونسية. أكساد/ث ح/ن 1990/109.

28. موارد الماعز في الدول العربية 5 - سلطنة عمان .أكساد/ث ح/ن 1991/123.

29 . موسوعة عروق الأغنام العربية . أكساد/ ث ح/ ن 1996/155.
30. موسوعة عروق الأبقار في سلطنة عمان.أكساد/ث ح/ن 1998/185.
31.موسوعة عروق الأغنام في سلطنة عمان. وزارة الزراعة والثروة السمكية. أكساد/ث ح/ن 1998/189.
32. موسوعة عروق الأبقار في العراق. أكساد/ث ح/ن 1998/190.
33. موسوعة عروق الماعز في الوطن العربي. أكساد/ث ح/ن 1998/201.
34. موسوعة عروق الأغنام في الجمهورية اليمنية. أكساد/ ث ح/ن 1999/216.
35. عروق الأبقار في الجمهورية اليمنية. أكساد/ث ح/ن 2001/248.
36. موسوعة الجاموس في جمهورية مصر العربية أكساد/ث ح/ن 2002/260.

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)

منظمة عربية إقليمية متخصصة تعمل في إطار جامعة الدول العربية . ويهدف إلى تطوير البحوث الزراعية العلمية في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من التقدم العلمي والتقانات الزراعية الحديثة لرفع الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.

هاتف : 39 30 574 - 87 30 574 11 00963 - فاكس : 63 30 574 11 00963

بريد الكتروني : email@acsad.org

http // www.acsad.org

ص.ب : 2440 - دمشق - الجمهورية العربية السورية